




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.572






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.572





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.572



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.572








XV

VEG





VEGETII

RENATI ARTIS VETERINARIAE, SIVE MVLOMEDICINAE libri quatuor, iam primum
typis in lucem editi. Opus sane in rebus
medicis minime aspernandum.

BASILEAE



Μηδονος λαβηται

ILLVSTRISSIMO PRINCIPI FER.
dinando Regi Hūgarīæ, Bohemiæ &c.

Transuxerat olim, Ferdinande Regum serenissime, ad nos D. Hermannus Inclutus à Neuenare Comes, Vegetij Renati artem Veterinariam, ut eam doctissimorum uirorum auxilio, à mendis, quibus scatebat, expurgaremus, & typis excussam aderemus in publicū. Sed cū exemplaris infinita deprauatione desperantes ab incepto negotio deterriti fuisset, codicemq; illum peruetustum rursus ablegasset, instigauit ad desperatū munus redeundū, q; tuæ Serenitatis nomini opus hoc dedicādkū asserebat, nimirū ut cui nō ingloriosum esset, et egregios, et ualidos equos habere etiā p̄ multos, quos hic author & à peste p̄seruari, & iam ægotantes sanari nō incommode perdocuit. Verū etsi non integre natiuo nitore me redditurū considerē, sperabam tamē me & Cels. tuæ rē gratā, & posteris ansam id studij diligentius p̄quirēdi p̄biturū. Habeant itaq; p̄ Serenitatē tuā et ceteri, Vegetiū hūc, nostro labore à uitijis p̄p̄modū infinitis expurgatū. quāq; sint pleraq; quæ absq; & uo γ p̄ q̄ restitui posse nō credere, quæ, ubi uisum fuerat, uel obelo, uel asterisco, uel alia quadā notula cōsignauimus. Nonnulla, licet immutatis uel uerbis uel uerborum ordine, sententias tamen plenas, & intellectu faciles insinuare comperimus, quæ lectoris iudicio immutanda uel corrigenda reliquimus. mei enim candoris non esse censebam si mea alienis ingererē. Quædam etiam morborum, simul & herbarū, remediōrum uel uocabula licet immutanda cognosceremus, constās tamen exemplariorum consensus, ne q̄q; immutarem prohibuit. nā ita fortassis scriptū ab authore nō uulgares neque ineruditi persuadebant amici. quod eo facilius effecerant, & q; nō ignorem Antonij Codri de hoc authore iudiciū, & q; sciam apud plerosq; medicos permulta esse uel corruptissima. Quædam etiam cū uel uariarent exemplaria, uel abundare uiderentur, aut etiam uel parum, uel nihil ad sententiā facerent, parenthesi interdum cinximus. De his Serenitatem tuam admonendam duximus. Precantes nostrum hunc laborem (qui certe quantus fuerit, nemo facile crediderit) hilari fronte suscipere nō dedignetur. Vale felix.

S.

M.

T.

Obsequentissimus Ioannes Faber
Emmeus Iuliacensis Typographus.
Basileæ.

SERENISSIMO

AC ILLVSTRISSIMO PRINCIPI D. FER-
dinando, Regi Hungariæ, Bohemiæq; Archiduci Aus-
triciæ, Duci Burgundiæ, &c. Domino suo Cle-
mentissimo.



Nter tot, tamq; uarios & anticipites fortu-
næ casus, quos infractio huc usq; animo
superasti, Ferdinande Rex Sereniss. illud
merito in te miramur omnes, quod in ea
ætate cōstitutus, ita animum institueris,
ut neq; in rebus prosperis audaciæ, neq;
in aduersis timiditati unquam induleris.

Nam tot iam partis abs te triumphis, nihil immoderate, ni-
hil arroganter egisse uisus es. Sed ne in ipso quidem bellico
furore mentē tuā passus es à recta ratione dimoueri, quod
heu nimīū multis contigit, alioqui laudatissimis uiris, ma-
gno suo, suorumq; malo. Alios non paucos bellum ipsum
exitialis rerū humanarū pestis, inhumanitatē, feritatem, et
crudelitatem docet. Tu contra in ipsis bellorū tumultibus
mansuetior, in militia reddi cultior uideris. Quā rem maio-
re etiam admiratione dignā facit Celsitudinis atq; dignita-
tis tuæ cōsyderatio. Tu quippe citra omnē controuersiā
post Cæsareū numē secundū in rebus humanis obtines lo-
cū. Quē qdē ita & magnanimitate & gratia tueris, ut nes-
mo uideri possit eo obtinēdo dignior. Intellexerūt hoc Bō-
hemi & Hūgari, qbus nec uisus antea, nec plene cognitus
inter tot undiq; cōpetitores dignissimus es iudicatus, quos
triusq; regni gubernacula suscipies. Mirātur multi Cn. Pō-
peiū, q; Mithridatē regem. 70. regnorū cū tota ferē Asia, na-
tura imbelli; Mariū, q; Cymbrorū colluuiē: Cæsare, q; Gal-
los agrestes tunc hoīes bello superant. Te adhuc puero Sue-
uorū gens, quorū uires ipsis aliqñ Romanis formidabiles
erāt, tuo. i. Austriæ Imperio accessit, idq; felicissimo quodā
auspicio

EPISTOLA

auspicio, uidelicet ut ex tam auspicato exordio Regni tui, homines intelligerent, ipsos aliquando, ditionis tuæ terminos longe lateq; propagandos esse. Venetos gentem totius Italiae florentissimam, ad conditiones acceptandas sola nominis tui auctoritate compulisti, receptis oppidis aliquot, quæ Maximiliano Cæsari, iniuste ablata, iure debebantur. Accesserunt etiam finibus tuis pars lacus Benaci, nec non alpium, ac florisulij loca quedã per Venetos iam dudum uiolenter occupata. Heluetios multo iam tempore graues illis, quos eo in tractu tibi habes subditos, facile contineres tua auctoritate, Satiùs iudicantes, quietem agere, quàm quicquam quod tu uiolari nolis, attingere. Vnagaricum bellum, quod prædonis illius Regulì inuidia exarserat restrinxisti, ut prius quàm copiae tuæ, ditionis illius fines attingisse crederentur, ille tam toto regno pulsus exularet. Sunt hæc quidẽ argumẽta summæ fortitudinis & prudentiæ, maioris etiam felicitatis tuæ. An nõ uidemus hoc agere deum? ut Cæsarea maiestas ac tua Celsitudo tantum emineant potestate, quantum modestia & bonitate excellitis. Amisit nuper Germania decus et ornamentum suum Diuum Maximilianum Auum uestrum, Cuius in re bellis ca non inferior Scipione, uirtus atq; industria habebatur: Amiserat ante Philippum patrem, adeo amabilem & charum omnibus mortalibus, ut pulcherrimum Titi & Vespasiani elogium illi iure competierit, Deliciæ generis humani; sed deus qui nunquam deest rebus humanis, quanto cum scœnore, quod periisse uidebatur, refarciuit, excitans nimirum duo ornamenta, duo humani generis præsidia, quorum auspicio, boni ad excolendas uirtutes accendantur, mali uero benefacere discant. Sed hæc epistolaris non cõprehendit angustia: celebrabunt ea, quibus & plus otij & ingenij erit. Aperuisti tu uel solus campum patensissimum, ubi & ingenium & eloquentiam exerceant omnes

nes

DEDICATORIA.

nes eruditū. Sane iniquum fuerit, nos ita suspicere antiquitatem, ut nostra, cum non sint inferiora, contennamus. Ego, ne inter aulicos tuos, solus nihil agere uidear, chartas ceum munusculum tuæ offero Serenitati, Vegetij in quā Renatī, eius qui de re militari libellum cōscripsit, artis Veterinariæ siue Mulomedicinæ opus, multis seculis absconditū. quandoquidē equos habere & multos & bonos regij decoris esse uidetur, quos non tam ad pompam, quā ad res gerēdas alere cordati homines solent. Quā in re Mulomedicorum opera minime contemni debet. Hoc itaq; opusculum Beato Rhenano, necnon Ioanni Emmeo, conterraneo meo, uiris cum eruditis, tum mihi amicissimis, primum commissimus, ut illorum opera castigatum exiret in uulgus. Nam erat propemodū infinitis locis corruptum. Verū cum Beatus ille uarijs obstrictus negotijs munerī obeūdo adesse nō posset, solus Emmeus, nō absq; summis laboribus, operi castigando manum applicuit. Huius igitur industriæ debetur, quod ab infinitis uindicatum nūc nūc potit in lucē. Tu uero Serenissime Rex Ferdinande, ut illos tui gratia potissimum susceptos labores recōpenses, bonas literas, quicq; illas sincere colunt, pro regia indole tua, quemadmodū hactenus fecisti, ornare & tueri non desinas, id enim tuis pulcherrimis factis, non parum splendoris adiūciat. Interim Deum Opt. Max. precor, ut imperiū tuum, perpetua felicitate decoretur ad honorem dei, & utilitatem Reip. Christianæ. Meq; tibi obsego sissime commendo Ferdinande Regum Illustrissime. Ex arce nostra Bedburtina, quarto Nonas Iulij. Anno domini

M. D. XXVIII.

E. R. Maiestatis Tuæ
deditissimus, & obsequentissimus Here
mānus Comes à Nuenare, Præpositus
primariæ ædis Coloniensis.

ELENCHVS TI=

TVLORVM CAPITVM LIBRI PRIMI.

Quibus signis ægritudo animalium cognoscatur.	1
Quot sint genera morborum.	2
Signa morbi humidi.	3
Signa morbi aridi.	4
Signa morbi subtercutanei	5
Signa morbi articularis.	6
Signa morbi farciminosi.	7
Signa morbi subrenalis.	8
Signa morbi elephantiasis.	9
Cura morbi humidi.	10
Cura morbi aridi.	11
Cura morbi subtercutanei.	12
Cura morbi articularis.	13
Cura morbi farciminosi.	14
Cura morbi subrenalis.	15
Cura morbi elephantiasis.	16
Causæ & curæ generales morbi malei.	17
Potio anniuersaria Physica.	18 lib. primi.
Compositio suffimentorum contra morbum maleum.	19
Alia compositio suffimentorum uehementior, ad lustranda animalia, quæ & fascinum tollit.	20
Deratione flebotomi.	21
Quæ diligentia adhibeatur in sanguinis detractione.	22
Castrata animalia non deplenda.	23
Admissum facientes non deplendos	24
In quibus passionibus & ex quibus locis sanguis sit auferendus.	25
De his quibus sanguis in ungulam tollitur. Alias. Qui ungulam cogunt, uel eiecerint, quomodo sanguis tollatur.	26

De Epist

I N D E X .

De epistomicis, uulsis, colicis, strophosis, & q morbo sub- renali tenentur, unde sanguis tollendus sit.	27.
De ratione foci atq; cauterij.	28
De passione & curis februm.	29
De lassitudine, quæ uidetur febribus similis.	30
De febribus internis.	31
Si in Autumno febrerit.	32
Si æstate febrat.	33
Si hyeme febrat.	34
Si ab indigestione febrat uel pletura.	35
Si ex uuinere oris aut faucium febrat.	36
De coactionibus. i. de nimia lassitudine.	37
Quæ genera ægritudinum ex coactione nascantur.	38
De diuersis passionibus uentris	39
De aqualiculo. i. stomacho.	40
De colo & coli dolore.	41
Cura longanoni & ilei.	42
Causæ & curæ strophæ.	43
De lumbricis, colicis, tineis & pediculis.	44
De clysterijs ad curam lumbricorum & tinearum.	45
De calculosis iumentis.	46
De emphragma.	47
De ileo.	48
De dolore uentris.	49
De dolore coli.	50
De dolore uesicæ.	51
Colli & lumbrici qua cura tollantur ad manum.	52
De syncopatis & confixis.	53
De his qui sanguinem per nares emittunt.	54
De infestatione sanguinis.	55
Quæ adhibenda est diligētia ut animalia sana per- durent.	56
Potio æstiuæ.	57

Potio hy

INDEX.

Potio hyemalis.	58
Potio in autumnno & uere prabenda.	59
Potio omni tempore necessaria.	60
De difficultate urinæ.	61
De Stropho.	62
De dorso curando.	63
De potione probatissima Diapente.	64

CAPITA LIBRI SECVNDI.

De ualitudinibus capitis.	1
De Appiofo.	2
De Frenetico.	3
De Cardiacis.	4
De Rabiofo.	5
Qua obseruatione curentur cyclo animalia, at unũ exem- plariorum habebat, cibo.	6
De cerebro commoto.	7
De capitis dolore.	8
De Distensionibus.	9
De Appiofo.	10
De Rabiofo.	11
De Infania capitis.	12
De Chirurgia.	13
De Auribus.	14
De pilis qui nascuntur in oculis.	15
De Suffusione oculorum.	16
De paracenthesi oculi.	17
De Lunatico oculo.	18
De Staphylomate oculi.	19
Ad album de oculo tollendum.	20
De suffusione curanda per nares.	21
De diuersis passionibus oculorum.	22

INDEX.

De strumis iumentorum.	23
De glandulis	24
De pullaribus	25
De fistula maxillæ, uel de conficiendo collyrio fistulari.	26
De expositione fistulæ.	27
De tumore faucium uel capitis.	28
Si ex pletura sanguinis fauces tument.	29
De intomatibus. i. tuberibus.	30
De lingua incisa.	31
De gingiuis & dentibus.	32
De osse fracto.	33
De cartilagine narium si sanguis fluat.	34
De palato si uena se non clauferit.	35
De genere & qualitate mucorum qui per nares fluunt.	36
De cuserino. i. cū post cursum sanguis de naribus fluit.	37
De polyposo	38
De siderato.	39
De obseruatione flebotomi.	40
De ceruicibus	41
De malandria. i. de uulneribus ceruicis.	42
De distillatione ceruicis.	43
De distillatione scapularum.	44
De armislæsis.	45
De genu commoto uel basi.	46
De fractura articuli, uel cruris, uel coxæ.	47
De flegmone, marmore, siue mallonibus.	48
De aquatilibus & ozœnis.	49
De pedibus reumaticis, siue uentosiss.	50
De impetiginibus.	51
De uligine.	52
De podagra iumentorum.	53
De orthocolis siue stillosis.	54
De pedibus & ungulis.	55

INDEX.

Si pulmunculum ad aperturam fecerit.	56
Si exungulauerit iumentū, & si suffusionē pedū patiat̃.	57
De pedibus attritis siue mollibus.	58
De dorso confirmando.	59
De dorso curando iam læso.	60
Si pulmunculus nascitur in dorso animalis.	61
Si uulnus fecerit.	62
Vt pili renascantur.	63
De denigrandis pilis albis.	64
Vt pili nigri albescant.	65

CAPITA LIBRI TERTII.

De obseruanda boum sanitate, Rubricæ cap. 1.	
De morbis boū, & primo de maleo. 2. cap. Rub.	
De cruditate. cap. 3. Rub.	
De febre. cap. 4. Rub.	
Si uermes animal fecerit. cap. 2. lib. 3.	
De cura lumborum.	3
Quibus signis dolor renum indicetur.	4
De internis musculis renum.	5
Si talus exeat animali.	6
De dolore renum.	7
De tumore testium.	8
Si natura reuocari non possit.	9
Si iumentum sanguinem minxerit.	10
De dysenteria.	11.
Si ociosum animal sanguinem mingat.	12.
Si animal sanguinem euomat.	13
Si percussa uena claudī non possit.	14
De indignatione uesticæ.	15
De fluxu uentris.	16
De uerrucis.	17

I N D E X.

De uitijis coxarum.	18
De laccis gambarum.	19
De gambofo,	20
De his quæ læduntur à rotis.	21
De syrmatico. i. quod coxam subito trahit.	22
De morbo alienato.	23
De roborosis.	24
De hydropicis.	25
De sarcoftis.	26
De tympaniticis.	27
De lienosis.	28
De implectico.	29
De phragmatico.	30
De eo qui aquam timet.	31
De spafmo.	32
De epilepsia.	33
De eo qui aquam reuomit.	34
De sideratitio.	35
De percusso à sole.	36
De cruditate.	37
De bulimo.	38
De anhelitu.	39
De æstu,	40
De paralytico.	41
De intrinsecus rupto.	42
De infania.	43
De pletura ex hordeo.	44
De passione pulmonis.	45
De eieronica, uel orthotonico, uel ortholistophico.	46
De opisthotonico, & empisthotonico.	47
De lethargico.	48
De morbo regio.	49
De bili, i. coleribus.	50

b a

INDEX

De biliarida.	51
De coli passione.	52
De uomica.	53
De coriagine.	54
De stomachico.	55
De ictérico.	56
De stropho.	57
De dolore iecoris.	58
De inflatione uentris.	59
De intestini uexatione.	60
De tussi.	61
De tussi quæ uenit si quid faucibus hæserit.	62
De tussi ex perfrictione.	63
De tussi à colibus.	64
De tussi ab interioribus.	65
De uulsis.	66
De tussi quæ ex humorum acerbitate generatur.	67
Ad tussim siccam, uel ad suspirium, & arteriam exasperatam.	68
Ad uomicas & tussim.	69
De diuersis potionibus uulforum & tussientium.	70
De scabie.	71
Si animal foeno malo lædatur.	72
Si hordeo malo lædatur.	73
Ad fascinum.	74
Remedium contra omnes morbos.	75
Si animal lædatur dum accipit potum.	76
Si animal à uenenatis bestiolis mordeatur.	77
Si bustrem comederit animal in foeno.	78
Si uipera percusserit animal.	79
Si araneum comederit.	80
Si sphalangius percusserit animal.	81
De mure araneo.	82

I N D E X.

Ad ictum scorpionis.	83
De canis rabidi morfu.	84
Si animal comederit sterus gallinarum.	85

CAPITA LIBRI QVARTI.

De numero & positione ossium	1
De numero & qualitate membrorum.	2
De numero & qualitate neruorum.	3
De qualitate uenarum.	4
De indicijs & ætate equorum.	5
Designis quibus agnoscitur patria.	6
De temporibus uitæ.	7
Portio ad reficiendum iumenta, & diapente.	8
Ad tussim & uulsos.	9
Ad collos, uermes, uel tineas.	10
Aduersum omnia genera morborum.	11
Confectio suffimentorum salutaris.	12
Confectio pulueris quadrigarij.	13
Compositio caustici.	Ca. 14
Compositio malagmæ.	15
Compositio collyrij fistularis.	16
Compositio malagmæ crudæ.	17
Compositio syncrismæ.	18
Compositio traumatici.	19
Compositio malagmæ basilicæ.	20
Alia compositio malagmæ.	21
Compositio prima anacollimatis.	22
Compositio alia malagmæ crudæ.	23
Compositio malagmæ ad uligines.	24
Compositio malagmæ ad neruos.	25
Compositio traumatici.	26
Compositio collyriorum.	27
	b 3

I N D E X.

Sequuntur medicamentorum genera quædam, ad finē
quarti libri adiecta. Folio .70.

Cephalicum emplastrum ad claudenda uulnera.

Medicamentum consuetum.

Chlora medicamentum ad uulnera lymphidanda.

De tetrapharmaco, ad uulnera claudenda.

Glicium, ad uulnera sordida & cancrofa.

De ossioclari, ad omnia ossicula.

De styptico, ad uulnera humecta.

Medicamentum ad omnia uulnera claudenda.

Implectoricum, ad caua supplenda.

Ad oculorum rupturas, & glaucomata.

De syncrissima, aliud.

De lipparijs.

Traumatici compositiones uariæ, ad traria.

Cautistici compositiones aliæ ad diuersa.

De malagmatis quibusdam.

Emplastrum quoddam.

De ceroto.

Fomentum ad tumores, uel quamlibet duriciam.

Potio hyemalis.

Potio æstiuæ.

VEGETII RENA

TI ARTIS VETERINARIAE, SIVE
MVLO MEDICINAE, PRAEFATIO.



Vl medicina apud Græcos Latinosq; authores non fuit cura postrema. Sicut enim aīalia post hoīem, ita ars Veterina post Medicinā secunda est. In equis enī ac mulis & adiumenta belli, & pacis ornamenta consistūt. Sed quoniā minus dignitatis uidebatur habere professio quæ pecudū promittebat medelā, ideo minus splendidis exercitata, minus eloquentibus collata docetur in libros, Licet prōxima etate et Pelagonio non defuerit, & Columelle abūdauit dicen di facultas: uerū alter eorū cū rusticæ rei præcepta conscriberet, curas aīaliū leui admonitione perstrinxit; alter omīssis signis causisq; morborū, quasi ad doctissimos scriberet, tam magnæ rei fundamenta neglexit. Chiron uero & Absirtus diligentius cuncta rimati, eloquētiæ inopia, ac sermonis ipsius uilitate sordescūt. Præterea indigesta & confusa sunt oīa, ut partem aliquā curationis quærenti necesse sit errare p̄ titulos, cū eisdē passionibus alia remedia in capite, alia inueniantur in fine. Additur etiā q̄ studio luci quædam ita sunt compositæ potiones, ut pretium enorme contineant, & curæ taxatio, animalis æstimationem propē uideatur æquare: ut plerūq; aut parci homines, aut certe prudentes, aīalia sua canibus dedant, aut à dānosa curatione dissimulent. His & talibus rationibus inuitatus, cum ab initio etatis alendorum equorum studio flagrarem, hanc operam nō inuitus arripui, ut conductis in unū Latinis dūtaxat authoribus uniuersis, adhibitis etiam Mulomedicis, & Medicis non omīssis (nam Mulomedicinæ doctrina ab arte Medicinæ non adeo in multis discrepat, sed in multis plurimisq; cōsentit) inquantum mediocritas ingenij patitur, plene ac breuiter omnia epitome congererem, causasq; & signa morborum omnium declararem. Nam si laus prima medicorum est genus ægritudinis in homine reperire, qui passionem suam & manu potest, & uoce signare, quāto magis in Mulomedicina necessariū creditur genus ægritudinis nosse, cum mutum sit aīal, & non possit propriū indicare

P R A E F A T I O.

indicare languorem, & ab imperitis ad opus aliquod laborēque cogatur. Sic geminū subeat ex morbo & fatigatione discriminē. Aut certe neglectū, inueterata aegritudine nequeat sero curari. Sicut Mantuanus poëta diuino ore testatur: Morborūq; & causas, et signa docebo. Absq; dubio aut oīs cura uacabit, si genus passionis ignoretur. Ex inani p̄suatione illud generatur incommodū, ut honestissimus qsq; erubescendū ac uile credat iumentorū nosse medicinā. Primū, nullius rei scientia uilis est. Nā cum humanae uitae conuersatione aliud fugiendū, aliud uero sequēdum, nō est p̄fecta peritia, nisi quae utraq; cognouerit. Deinde, quis aestimet erubescendū talem peritiā quae damna submoueat? Nā sicut incolumitas iumentorum habet lucrū, ita eorū interitus afferre uidetur incommodū. Praesertim cū mancipia, quorum plebeia curatio nō putatur, saepe uilioribus pretijs, quā equi uendantur aut muli. Postremo siue ad uehēdos locupletes aptos, siue in circi cōtentione uictores, siue in praelijs (ut ita dixerim) probatissimos bellatores, acerrimū studiū amoremq; constat al̄s (aut saluti) habere dominorū. Nec immerito uoluptati natū animal (salutis) gratiam meretur ab hoīe. Quis aut nosse curas iumentorum erubescendum putet, cum optima iumenta habere gloriosum sit? Quis uitupationi det id posse curare, quod laudi ducitur possidere? Forsan ipsa opera Mulomedicorū uidetur abiectionior, notitia aut curationis nō solum honestissimis, sed etiā disertissimis conuenit: ut prouisione & ordinatione sollerti curatis animalibus, & damnis careant, & uoluptatibus perfruantur. Sed alij morbi sunt, qui ea tantū aīalia, quae occupauerunt, uexant; Alij etiam ab uno uel paucioribus quae pereūt, in plura, quae pariter stabulātur uel aluntur, in totos saepius graes sensissima contagione transmigrant, ut quamuis sanū aīal intra breue tempus, alienae aegritudinis afflante uicinia, repente depereat. Rectius est ergo eorum prius morborū & signa & causas praedicere, curasq; mōstrare, qui quodā trāsitu pluribus nocēt. Nam aduersus maiora dispēdia, maiorem sollicitudinē oportet impendi. Prima igitur iumentorum uilitas est domini, uel procuratoris, uel pastoris ipsius amor atq; diligentia. Comes enim semp est affectionis, industria: & incolumia cupimus quaecunq; diligimus. Domita aīalia aut praesepibus aluntur, aut pastu. Indomita latioribus nutriuntur in salubus. Quotidie ergo, uel frequentissime speculari conuenit habitum iumentorum. Nam diligentibus morbus ipse se prodit.

FINIS.

VEGETII RE=

NATI ARTIS VETERINARIAE,
SIVE MVLOMEDICINAE LI
BER PRIMVS.

QVIBVS SIGNIS AEGRITVDO
animalium cognoscatur. Caput. I.



CONTINVO ANIMAL QVOD
ualetudo tentauerit, tristius inuenitur, aut pi-
grius, nec consueto utitur somno, nec solito se mo-
re transuoluit, nec requiem ut assumat accūbit,
nec deputatum cibum assumit ex integro, & po-
tum aut intemperantius accipit, aut omnino fasti-
dit, stupēti bus oculis, auribus flaccidis, erecto ui-

lu, turpi pilo, exhausta sunt ilia, sit spina rigidior, anhelitus crebrior aut
grauior, incessus ipse, quo maxime notatur, segnis ac nutās. Cum huius-
modi signa in iumento unum uel plura conspexeris, statim illud separabis
à ceteris, ut contagionem non inferat proximis, et facilius in solo iam cau-
sa morbi possit agnosci. Si diligenter habitum, post unam, secundam, uel
tertiā diem ab illa inuestitia fuerit absolutū, nihilq; resederit in corpore
ipsius quod putetur ambiguum, scito ex leuioribus causis illam uenisse tri-
stitiam, & animal consuetudini pristinae esse reddendum. Nec exploran-
di omittatur intentio. nam frequentius inspicere debet & cautius, quod se-
mel coepit esse suspectum.

Quot sint genera morborum. Caput .II.

Morborum quidem diuersae sunt passionēs, sed uno generali uoce
bulo continentur, quod ab antiquis Malleus nominatū est, ipsa
appellatione uim cladis periculumq; testantes. Sunt autem spe-
cies Mallei numero septem: Humidus, Aridus, Subtercutaneus, articula-

A ris, cle

ARTIS VETERINARIAE

ris, Elephantiasis, Subrenalis, Farciniosus. Signa omnium dicamus.

Signa morbi humidī. Caput .III.

Humidus morbus est, cui de naribus pro mucis humor defluit male olens, & spissus, colore pallido. Huius grauat caput, oculi lachrymantur, & stridet pectus, sit gracilis horrentibus pilis, tristis aspectu. quem profluuium atticum ueteres uocauerunt. Quando cunque autem sanguinolentus humor uel croco similis per nares fluere coeperit, iam insanabilis est & uicinus morti.

Signa morbi aridi. Caput .IIII.

Aridus autem morbus his agnoscitur signis: Nullus ei per nares supra solitum humor emanat, suspirat tamen grauititer, & nares habet extensas, ilia curuabit intrinsecus, et contractionem spinæ duriciamq; patietur, testiculi eius ita substringuntur, ut apparere uix possint, cibi parcius, bibendi appetentior ultra morem. Propter quod pulmone siccat, internum patitur ardorem, tensis oculis in obliquum respicit, *al. † cacabit.* nec facile † cubet. Hūc suspirium uocant & insanabilem, nisi ab initio secura curatione subueneris.

Signa morbi subtercutanei. Caput .V.

Subtercutaneus morbus autem his proditur signis: Vulnere in corpore eius scabiei similia nascuntur, ex quibus humor effluit liquidus & uiridis, qui prurignem mouet, ut scalpere parietibus uel cornu animalia sepe fricare cōpellat, quo ulcera corticem ducent. Huic nec humor per nares emanat, nec anhelat, nec cibum recusat, nec respuit potum. Propter quod diu bibet. Et ideo si cura non desit, ex hoc plurima iumenta liberantur. Quidam uero scabiem subtercutaneum morbum dicere tentauerunt, quod similia supradictis signis uideatur ostendere, & contagionem transferre per proximos, & tardius sanari. Sed quia nec necem, nec gregi insert facile periculum, à pestiferi illius mallei societate discretus

discretus est, & seorsum ab illa dicitur.

Signa morbi articularis. Caput .VI.

Articularis autem morbus, quem ἀρθρίδης Græci uocant, per hæc monstratur indicia: Interdum paucis, interdum plurimis diebus ab articulis claudicabit, ut aut ictu calcis animalis alterius percussus, aut negligentia impactus, aut saxo uel fuste uideatur elisus. Sed hæc solet esse distantia, ut illa quælibet læsio loco figatur, hæc autem passio, quia erratica est, subito ad pedem alterum migrat. Præterea ossibus astringitur cutis, & ad tractum tractanti dura resistit, Rigescit spina, corpusq; contrahitur, pilus erectus & horridus, ac deformis aspectus, macie corpus affectum. Et quamuis non recuset alimenta, nec curat si desint, indies tamen deterior fit & tristior, difficulterq; curatur.

Signa morbi farciminosi. Caput .VII.

Farcimosum uocabulum ex genere passionis euenit. Huiusmodi deprehenditur argumento: In lateribus & in coxis, & in uerendis quoque partibus, & præcipue in iuncturis membrorum, uel in toto corpore collectiones instantur: rursumq; his uelut sedatis, aliæ renascuntur: cibum potumq; ex more recipiunt, macrescunt tamen. quia digestio eis plena non prouenit, bilares aspectu, sanisq; similes creduntur ab indolis artis mulomedicinae, quia exterius agitur causa: quibus imperitia artificum sanguinem festinat auferre. Sed contraria ista curatio est. Nam affectis farcimino, quicquid superest uirium, tollit. In initio tamen ne morbus increseat, uel in fine cum iam uires redire cœperint, emissio sanguinis iuuat.

Signa morbi subrenalalis. Caput .VIII.

Subrenalalis morbus nō minus noīe, quā ipsa passione monstratur.

A a Nam

ARTIS VETERINARIAE

Nam animal uelut renibus laesis, à posteriori parte deficiens, prodit mor-
tiferæ necessitatis indicium, tussiet grauitèr, horrebit aspectu, cutis duri-
tia ex spinæ rigore proditur, partius potum, partius appetit cibum. Huius
quia tota uis morbi possidet lumbos, à femoribus incipit prima curatio.

Signa morbi Elephantiasis.

Caput. IX.

Elephantiasis autem dicitur ex similitudine elephantis, cuius natu-
raliter pellis dura & aspera, morbo nomen & in hominibus, & in
animalibus dedit. Cuius signa hæc sunt: In toto corpore uredo na-
scitur, præcipue in dorso, squamas similes corticibus facit. In naribus, in
pedibus etiam, & in capite, papularum feruor emergit, uel oxæne aspe-
riores frequenter oriuntur. Priusquam hæc ostendantur indicia, uentre
solutio erit, & marcescit, et aspere tussiet. Cuius os totum cum lingua aspe-
rum & simile creditur esse combusto. Quæ passio pullis à matre depul-
sis plerumq; perniciem consuevit inferre. Hunc diligenter curare cupien-
tes, non ante desoris aliquo medicamento fouere contendunt, nisi prius po-
tionibus datis, pestis eleuetur interior. Nā extrinsecus cepta medicamen-
ta morbum non eximunt, sed ad interiora compellunt, & hac ratione pe-
riculum generant. In animalibus eiusmodi morbo laborantibus generalia
istâ sunt uitia: tussis aspera & crebra suspiria, spina contracta & rigida,
macies semper increscens cum studium & alimenta non desinant, demis-
sor ceruix, stupentes oculi, tardior incessus. Nunc signis omnibus gene-
raliter singulariterq; digestis, singulorum morborū speciales, propriasq;
curas oportet adiungere. Post hæc de generali minutione singulorum, et
adustione docens, concludam librum primum.

DE MORBORVM CVRATIONIBVS.

Cura morbi humidî.

Caput. X.

Malleus morbus si humidus fuerit, ita ut per utranq; naurem uiri-
des defluant muci, inter exordia caput eius adhibita curatione
purgandum est ita: Olei optimi uncias. 3. liquaminiis floris uncias
2. uini

VEGETII LIBER I.

1. uini ueteris cyathos. 3. sereno tranquilloq; die pariter commisceas, & cum tepesceris infundes in naribus, caput religabis ad pedes, sensumq; iumentum impeditum compelles incedere, ut omnis humor emanet. († ad siphonem autem paulatim infundes non semel à cornu) Quod si sanguis postmodum coeperit fluere, nihil timendum, sed potius sciendum est, animal legitime fuisse purgatum. Post quod seuum caprinum resolutum oleo miscebis, sic infusis naribus exulcerationis illius mitigatur asperitas. Radicem quoq; laseris tonsam, & per fistulam uento naribus insitam, ut sternutum prouocet, adhibere commodum est. Caput etiam extrinsecus auricularq; oleo calente diligenter perūges, & lana cerebro indita, ab omni perfrictionis necessitate munibis. Nasturtij quoq; semen bibendum dabis ex aqua. Præterea potionem dabis, qui diapention uocatur, et hac ratione conficitur: Murræ, gentianæ, aristologiæ longæ, baccis lauri, rasuras eboris benetratas et cribratas æquis miscebis poderibus, seruabisq;. Exinde prima die unum coclearium cumulatū cū sextario uini ueteris, secūda die unum & semis, tertia autem die duo coclearia tepesfacto mero aspersa, & diligenti agitatione permista dabis ad cornu. Postea ex ceruice de matricali uena sanguinem detrahes, permixtūq; acerrimo aceto, omne equi corpus perunges, & contra pilum diligenter fricabis, ut ad similitudinem glutinis adhæreat. Tumentum quoq; in loco calido cōstitues. Si cibum fastidit, † æstate dūtaxat farinæ hordeacæ sextarium unum quinq; sextarijs aquæ permixtum equo dabis in potu. Triticeam quoq; farinā simili mensura & ratione offeres ad bibendum. Si autem fastidit, nō ideo aliud dabis, quousq; hoc ex ista necessitate sanitatem percipiat. De palato quoq; postea sanguinem detrahes, ut omni ex parte, si qua morbus prægrauare coeperit, releuetur. Scito nisi diligenter occurras, hūc esse periculosissimū morbum. Nam cito in suspirium, hoc est, anhelitum transit, & spem omnem salutis excludit.

Potio diapente.

† al. statim.

Cura morbi aridi.

Caput .XI.

Aridus uero morbus, qui & suspiriosus præcipue dicitur: & hic negatur à quibusdam posse curari, propterea, quod phibisi, quæ

A 3

homini

ARTIS VETERINARIAE

hominibus mortifera est, similis inuenitur. Quotidie enim macie crescit, exilior redditur, penitusq; siccatur. In omni autem ratione medicinae, facilius est quae abundauerint diminueri, quam quae uidentur deesse supplere. Salus tamen iumentis etiam in hac passione praestatur, si inter principia possit occurri. Sanguinem siccis detrachere contrarium est, Sed uino et oleo sufficienter admixto et tepesfacto, perungendum toto corpore animal est, Ita ut caput et maxillae, et extrinsecus fauces eidem largius infundantur, et contra pilum usque ad sudorem diutissime confricentur. Intrinsecus autem a prima die hac potione curandum est: Succum ptisanæ, adipem suillum remissum, et anilum ex melle passo quae decoctum per cornu in potione dabis, ut canalis gutturis eidem, maxillarumq; compago laxetur, quam siccitas astrinxerat morbi. Quo facto, in loco calido stabit. Infusum hordeum herbamq; uiridem, si inuenta fuerit, debet accipere, ut omni ex parte periculosa ariditas temperetur. Consequenter talis eidem potio preparatur: Passi optimi sextarium unum, iridis illyricæ unciam unam, piperis nigri semiunciam, croci scrupulum, mirrhæ (et trigonitis) semiunciam, pollinis thuris unciam unam, oua cruda quinq; pariter mixta prima die dabis ex integro, ita ut per triduum ipsam misceas semper et offeras, ut tam grauis morbi asperitas, potionis dulcedine mitigetur. Post hæc, melle, butyro, axungia, salibus, et (et paulcaophis) pro æqua omnium portione confectis, succo ptisanæ ac passo inuolutis, aditum animal replebis, et die prima quinq; pillulas, sequenti septem, tertia die nouem daturus ex more. Expensis autem his, nec ungere cum uino et oleo tepesfacto desit industria, nam amarissimus morbus cum sit, aliter non potest, nisi amaris potionibus solui. Contraria enim non nisi contrariis medicinis curantur. Potionem diapenten, sicut superius monstratum est, non solum per triduum cum uino, sed per dies plurimos dabis, ut tantum discrimen possit euinci. Quod si grauior tussis et strangulatio urgebit, accipe fabæ fractæ sextarium unum, seui caprini uncias tres, allij capita maiora tria, permixta decoques, et cum passo, uel succo ptisanæ hordeæ et tepidum dabis ad cornu. Quod si tardius profecerit ista curatio, fici siccae pondera duo diligentissime tondis in pila, scœnugraci sextarium

ariū decoques, quousq; aqua ad medietatem ueniat, post colabis, et fœnugræcum in mortario cum sicu conteres, allij quoq; uncias tres contundes similiter in mortario, et tam rutæ quàm apij fasciculos ternos: quibus oībus pariter mixtis diligenter tritis, addis dracontij uncias duas. Aqua in qua fœnugræcum coctum fuerit, superfundis, potionemq; facias quæ per cornu possit effluere: quam etiam tuſſientibus uel uulsis aut ruptis animalibus per triduum dabis. Sequens remedium ad aridum morbum: Inter nares iumentis scalpello secabis, et aquam frigidam per fistulam latam eius ori suppones, naresq; ipsius assidue diebus plurimis merges, ut suspirium distabescat in aqua. Potionem quoq; ei quotidie dabis huiusmodi: Succum ptisanæ cum seuo caprino decoctum, sextarium unum, sulphur, uinum, thus quoq; masculum æquis ponderibus deteris atq; commisces: ex eo coclearea singula diebus singulis cum ptisana permixta defundis ad cornu. Cum autem cœperit esse ualidior, de ceruice sanguinem detrahes, additoq; aceto animal perfricabis.

Cura morbi subtercutanei. Caput .XII.

Subtercutaneus morbus, cum humor pestifer intra corium et uiscerum commeat, hac ratione curandus est: Fistulam ei facies uel cauterium, inter armos eius et uentrem loco consueto ad mensuram incisa cute, die sereno, et si spacium est, luna minuente, indis ut mos est, per quā oīs ē uisceribus humor educitur, coloris aurei uel crocei, languoris tæbe corruptus. Quæ si minus traxerit, radicē herbæ tytimali eodem uulnere inseres septem diebus, quæ residuū uirus educat. Est et aliud remediū. Radiculā quā quidam cōsiliaginē uocant, quā pulmonaceā, quā multo medici frequēter et bubulci utuntur, in pectore aialis hac ægritudine laborantis eatenus pones, ut acuto cuprino circines locum. Postea corio perforato radiculam interferis, quæ ibidem sponte tam diu permanebit, quousq; cutis quatenus cuprino signata, in putredinem sit uersa, et à toto corpore ad illum locum humor trahatur, et per uulnus emittatur. Hinc potionem diapenten superius designatam, cum uino ueteri optimo, per triduum, uel si necessitas erit, per dies plurimos dabis. Apium quoq; uiride, et baccas.

ARTIS VETERINARIAE.

Et baccas lauri. uel istae res si non inuenirentur, lauri et cucumeris syluatici folia, per partes minutissimas concides, hordeoq; miscebis, ut animal sicut est potione diapenton, ita ex cibo sentiat medicinam. Huic tamen aquam tepidam cum farina hordeacea uel triticea dare te conuenit, et in loco tepido stabulare. Nam frigus humoris augmentum est, et reumatis. Cibum quoq; magis siccum quam uiridem in hac passione debet accipere, et exerceri uehementer, ut sudore siccetur humor infestus.

Cura morbi articularis. Caput XIII.

Articularis morbus his declaratur signis: Claudicabit alternis pedibus, modo prioribus, modo posterioribus, et quasi tumor eide in articulis circa coronas, uel certe in genibus apparebit. propterea quod pestilentia morbi corruptus sanguis, neruos et uenas implet, et laedit atq; debilitat. Huic sanguinem primo de ceruice, hoc est, de maxillari uena detrahes: quem aceto acerrimo permixtum, per totum animalis corpus induces, ita, ut illa loca, quae uexata sunt, diligentius ungas. quod creditur sanguis emissus est corpore, et corpori rursus cum aceto impositus, uita morbo sa siccare. Quod si uel in genibus, uel articulis se morbus ostenderit, de eisdem locis sanguinem detrahes, cui adicies cretam cinnamuliam, id est, albam, urticae libram, tres sextarios aceti, cimini triti libram, resinae fraxinae libram, picis liquidae libram, salis communis pugillum, steracis bubulinum recens quantum creditur posse sufficere: ex hoc ubicumq; tumor apparuerit diligenter saepius illinies. De palato specialiter sanguinem detrahes, ne contagio caput occupet. Ab armis quoq; deplendum est, si in prioribus pedibus claudicatio apparuerit. Vel certe de coxis auferendus est sanguis si à posterioribus coeperit claudicare. Dabis quoq; ei potationem aduersus omnes morbos probatissimam: Centauream, absinthium, peucedanum, serpillum, sagapinum, betonicam, saxifragam, aristologiam rotundam. haec omnia aequis ponderibus tondes diligenter et cernes: si febricit animal, cum aqua: si uero non febricit, cum uino optimo dabis, ut singulis diebus per sextarium uini uel aquae tepidae cocti praedicti medicamentis singula maiora coelearia plena et cumulata commisceas, et per fauces diges

**Potio probatissima
contra omnes morbos.**

ces digerat, ut amaritudinem morbi herbarū amaritudo compugnans possit expellere.

Cura morbi farciminosi. Caput .XIII.

Farcimosus autem morbus à similitudine farciminis appellatus est: quia uelut per fistulas quasdam inter cutem & carnem corruptus humor emanat, & per totū corpus collectiones plurimas facit, et alijs uelut inuentibus aliæ rursus nascuntur. Sed passio licet contagiosa sit, facilius tamen inter principia curabitur. quia interna eorū adhuc sana sunt, sed corruptus humor ex morbo, inter cutem & carnem uersatur. Huic tamen in initio tantummodo, antequā incipiat marcescere, aut in fine, cum iam bene fuerit reparatū, detrahendus est sanguis. Nam in media passione si flebotomia uti uolueris, ægrotū animal nequāq; curabis. Sed collectiones quasq; fecerit, inuri rectis cauterijs cōuenit: & ut efficacius prosint, cuprinis cauterijs est utendū. quæ uulnera pice liquida, admixto oleo & melle, curantur. Potiones catharticas, uel nimis amaras debet accipere, id est, diapenten cū uino, sicut superius dictum est, quæ ad omnia genera morborū animalium efficaciter prōdesse consuevit. Præterea radices ebuli lib. i. infundis per triduum sextarijs tribus uini optimi. Post semunciā optimi aloes, cētaureæ unciā. i. opopanacis unciā. i. diligentissime teres, & de illo uino, in quo ebuli radices infusæ fuerint, sextariū. i. mites, & tepidum per cornu dabis. Quā mensuram triduo custodire te conuenit, ut etiā per uentrem huiusmodi catharticis potionibus digeratur humor infestus. Quē exercere in cursu, quousq; ad plenum sudorem ueniat, sæpius conuenit: & curatum obseruatione prædicta, in pascua mites, ut diu noctuq; æstiuo tēpore sub diuo & libero aëre pascatur, quatinus & uarietate herbarum oblectatus, & solis calore siccatus, rursusq; noctis aura & rore contactus, facilius digerat morbum.

Cura morbi subrenalitis. Caput. .XV.

Subrenalitis morbus, ut periculis plenus est, ita ad intelligendum aptissimi inuenitur. Nam renes iumentis occupat atq; dissoluit. Propter quod animal in primis partibus alacre, posteriora trahere consuevit. Huic hac ratione succurratur: De utroq; latere, uel de femore incisus competenti loco uenis, copiosus sanguis emittatur, qui acri aceto permixtus, p

B pus, &

ARTIS VETERINARIAE

pus, & præcipue super renes animalis inducitur. Potionē notissimā diapente ad cornu per os debet frequenter accipere. Sed & per anū calidissimis speciebus clysterij ingestioe curandū est. aloes unciā 1. pyretri unciā 1. euphorbij unciā semis, pulegij bene triti unciā 1. baccarū lauri unciā 1. castorij semis unciā, seminis sinapis uncias 3. salis triti heminā: hæc oīa diligenter cōtusa in tres diuides partes, & diebus singulis cum aqua, in qua surfures tritici decocti fuerint, tepida, sicut curæ exigui ratio, quasi singulos semisextarios clystere per intestinum aīalis infundis, ut calefactis intrinsecus renibus, resolutus humor possit per uentrē cū stercore euiti. Præterea lumbi ipsius oleo laurino uino calido permixto confricandi sunt uehementer & sepe, ut de foris & intrinsecus acerbissima passio possit euinci. Cauteria quoq; renibus imponuntur, ut uis morbi ignis ardore siccetur. Danda quoq; est potio octo specierū decocta, cuius in articulo morbo fecimus mentionem, quia in omnibus efficaciter prodest.

Cura morbi Elephantiosis. Caput .XVI.

Elephantiosis morbi causa superius est indicata, cui talis est adhibenda medicina, ut non extrinsecus uret nem uel uulnuscula ipsius curare tentemus. Nam morbus refugiet intus, & penetrabit uiscera, ac periculum gignet. Sed primū de matrice tollendus est sanguis, & acri aceto cōmiscendus; ac toto inducendus est corpori. Postea de palato, & si uires permiserint, de cæteris locis quæ morbus infestat, pro modo & tempore minuendus est sanguis, & cum aceto rursum imponendus. Pulli autem à matre depulsi, & ad stabula religati, præcipue solent hūc morbum incurrere. quia digestio cibi, qua in pascuis utebantur, primæ exercitationis aufertur, & nondū ad residendū robusti, ad præsepia stare coguntur. Elephantiosi morbo, & omnibus mallei passionibus non solū diapente, cuius experimētis indubitate sunt uires, & sine quo Mulomedicus mutilus est, sed hæc quoq; potio præparanda atq; seruanda: Mirræ trigonitis librā 1. thuris masculi lib. 1. corij malipunicis lib. 1. piperis unciā 1. croci uncias 6. acaciæ rufæ selibrā, absinthij pontici selibrā, serpilli libram 1. betonicæ librā 1. centaureæ libram 1. sagapini uncias 3. saxifragæ uncias 6. tensedoni uncias 6. hæc omnia tusa & bene cribrata cū melle optimo decoques, et in uase uitreo uel stagneo recondita serua
bis nam

bis. nam per uetustatem magis ualet. Ex quo medicamento singula cochlearia cumulata singulis animalibus morbidis cum sextario aquae calidae & tribus uncijis olei optimi permixta per triduum dabis. Vbi proficere coeperit, cum uino optimo & oleo dabis (sicut dictum iam est) cochlearia singula continuis diebus. Ex qua potione non minus quam diu pete quolibet morbo correpta animalia liberantur. Pulli tamen beneficio etatis euadunt facilius: saepe incurati moriuntur.

Causae & curae generales morbi mallei. Ca. XVII.

EA quae ad morbi mallei execrabilis curationem pertinebant, abundanter constat exposita, sed tanta uis ipsius morbi est, ut nihil expediat omitteri. Nam gregum in pascuis funestus interitus, animalium quoque in stabulis mortes innumerae ex ipsius contagione proueniunt, & ab imperitiis uel negligentibus curam, aut diuinæ iracundiae imputatur aut fato. Denique sicut supra declaratum est, ab uno animali incipit ipsa perniciēs, & festinanter ad ceterorum transit exitiū. Propterea semper sunt separanda in quibus suspitio tantae pestis coeperit apparere, usque eo, ut etiam corpora mortuorum animalium quae ab illo morbo intercepta fuerint, exportanda sint ad ea loca, per quae aliorum animalium transitus non sit, & profunde obruenda sub terra. Nam & uiuorum, quae corrupta fuerint, & mortuorum foetidissimo odore, sana primo iumenta corrumpuntur ac pereunt. Cuius morbi causas plurimi Mulomedicinae auctores reddere tentauerunt; asserentes ex nimia lassitudine cursus uel saltus uiolenter extorti, aut ex calore aestatis, uel frigidityte hyemis, aut si uolentes emittere lotium, non sinantur, uel si hordeum sudantes acceperint, et si post cursum calidi biberint, et si plena uestica uel post potum cogantur ad cursum, aut foenum comederint, hordeumque corruptum. Ex his uel huiusmodi causis malleus morbus consuevit generari. Vitanda quidem sunt ista omnia, nam ex his periculosa aegritudines iumentis saepe proueniunt. Malleus autem morbus ex aeris corruptione praecipue descendit. Nam Austro & Africo uento flantibus, interpositis annorum spatijs, recursu (ut asserunt) catastematis, sicut certo tempore homines pestilentia corrumpuntur, sic animalia ille aer corrumpit & perimit. Vnde probatissima & plures necessariae sunt potiones, quae aduersum tantam uim prestare ualeant salutis auxiliū. Quarum praeter superiorem iam pagina comprehendimus, praeter ex omnibus auctoribus collectas consequenter adiunximus.

B

a

ciēs ad omnes

ARTIS VETERINARIAE

ad omnes generales morbos. Semen cucurbitae aegyptiacae. i. colocynthidem
quantū acetabulum capiet, frangis & conteris, addita uini optimi hemina
una, quod diligenti agitatione permixtū linteolo colabis, & per dextrā iu
menti nares infundes, ut peruenire possit ad uiscera. Quae compositio ad dy
senteriam plurimum prodest. Alia quoque uilior, sed non minus apta cura
tio est; Radices cucumeris syluatici uirides contundes, et in aqua nocte una
macerabis, deinde sublatas cōtundes & colabis, ex quo succo tria cochlearia
cum nitro trito permixta, cū uino, si animal sine febre fuerit, tepesfacto quoti
die faucibus ingeres, ita ut septem diebus continuus curare non desinas. Ni
trum quoque bene tritū, & cucumeris syluatici radices minutatim concisas,
addita hemina uini tepidi, in hordeū bene purgatum animali languētī ad pa
bulum infundas, ut non solum potum, uerū etiā pabulum medicamentū tem
peratum faciat ad salutem. Item aliud. Radicem ebuli, & radicem urticae
aequis ponderibus minutim incisas, & infusas in liquamine optimo macera
bis, colabisque per linteū. ex quo mensura unius oui tepesfactum per nares ani
malis triduo digeres. Consequenter ita facturus, ut iumentū quod morbum pa
titur, hordeū cū apio & cucumere syluatico minutatim inciso, semper acci
piat, cōtusumque ipsum agrestem cucumerē, & aquae sufficienter admixtum,
bibere cogatur. Laudatur etiam haec potio. Herbae sauin. lib. 1. trixan
gini uncias tres, centaureae uncias 2. aristologiae uncias 4. baccarū lauri un
cias 4. murr. uncias 4. omnia contundes & cernes, & in puluerem minu
tissimum rediges, & cū necesse fuerit cochleariū magnum plenū cum sexta
rio. i. uini tepesfacto faucibus tedeantis infundes. Haec quoque aduersus oēs
morbos medicina succurrit, si quatinus uires patiuntur, interpositis diebus,
cū praescriptis minutionis obseruantijs, primo de ceruice, post de palato, &
in quibuscumque locis se († humor) ostendit, ut si in facie de capite, si in primis
partibus de armis, si in posterioribus de coxis sanguis est auferendus, & cū
aceto miscendus, ex quo animal perfricetur. Cui haec per triduum potio dabi
tur: Pannaces radicum uncias tres, yringij radices pōderis tanti (yringion
autem herba melior est, quae in littore uicina marinis fluctibus nascitur, car
do syluestri pene similis, flore galbino, cuius eruendae sunt radices, nā lon
gus penetrare dicūtur) feniculi quoque seminis uncias 3. aloes uncia una semis
contusa & cribrata in tres particulas diuidentur, & cū fracti & moliti tri
uci far

af. † morbus.

tici farinæ sextario candenti aqua misceatur, & ad cornu per fauces triduo animali infundantur. Pelagonius aduersus omnes morbos efficacissimū puluerem credit esse, si pullū ciconie nondum adhuc stantē, sed iam plumas habentem uiuum in cacabū mittas, & gypses, perustumq; uapore furni, in puluerem redigas, & tritum uirio uase custodias, grāde, cumulatūq; cochlearium cū uini sextario animalis faucibus infundas, donec recipiat sanitatem. Chiron uero Centaurus præter alias cōpositiones quæ iam relatæ sunt, asserit catulum lactantem uiuū in aqua feruenti missum ac depilatū ita decoqui ut ossa separentur à carne: quibus diligenter ablatis, eius caro cum aqua in qua decocta fuerit liquamine optimo uino ueteri & oleo & pipere cū melle condita usq; ad sextariū debere seruari, ac singulis animalibus binas cotylas tepesfactas, donec ad sanitatē perueniant, diebus singulis dari debere per fauces. Caput quoq; hædinū, omne sūq; pedes depilatos ad caldarium eadē ratione, qua catulū, excoqui, ablatisq; ossibus condiri, & binis cotylis per diē in potione per cornu sæpius datis, animal morbidū liberari. De gallo quoq; gallinaceo albo, eadem quæ de catulo obseruanda demonstrat. Radicem quoq; herbæ tithymali decoctam cum uino dulci dare morbidis animalibus suadet. Ei quoq; animali, quod profluuiō attico cœperit laborare, ita ut uiridis ei uel pallidus per nares humor erumpat, ex lotio humano aut arietino duas cotylas cum uino, & cyathō olei rosacij putat esse miscendas, & pnares, quæ humorem funestum egerunt, digerendas. Quam curationē & pulmoni sanitatem, & naribus siccitatem præstare confirmat.

Potio anniuersaria physica. Caput .XVIII.

Pro physico autem & anniuersario remedio tradidit ulpicum beticū uel allium maius, quod quidam gallicum uocāt, capitella singula cū singulis semiuncijs sagapini, & singulis cyathis olei optimi diligenter trita, singulis aquæ heminis oportere misceri, et heminas singulas per caput animalium dari octauo Kalendas Iulias, hoc est in initio caniculariū dierū, septimo & sexto; quo factō, trinis potionibus stagnata, ut dicuntur animalia armentina uel domita integro anno à morbo intacta seruari.

Compositio suffimētōr cōtra malleū. C. XIX.

Ad uersus morbū malleū, cuius diuersæ sunt species, quæ in potiōibus

B 3 tam per

ARTIS VETERINARIAE

tam per os quam nares dirigendis, uel chystere, quæq; in cauterijs uel flebotomia faciēda sunt declaratū est, sed restat alia nō minus necessaria efficaciorq; curatio, quæ suffimentorum genere & odore præstatur. Nā cū ipsa tabes ex corrupti aëris foetore nascatur, et usq; in pulmonē & uiscera penetrādo descendat, nō minus austeritate odoris, q̄ potionū amaritudine cōsueuit expelli. Pro numero itaq; aīaliū eliges locū humilē ex omni parte clausum, in quo induces aīalia iā ægotātia quæ curare desideras; uel adhuc sana & separatim quæ nō uis morbi contagione perfundi. Origanū asium, mentam, asphaltum, peucedanum, castoreum, & opopanacem, æquis ponderibus permisceas, & exinde quantum tribus digitis cleuare poteris in carbones uiuos mittas, animalumq; os & caput super fumum tenebis, ut austeritas odoris per os & nares intrinsecus ingressa, omnia compleat, & ad pulmonē usq; penetrādo perueniat, & præstet animalibus medicinam.

Alia compositio uehementior ad lustranda animalia,
quæ & fascinum tollit. Caput .xx.

Est & alia compositio suffimentorū ad morbos prohibendos, sumptuosior quidem, sed putatur utilior. Sulpharis uiui libras 2. bituminis iudaici lib. 1. opopanacis uncias 6. achanti uncias sex, galbani & castorei, yreos crudi aī uncias 6. salis armoniaci uncias 2. salis capadoces uncias 3. cornu ceruini, lapidis gagatis masculi, lapidis gagatis foeminae, aī uncias 3. lapidis ematitis, lapidis sideritis, lapidis argeritis aī uncia 1. equuleos, id est caballiones marinos numero septē, caudas marinas, ungues marinos aī numero septem, uue marinae uncias tres, medulle ceruinae, cedrei, picis liquidæ aī pondera tria, ossa sepia numero vij. auri semiuncia, ballucæ siliquæ: hæc uniuersa cōmixta atq; succēsa, odore suo morbis tā hoīm q̄ aīaliū resistūt, et demones fugāt, grādines prohibere, et aērē defecare dicūtur. Sed si memoratos lapides aut inuenire nequiueris, aut enormitate pretij ab emptiōe cessaueris, reliqua efficaciter profunt.

De ratione flebotomi. Ca. xxxi.

Medicina oīs aīaliū, uel si uerū querimus, etiā hoīm, nisi rationē curationis ante cognouerit atq; prædixerit languētibus piculū, errabit frequenter. Exposita enim curandi ratio, & cum genere congruēs passionis

passionis, indubitatē praeſtat auxiliū. Ideoq; pluribus mēbris ac morbis generale remediū diligenter oportet exponi, qđ praeſcipue in ſanguis detractiōe conſiſtit, ſi rationabiliter pro tempore & uiribus animalū, et pro aequitate pfecti mulomedici adhibeatur industria. Qui ſi ignarus fuerit huius ratiois, nō ſolū p detractiōē ſanguinis nō curabit, uerū etiā piculū iumentis frequētiſſime generabit. Nā cum uita uirtuſq; aīantiū conſiſtat in ſanguine, ruſſus tēpeſtiue detractus ſanguis corpori praeſtare adſolet ſanitatē. Cuius rei talis redditur ratio. Sanguis enim ciborū humorūq; indigeſtiōe corruptus, p mēbra diſcurrit, et languorē dolorēq; aut uniuerſo corpori, aut ceriſ qbusdā partibus conſueuit inferre. Nam per cōſtriſtionem neruorū, uenarūq; tenſionem, inflatio, indigeſtiōq; generatur: quae tenſura (ut ita dixerim) corporis aliter laxari, niſi p detractiōē ſanguinis nō poteſt. Vnicū enim cōpendiū atq; remediū eſt, corruptionē illā quae nocet, et quaſi infeſta tabe aegritudinē uel periculū gignit, cum ſanguinis ipſius uitioſa parte detrudere.

Quē diligentia adhibeatur in ſanguinis detractiōe. Caput .XXII.

Hinc pleriq; ueris tēpore quotannis de ceruice iumētis ſanguinē demere, & ſic in herbā mittere neceſſariū putāt, ne ueteri corruptoq; ſanguis nouus admixtus natura caleſcēs, debilitatem, ualitudinisue periculū faciat. Veteres autē, prudētioreſq; authores abſq; neceſſitate depleri animalia uetuerunt: ne conſuetudo minuēdi, ſi tempore aliquo facta nō fuerit, ſtatim intra corpus morbū ac ualetudinem generet. Rectius ergo eſt minoris etatis animalibus & bene ualētib; ex nulla parte corporis ſanguinē detrahi abſq; palato: de quo aſidue tā minoribus, q̄ maturis detrahendus eſt humor, ut caput, oculi, cerebrūq; releuētur. Maturis uero aīalibus nō incōmodū eſt pulſare uenā cū mītiūtur in pascua. Illa tamē in omnibus, q̄ deplendi ſunt, conſeruanda eſt conſuetudo, ut pridie quā uena pulſetur, ſubſtententur leuioribus & parcioribus cibis, ut per diaſtema compoſito corpore ſint, non turbato per indigeſtionem. In ſolo autem aequali ſtatues iumentū, ceruicemq; illius loro cingēs, quo ſtriſtiſſus ſuper ſcapulas tangatur, ut uena poſſit ab aliquo clariſſus intueri. Tunc ſpongia cum aqua uenam ipſam lauabis, & ſepe deterges, ut altius emineat. Pollicem quoque ſiniſtrae manus

ARTIS VETERINARIAE

manus interius deprimes, ut non ludat, sed tumidior atq; inflator uena red-
datur. Consequenter iuxta præceptum artis, uel animalis ipsius positionē,
sagittam dari calibis exiges cotibus bene acutatam. Obseruabis quoq; ne al-
tius imprimas manum, & gulam atq; gurgulionem rumpas, & arteriā præ-
cidas. Hoc enim uitæ consuevit inferre periculum. Percussa uena, foenū uel
farraginem ad edendum apponas animali, quatinus agitatione maxillarum
per uenā melius erumpat sanguinis impetus. Cū aut niger uel corruptus hu-
mor egeretur, uel coeperit manare purior, statim iumentum tolles à cibo, &
imposita fistula uenæ plagam astringes. In plaga uero pitaciū imponas, ut di-
ligentius claudat, licet quidam utantur & creta. Deinde in tenebroso loco
& calido statues iumentum, & farraginem si tempus est, uel foenum molli-
mum dabis septem diebus ac noctibus. Aquam etiam offeres, ut si uoluerit bi-
bat. Sed trititia farrago hordeaceæ præfertur: quæ si defuerit, hordeaceam
dabis. Memento etiam quod ea melior sit, quæ uicinior marinis fluctibus fue-
rit. Propter quod uentrem facilius soluit, humoremq; deducit. Pulsata etiā
quocunq; loco uena, omnem sanguinem diligenter excipies, & aceto oleoq;
permixtum, uel alijs medicaminibus quæ ratio deponit, animalis ipsius cor-
pus perunges, præcipueq; illum locū, ex quo detractus est sanguis, & qui
esse putatur in causa. Constat enim, naturali quadam ratione atq; beneficio
(ut quidam aiunt) ipsum sanguinem, cum superfusus est languentibus mem-
bris præstare medicinā, uitiumq; siccare. Quam curatiōis sollertiā nō opor-
tet omitti. Præterea interpositis diebus post flebotomiū animalia producuntur
ad solem, & sanguis detrahitur eis de palato. Despumantur etiam tertio gra-
du à dentibus caninis, quos oportet suspendi altius propter sanguinis fluxū.
ita ut ea die molliſſimis cibarijs utantur & furfure. Sequentibus aut diebus
non ex integro hordeū consequantur, sed à uilibus incipiant, & ad consuetu-
dinem per singulorum dierum augmenta perueniant. Consequenter tepido
die ducantur ad mare uel fluuiū, diligenterq; loti tergantur. Vino quoq; &
oleo in sole perungendi sunt diligenter, & confricandi, ut corpora eorum ca-
lescā aut repellant, aut perferant perfricationis iniuriam. Quibus perſe-
ctis equinobiles tunc demū ad labores cursusq; itineris reuocentur.

S Castrata animalia nō deplenda. Ca. XXIII.
Sciendum est præterea, castrata animalia nunquam oportere depleri
causæ

causa herbae, quae iam partem uirium cum testibus amiserint, et si depleta fuerint, uehementius eneruantur. Hinc est enim quod asinis non detrahendus est sanguis, quia naturaliter minus habent sanguinis, gracilioresque sortiti sunt uenas.

Admissum facientes non deplendos. Ca. XXIII.

Admissarios etiam equos flebotomare non est opus: partem enim uirium et sanguinis in coitu natura digerit. Si tamen ab admissura cessauerint, nisi annis omnibus herbarum tempore depleantur, incidunt in cecitatem, quia id quod coitu digerere consueuerant, declinat in oculos.

In quibus passionibus, & ex quibus locis sanguis auferendus est. Caput .XXV.

Nunc ne quid relinquatur ambiguum, in quibus passionibus, et ex quibus locis sanguis emitti debeat indicabimus. Morbidis et quibuscumque totum corpus in causa est (sicut febrientibus, unde infra dicendum) de matrice detrahendus est sanguis. Cephalargicis autem, arpiosis, insaniis, cardiacis, caducis, freneticis, bistrutitijs, sicardicijs, rabiosis quoque modo praecipitur de auriculis sanguinem demere. Verum tamen melius est de temporibus, quae in dextra ac sinistra sunt parte, detrahatur, id est, sub cauitura temporum tribus digitis ab oculo interpositis inferius uena perquiritur, et ex utraque emittitur sanguis. Eis uero quibus suffusio contingit oculorum, uel cetera uitia quae oculis nocent, inferiores uenae sub oculis posita, quae descendunt sub angulis oculorum inferioribus, quatuor digitis inferius quam oculi sunt, inciduntur. Quibus quidem fastidium inhaeret, uel arteriarum uel faucium tumor, uel praegratio capitis, de palato auferendus est sanguis. Quibus autem pulmo est in causa uel iecur, uel cetera quae his uicina sunt membris, de pectore minuendus est, ex uenis quae posita sunt in dextra ac sinistra, ubi brachio la coniunguntur, et flexura fit cum armus plicatur. Quibus quidem armus est in causa, de brachiolis sanguis minuatur; quae uenae posita sunt interius, ubi centuriae, id est, musculi brachiolares sunt, sex digitis superius quam genu, tribus uel duobus digitis inferius quam centuria. Haec uenae sagitta percutiuntur, sed caute modesteque tangantur, propter debilitatem animae. quia haec commixtae sunt nervis. Quibus autem articuli in causa erunt, uel si articulus inferius uel intortus fuerit, uel aut aquatilia habuerit, uel quiduis simile in articulis contigerit, de

C subcirro

ARTIS VETERINARIAE

subcirro sanguis subtrahi debet: quæ uenæ posite sunt inferius quàm articuli tribus digitis sub coronâ. quæ uenæ cum summa cautela tangendæ sunt, quæ articulo coniuunctæ sunt neruis. Creiaco uel si basim mouerit, de coronis rectis tollitur sanguis.

De his quibus sanguis in ungulam tollitur, alis, qui ungulam cogunt uel eiecerint, quomodo sanguis tollatur.

Caput .XXVI.

Quibus aut iumentis uel suffusionis uitio, uel p uoluntate ex cruciata ungula fuerit, uel qbus remorata basis longi temporis claudignem fecerit, eiusmodi curatiõe sanatur. Componis omnem ungulâ quasi ad uiuû, ad lidesq; uirantiû, hîc suffraginẽ illius alligatâ lino uehemẽter stringes, totûq; simul ungule solû in circuitu scalpelletur, et circûgyrabis ut à corona ungula subleuetur ex pte, tûc circûcisorîû inferes inter unguẽ & solû, et cû bene elimpidaueris, suffraginẽ soluis, et inuenies de calcaneo uenas fluere, et cû sufficiẽter effluerit cruor, sale pfricabis, postea aceto et oleo inunges, et linteolis munies diligenter. Sparciâ calciare curabis, ut post egestionẽ humorû ungula reparetur. Huiusmodi aut curâ nûq; nisi singulis pedibus adhibere debebis, ut in tanto dolore aial duret ac stet. Si aut in alio pede similis est causa, cû in illo q prius curatus est, firmiter aial stare coepit, tûc eû elides, & ut dictû est, simili obseruatõe curabis. Si uero in his causis aial cremare uolueris, semissabis illud hoc modo. Compones ungulam eius ad uiuû, et cõtra uenâ addita sagitta ptûdis, ut possit sanguis acõtizare p solû quod sagitta ptuderit. Sili aut modo sale fricabis, oleoq; et aceto, linteolisq; munibis, dum max singulos pedes, ita ut portare se possit. hi plane q semissatur nõ eliduntur

Epistomicis, uulsis, colicis, strophosis, & qui morbo subrenali tenentur, unde sanguis tollendus est.

Caput .XXVII.

Epistomicis, uel qui morbo subrenali leduntur, uulsis etiam, colicis, & quibus uenter frequenter dolet, de cauda sanguis emittitur, licet melius putetur propter huiusmodi causas ortas de uisceribus debere sanguinẽ tolli. Quod si de cauda tollere uolueris, sic facies: Erige et resupina caudâ ad lumbos

lumbos, quatuor digitis ab ano ubi pilos nō habet cæde caudam cū tabula ali qua nō ponderosa, quousq; se uena demonstraret, & in caudæ media diuisura quatuor digitis ab ano sagitta percuties uenam, ut acontizet sanguis, post de cursionem fasciola colligabis. Cum autem de uisceribus emittere uolueris, sub inguibus de dextra sinistraue in singulis femoribus eminentes uenas medias sagitta pcuties, post decursionem sanguinis cretam impones, sed caute, pro pter uicinā mixturā neruorū. Si lacæ in gambis fuerint, aut aliq; dolor co xæ uel gambæ, sanguis detrahatur gābis: sunt enim uenæ à uisceribus descen dentes p gambas interius, quas medias propter uicinā mixturā neruorū cau æ transuerso flebotomo percuties, & post decursionē fasciola ligabis.

De ratione foci atq; cauterij. Caput .XXVIII.

IN animalium curis ac medicinis duplex remedium authores esse uolue runt, Minutionem sanguinis, per quā constricta laxantur, & Vstionem cauterij, per quod laxata firmanantur. Sed cū flebotomi ratio euidenter ui deatur exposita, Cauterij quoq; licet nouissima cura sit, apicēda uidetur utili tas. Nā adustio laxata cōstringit, inflata attenuat, humectata desiccatur, coagu lata soluit, fārcinomata præcidit, ueteres dolores emēdat, alienatas corporis partes ex qualibet causa ad statū suū reuocat, sup naturā excreſcētia, subla ta, et adusta crescere nō patitur. Nā cū candēre ferro rupis cutē, uitiū oē con coquitur atq; maturatur, et beneficio ignis dissolutū, p forāmia q; facta sunt ef fluit cum humore. atq; ita sanatur passio et tollitur dolor. Post q; cicatricibus clausis, cōstrictior et robustior redditur locus, ac prope insolubilis cutis. Sci endū uero cuprina cauteria plus effectus ad curandū habere q; ferrea. Præ terea si in capite morbus est, inuritur ceruix: si subrenalis est, lūbis ignis ad hibetur. Interdū aut puncta infiguntur, interdū ad similitudinē lineæ candēs deducitur ferrum, aliquando uelut palmulæ fiunt. In hoc enim laudatur Mu lomedici ingeniū, si ita animal cauterio curauerit ne deformet. Pro locis aut in quibus est passio, & pro pellis æstimatione cauteria uehementius imprimuntur aut leuius. Memoria aut retinendū est, † quassaturas, emota uel extorta, aut alis † fracturas eiecta de locis suis, uri penitus nō debere. nā ppetua debilitas cōsequitur. sed me lius est cū locis suis reposita fuerint, & ligaturis diligētius cōmunita, atq; ita nature industriæq; beneficio cōroborata, colasticis unctiōibus et malagmis, C a postremum

ARTIS VETERINARIAE

postremū causticis eadem percurare ad spem perpetuæ sanitatis. Quod specialiter ad nonendū est, ne Mulometici festinantes, dū fūco curare cupiūt, animalia debilitent aut deforment, cū flebotomis, potionibus, unguentis, syringis, medicaminibusq; diuersis ante sit temprand. curatio, & si nihil profecerint, ad extremum ignis adhibetur.

De passione & curis febrium. Caput .XXXIX.

Quæcumq; passionēs plus iumentis periculi inferre consueuerunt, & difficilioribus obscurioribusq; indigent curis, has primo amplectimur libro, ut et facilius reperiatur quæ in exordijs ipsius occurrēt, et legentibus fastidiū nō possint adferre. De curis quæ prima sunt. Febrientibus itaq; aīalibus primū cōuenit subuenire. Nā nō amplius q̄ triduo caloris uim sustinere posse creduntur. Intra quod si curata nō fuerint, moriuntur. Oportet igitur prius passionis huius signa causasq; prædicere, & mox medicinas exponere. Febriens iumentū deiectū caput ē terra alleuare uix poterit, erit oculis apertis, labijs demissis, tristitia turpis & grauitas totius corporis insequitur, testiculi tumidiore laxius pendent, membra caloribus feruent, uenæ uehementi pulsu saliant, anhelitusq; creber & calidus, tussis assidua, incessus nutans, fastidiū cibi, bibendi cupiditas, uigiliæ iuges. Causa aut huius passionis ex magno labore et fatione est, si negligentia cōsequatur. Interdū estu nimio, aut perstrictione uehementi, uel ex cruditate ciborū, aut sudoris subita infrigidatione, uel ex feruore hordei nouelli euenire cōsuevit. Curatio aut ista solennis est. Continuo sanguinem eis de facie, uel de temporibus, aut palato oportet emitti, ab omni esca prima die penitus abstineri, fœni optimi aut herbe uiridis subinde pusillū offerri oportebit, & quiescere etiā ab omnibus rebus, & etiā sequestratū temperato tpe, et inambulationibus leuibus aīal cōmoueri, calidis quoq; locis coopertū stabulari. Cū cœperit melius esse, herbam minutatim concisam porrigito, quæ si defuerit, hordeū maceratum, ablatiisq; suis folliculis tufum in modum ptisanæ paulatim offeratur et frequenter exigui.

De lassitudine quæ uidetur febribus similis. C. XXX.

Plerunq; aut equi ultra uires ad cursum coacti, aut ponderibus grauati, ac sudore defecti, similia febricitantibus signa demonstrant.

Quo.

Quos sic intelliges: Oculi sublachrymantes erunt, et tanq̃ subfusi sanguine, præterea spiritū crebrius agitat, scœnumq; fastidit, et de posterioribus pedibus melius se sustentabit. nā primos quasi subitios tardius ponit.

De febribus internis. Caput .XXXI.

Quod si febris interna fuerit non facile aīal dormiet, et quotidie deterius fiet, interdū furunculos in dorso uel in lateribus habebit. Scias eum à morbo qui superius disputatus est malleus, detineri. Cui lotiū aliquot dierum tam hoīm quā arietum per nares infundes. Et sic potiones quæ de isto morbo suprascriptæ sunt, dabis.

Si in autumno febrierit. Caput .XXXII.

Si autem autumnī tempore cœperit febrē iumētum, statim de ceruice sanguinem detrahes, uel gradu tertio de palato; post herbæ trixaginis sextariū, draganti, rosarum atq; unciā i. in pila lignea pistabis, cernesq; subtiliter, ex aqua cū mulsā et oleo potionabis, atq; ita restitues sanitatem.

Si in æstate febriat. Caput .XXXIII.

Si autem æstate febrē cœperit, totū sudabit, sataget salientibus uenis, mincturam et naturam simul dimittere, ad terrā transuerse ambulabit. De coxā media quatuor digitis ab ano uenam ingris, et ex ea sanguinem detrahes. Si autē nō inueneris, de ceruice tollendus est. Cui hanc potionem pro tempore dabis: Herbam portulacæ plenā manū tundis, succūq; eius cū dragante et thure, et succo rosæ campanæ mulsā addita offeres, potionem non satis grandem ne plus quā oportet infrigides: quia cum quasi plene carat simul et defēctione sanguinis calore priuatur.

Si hyeme febriat. Caput .XXXIIII.

Hyeme uero si febrierit, supradictas species aridas contūdito, diligenterq; misceto, et per sinistram narem dato, sanitas consequitur. Febrientibus autē hæc potio utilis traditur: Mannæ thuris uncias ij seminis, yrisillyricæ uncias 6. piperis unciā i. baccarū lauri, seminis apij atq; unciā i. cū passo potionabis. Item post detractiōē sanguinis de matrice aut de palato sic potionabis febrientē: Hysopi librā unam, abrotani uncias 6. la

C 3 Etis cap

ARTIS VETERINARIAE

Etis caprini sextarium, amili cyathum, olei optimi uncias 3. herba urciolaris succi cyathum unū, misce cū ceteris, & per cornu faucibus infunde, erit salutare remediū. Item alia potio. Lactis sextariū, olei cyathos 2. croci scrupulū 1. mirræ 2. appij seminis cochleariū plenū, miscebis piter, et dabis ad cornu. Hyeme farinā triticeā cū aqua tepida, æstate aut farinā hordeaceā cū aqua frigida dabis in potū. Si febrient mensuram nō des, iliorū aut loca cauterio inurenda sunt, & usta curāda. Item alia potio. Lactis caprini heminā, amili cyathū, oua 4. olei cyathū, succū herba urciolaris quotidie potū dabis usq; ad sanitatē. Item unctio qua pfricandi sunt febrientes. Rosæ librā, olei ueteris librā 1. acetū heminas 3. lactis caprini librā semis, portulacæ seminis et nucis amaræ atq; uncias 6. menthæ uel rutæ quantū expedit. s. teres et com-misces, et tepefacto utere, ita ut diutissime confrices contra pilū, et in loco tepido unctū aīal coopertūq; statues.

Item potio alia si hyeme febrierit.

Gentianæ unciam unam, aristologæ, hyssopi, absynthij, abrotani, singulorum unciam unam, caricarum uncias 6. seminis apij uncias tres, rute fasciolum 1. omnia in cacabo cum aqua decoques ad tertiam, & cum nigrescere uideris, coctum est. Exinde uini heminam misceto sicut suprascriptum est, & per cornu faucibus infundito.

Si ab indigestione uel pletura febriat. Ca. xxxv.

SI quod iumentū ab indigestione uel pletura febricitauerit, naribus spiritum ducet, & illa frequenter agtabit, anhelitusq; erit feruēs et aridus, spinam facilius flectet, nam qui ex perstrictione febrit, rigidus est: quia calor membra dissoluit, frigus astringit. Ex pletura igitur febrienti, copiosus sanguis emittitur de ceruice, nares aceto pfricātur ut sternutet sæpius. Venter quoque febrientis si durior fuerit, per anum iniecta manu, stercus extrahatur, à cibo abstineat, paucissimum potum per interualla suscipiat, & unctum suprascripto medicamine, diuq; fricatū, loco stabit calido horis tribus aut 4 cooptū, postea ad ambulandū producet, nihilominus inuolutū.

Si ex uulnere oris aut faucium febriat. Ca. xxxvi.

SI quando ex uulnere aliquo uel suppuratione oris aut faucium nascitur febris, de temporibus, nec non etiam de palato detrahendus est sanguis.

De max

De maxillis quoq; siue de ceruice, & ad postremū quicunq; locus febrienti doluerit, ex eodē cum mensura sanguinem oportet auferri. Quod si cibū penitus respuerit, farinā aquā mixtā ad cibi instar faucibus eius infundes. Offas quoq; de passo facies iustæ magnitudinis, et septenas cū oleo digeres, ut possit habere substantiā. Ita deniq; febrienti ualis est, ex quacūq; pte detractio sanguinis fiat, si consideratis uiribus animalis mēsurā seruetur. Nā ut emissus rationabiliter releuat, ita enormiter ablatuſ euirat uel turbat.

De coactiōe. i. de nimia lassitudine. Cap. XXXVII.

Coactio in animalibus passionis est nomen, ex qua ægritudinū diuersa genera nascūtur, ideo sic appellata, quod ab iniuria uel labore uel ex coactione contingat. Quoties enim lassū aīal fatigatione itineris, uel nimietate cursus, uel magnitudine ponderū, non studiose resouetur, uel æstate sitire, uel hyeme algere compellitur, uel certe penuriā sustinet cibi, aut hordeo nouo, aut fœnopessimo lædatur. et p dies aliquot circa curā eius nulla adhibetur industria, & sic totius corporis compago, & interiorum uiscerū dispositio per iniuriam & fatigationem uitatur.

Quæ genera ægritudinū ex coactiōe nascent. C. 38.

Ex qua coactione hæc passionū genera nascuntur. Ex perstrictione enim sunt epistomici, podagrici, phthysici. Ex æstu aut̄ euenit grauedo febris, insania, capitis dolor. Ex sudore oritur tumor in cruribus, suffusio in pedibus, febris, spasmus, et tussis. Ex humore quoq; q de naribus profluit, passio aptissima declaratur. A' cerebro enim uel à capite uenit multa pituita crebra et spissa. A' pstrictiōe erit humor tenuis, aquaticus, & frigidus: ex qua re fiūt coriagrosi & epatici & phthysici. A' colibus & glandulis & arterijs humor erit candidus & uiscosus, ex quo euenit fastidiū & faucium præfocatio & synanches. A' pulmone aut̄ humor crassus, sanguinolentus, & maleodoratus emanat, colore pallido. Ex qua causa fiūt peripleumonici, uomicosi, ortomici, et phthysici. A' morbo aut̄ malleo uenit humor multus et crassus & pallidus. Ex qua re fit ortomicus, profluuius atticus, et suspiriū articulare. A' iecore humor erit liuidus, yricus, et uiridis, et tabidus, non ualde crassus, neq; olidus. Ex qua re sunt sciatici, hydropici, febricosi. Ideo autem signa passionum causas que diuisimus, ne ingratus

error

ARTIS VETERINARIAE

error noceret, & facilius euidentis doctrina curaret. Absortus huiusmodi de
coactionibus prodidit medicinas: Si equus, inqt, coactus de uia uenerit, oculi
eius intro abibunt uel uersabuntur, spirat calidum frequenter atq; suspirat,
& auriculæ huius ac reliquū corpus extensum erit. Cuius talis est curatio:
ut parū hordei accipiat, fœnūq; nō multū. Potio aut huiusmodi præparabi
tur, hysopi, abrotani atq; uncia 1. sampuci uncias 6. fœnugræci librā unā, li
ni seminis pondo duo: hæc omnia tusa & cribrata in cacabo nouo cum sex
aqua sextarijs infundis, addisq; nouem duplices ficus, quæ cū ad partē dimi
diam decocta fuerint, uniuersa conteres atq; liquabis, præterea uini ueteris
optimi sextarios tres, mellis heminā, piperis triti drachmā adijcies supra
scriptis, rursumq; feruere facies oīa, ex qua calidā potionē plurimis diebus
dabis, quæ mirifice iuuare consueuit. Si de labore itineris suffusio pedū for
te prouenerit, caue ne sanguinem calido detrahas, sed requietū pausatūq;
flebotomabis, huiusmodi beneficio potionis usus: Turis masculi drachmas
2. foliorū caprifici librā, grana piperis 25. fermēti uncias 3. croci drachmā:
Omnia bene trita in tres partes diuides, & expausatū iumentū triduo cum
oleo potionabis & uiuo: si hyems fuerit, tepida os ablues, æstate frigida: si tar
dius, aut non recte ambulat, † sulphurē & resinā calentē ungulis imponis,
non semel tantū, sed aliquoties donec rectus incedat. Si uero ista nō profue
rint, semissabis eum ut de ungulis sagitta contactis cōpetenter profluat san
guis, & uulnera traumatico curabis pharmaco. De laxis hæc signa erūt:
toto corpore grauabitur, & posteriora crura quasi inligata habebit. posca
itaq; & pulegio nares eius & totam faciem fouebis, panem & merū dabis
ut manducet, offere sq; ei lactucas uel gramen diligenter lotū atq; cōsum,
consequenter daturus huiusmodi potionē, Succū ptisanæ, passum, oua, oleū
rosatum, quæ omnia pariter mista per triduū dabis, ita ut hordeū primo de
corticatum siccaturūq; māducat. Præmonendū autem est, ne iumento ex co
actionis iniuria laboranti pulses uenas calenti. continuo enim neruorū con
tractio & debilitas cōsequitur. Oportet aut armos eorū & genna uino cali
do & oleo tepido suffundere, totūq; corpus multorū manibus diutissime cō
fricare, & loco statuere tepido, mollia de siccato stercore uel de paleis strata
præbere. Posteriorē ptē flebotomo laxis nō oportet cōtingi, ne penitus euire
tur. Qd si uenæ in cruribus tumēt, et plenæ sunt humore, de coronis sanguis
auferatur.

als † fursurē

De diuersis passionibus uentris. Caput .XXXIX.

Non minus multæ & obscuræ ualetudines in internis animalium quàm hominum existere consueverunt. Imò si uerum querimus, propè pares atq; consimiles sumus. Nam animalibus quia rationales sumus, sola mente præstamus; corporis uero natura cõmunis est, maxime in doloribus. Dolorem uentris in iumentis Veterinorũ impitia putat facile posse curari, quod graue, nescit, Et ex uentositate, uel constipatione uitiũ, torsiones uocāt & interiorũ incisiones. quibus aut præcantationes anicularũ more, aut aliud quod quasi physicũ remediũ adferre conantur. Cũ quid enim intrinsecus iumentis dolere inceperit, statim se aliudũ & uolutāt, et solius uentris creditur esse causa, cũ plures & difficiles sint passiones, ex quibus dolor & uolutatio illa contingit. Et nisi singulis pro causarum genere competens medicina sub uenerit, sanitas redire non poterit. Efficaciter autem curare potest nemo, nisi qui internarum ægitudinum signa rationesq; cognouerit.

De aqualiculo. i. stomacho. Caput .XL.

Primus uenter ipse, qui aqualiculus nominatur, totius corporis obtinet dominatum, in cuius capacitate cibus potioq; miscetur, ac per digestionem naturali calore decoctus, separatis humoribus, partē ad substantiã membrorũ conuertit in sanguinem, & partem in urinas resoluit, partemq; secũ trahit in stercora. Quod si loca illa præstrictio longi temporis uiciauerit, intestinorum dolor, & corruptio digestionis necessario sequitur. Nã pars humoris coagulatur ex frigore, & fit conglutinosa in præcordijs, atq; in intestinorum partibus, quæ ducuntur ab aqualiculo usq; ad collum, qd appellatur † enteron, retinetur & hæret, quod latine ieiunũ dicitur, per quod in collũ humor pessimus transit, & interclusione sua cibũ nõ patitur ad interiores partes more solito peruenire. Hinc etiam tortura & extensio uentris dolorq; cũ magno periculo generatur: quæ passio græce emphragma, latine præoccupatio dicitur.

De colo & coli dolore. Caput .XLI.

Exoritur & alia causa doloris asperior, quæ græce chordapfos appellatur, cum præclusa intestina uiscerũ uento sumõue se urgente colligāt.

D usque eo

ARTIS VETERINARIAE

usq; eo, ut aquā, & cibum, & stercus animalia etiam interdū reuomere cogātur. Præterea ad similitudinem hominū propter inflatiōis iniuriā, coli quoq; dolore uexantur, propter quam necessitatē animalia diuerse uehementerq; uolūdo rumpuntur, quod curari iam non potest, & ideo moriuntur.

Cura longanonis & ilei. Caput .XLII.

ILei quoq; uitia ex persfrictione huiusmodi humoris nascuntur: qui cum intestina maiora & præcluserit, & in eorū sinibus stercore coeperit detinere, prohibet illa ad catachlytum longanonis decurrere (Longanon autē intestinum uocatur, per quod stercus egeritur) tunc uenter crassus uel præclusionē ipsa intra uiscera increfcit, ac sibi met dolores morsusq; excitat uehementes, ex quo iumenta se proijciunt ac uolitant, extensisq; pedibus calcitrant, sed per impatientiam se saepe iam iactando uentus increfcit, & mixtus stercore usq; ad intestina descendit, nec iam, ut supra, rumpitur, sed iumento qđ in uitium, quod Ileos uocatur (ex eo, qđ intestina locis suis exclusa, aīa quasi eiles facere faciunt) inciderit, ea ualetudo periculosa est, nisi cum celeritate subueneris. Huiusmodi autem sunt adhibenda remedia: Aqua calida renes animalis diutissime fomentabis, foenumq; cum calida, ut uapor magis penetret, frequenter apponis, post cilicij diligenter absterges, oleum uetus & picem liquidam, & oleum laurinum misces, calefacies, & diutissime persfricabis, ita & testiculos eius perunges, & in auriculas calidum medicamen infundes. Tam diu autem fricabitur, ut sudare incipiat & uentū emittere, ex quo spes ostenditur sanitatis. Quod loco calido statues, ac sagis cooperies diligenter, hanc daturus quotidie potionem; Piperis grana quinquaginta, petroselinum quantū quatuor digiti comprehendunt, cimini alexandrini tantūdem, cimini quoq; africani tantūdem, semen apij, murrā, nepitam, trixaginē, æquis ponderibus, quibus ad dimidiam omnium partem nitrum admiscere te conuenit. Quæ omnia bene trita ex uino calido & oleo æquis ponderibus, et melle quantum satis fuerit dabis. Hæc autem potio & calefacit, & uentrem resoluit. Quod remediū si tardius subuenerit, saccellos cum fursure calentes per totum dorsum & renes animalis imponis. Clysteriabis etiā ex aqua calida & oleo, quod cum sale & melle afro, et nitro, ouoq; miscebis, & ita uentre laxato & stercorea emittuntur & uentus. Quod si clyster defuerit, sal be

ne tritum

tritum & mel coques, pastillosq; longos & duros facies, & in anum iu-
menti interius immittes. Quæ res omnem spurciciem humoris intus stantem
abstrahit, & ad sanitatem perducit, nec est aliud qd magis ualeat subuenire.

Causæ & curæ strophæ. Caput .XLIII.

Sunt animalia quibus assidue uentris impendit dolor, qui strophus ap-
pellatur, & hac ratione concipitur. Interdum sudor animalium uel ni-
mio cursu, uel labore profluens, in internis re'idet intra uentris inuesti-
norumq; compaginem, q; punctiones doloresq; præstat interius. Et cū totū à
labore cessauerit, ac refrixerit corpus animalis, cessat & dolor. Sed cū à la-
bore calefieri cœperit, rursus exoritur, & ideo strophus uocatur. nā frequen-
ter uolutatur, et cū surrexerit, terrā pedibus iundit, & interdū terrā quasi
manducare conatur, et iacēs uidetur quasi pusillū regescere, et surgēs citius
ābulare se cogit. Sed ex hac iniuria frequēter uolutādo uētū sibi nui-rit intri-
secus, et fit tympanites, ex quo et iumentū rūpitur, et præsens uitæ piculū cō-
sequitur. Quittū si in ppetuū auferre uolueris, paracenthese facies sic: qua-
tuor digitis sub umbilico ueretrū uersus, medio climate uētris sagittā iniicies
ut non solū cutē, uerū etiā periconiū ipsum aperias. Periconiū enim dicitur
membrana quæ intestina omnia continet. Ad mensurā autem cū magna cau-
tela periconium aperies, ne intestina ledas, & præsens discrimen inferas.
Post exempta sagitta subijcies fistulā centinalem, quā Mulomedici portare
cōsueuerūt, minutis foraminibus multisq; pertusam, p quā foras humor ema-
nat, quē suscipies in uase, et inuenies limpido lotio similē, tolles uero non mi-
nus sextario. Hæc cura etiā illa animalia sanabit, quæ uel stupida uel macra
sunt ex coactiōe longi tps, qbus nitrū diligenter cribratū in hordeū debes a-
spargere, qd omnes asperrimos humores et spurcicias corporis purgat. Sed
strophosis dabis potionē superius declaratā plurimis diebus. Etiā acopo ter-
mātico renes eorū, totūq; corpus pungen, et diebus aliquot à pluribus facies
cōfricari. Ad ultimū renibus eorū causticū induces, et sic reuoces ad laborē.

De lūbricis, collicis, tincis, et pediculis. Cap. XLIII.

Intolerabilē dolorē ītestinis inferūt lūbrici, uermes, et tineolæ, quas alij pe-
diculos appellāt. Nā coagula et aqualiculū itus erodūt et uulnera faciūt.
ex q; necessitate aīalia macrescūt, et coriagnosa fiūt, et sine fete nō erūt

D a & celer

ARTIS VETERINARIAE

& celeriter moriuntur. Huiusmodi passionis signum est, cū inuenitur humor
 in ano fabæ coctæ similis: est nāq; sanies ex illis uulneribus quæ bestiola in-
 trinsecus fecerunt. Ieiuna animalia ex hac necessitate uehementius torquētur.
 Nā cū his deest cibus, magis uitia consumūtur à uermibus. Hi nō sunt in-
 flati, & tamen per dolore se uolunt, et in spinā se proijciunt, & caput sibi
 intra pedes mittūt, & ostendunt doloris sui locū, dentibus illa sibi quasi scal-
 punt, & rodunt nonnūq; lumbos, & caudam parietibus confricant. Cū ista
 signa ostendere cœperint, & crebro clamare, hoc est, uehementer hincire,
 scias eos iam morti esse uicinos. quibus adhibetur ista curatio: Olei uiridis et
 amari sextarios 2. fasciculū absynthij pontici concoques. præterea nasturcij
 seminis, santonici, coriandri seminis, radicū seminis, sinopidis pontici uncias
 singulas, mirtis & foenigræci selibrā: hæc infusa et decocta in oleo illo facies
 permanere, ex quo heminam olei, & aquæ tepide heminā dimidiam per cor-
 nu dabis. quæ uirtus medicamentorū, & lenitas olei animala ipsa intus occi-
 dit, & foras eijcit. Ex qua potione si per multos dies acceperit, p̄mixto nitro
 tunso & castoreo, oēs lūbricos & tineolas & uermes discludit à corpore, et
 cū stercore eijcit, & restituit sanitatem. Alia potio ad lūbricos, tineolas,
 & cossos: Santonici, absynthij pontici pulueris, lupini crudi, seminis nastur-
 cij, scobis cornu ceruini, seminis radieū uncias ternas, sinopidis pontici pa-
 stillos tres, pollinis crui uncias 3. uini austeri sextarios tres, olei hispani sexta-
 rium unū, opopanacis uncia 1. seminis coriandri heminā: hæc omnia diligē-
 ter trita decoques, & quotidie ieiunis heminas singulas dabis.

De clysterijs ad curam lūbricorū & tinearū. C. XLV.

Sed quia pestes ipsæ sæpius ad coagula se conferunt, & potio quæ per os
 data, ad loca ubi morantur rarius peruenit, ideo etiam per anum adhi-
 benda sunt clysteria: aceti acerrimi sextariū unū semis, olei uiridis tan-
 tandem, opopanacis uncia 1. centaureæ uncias 2. absynthij pontici uncias 3.
 santonici uncias 3. farine lupini crudi uncias 3. crui uncias 3. seminis rafani, se-
 minis coriandri uncias ternas, nitri triti uncias 3. radice capparis tunse un-
 cias 3. hæc oīa decoques cū oleo & aceto, & per tridū singulos sextarios be-
 ne calentes per anū de clystere diffundis animali. Memēto aut quoties per os
 potione das, animal contra cliuū teneri debere, ut facilius quod acceperit ad
 interiora.

Interiora descēdat. Quoties autē clysteriabis, caput animalis in ualle statues, & clunes ad altiora conuerteres, ut quod per clysterem diffundis ad interiora perueniat. Diutissime autē post potionē in talibus locis animal retinetur, ut facilius necentur uel eijciantur pestes internæ. Ad cossos & lumbricos specialis potio. Herbae cameleontis radicem ex aqua ad tertiam decoques, et cū opopanax duabus uncijis misces, ac uini heminā, & ad cornu per sinistram uarem diffundis. Item alia ad lumbricos. Seminis coriandri quantū una manus cœperit friges, nasturcij quoq; seminis tantundē diligenter teres, quæ utraq; cū aqua tepida per triduum faucibus infundes. Ad matricis dolorem medicamen. Aloe, epaticū, masticē, castoreū, lauri baccas, amoniacū, uino & melle mittis in ollam, & bullita atteres, dabisq; ad bibendum.

De iumentis calculosis. Caput .XLVI.

SI quod iumentū calculosum fuerit, hæc signa monstrabunt: torquetur, gemit, extendet se ad conatum mingendi, stillat ueretrū eius guttis materiam, modicum mingit & plene mingere nō potest, quod quotidie patitur. Sed huiusmodi uitii teneris ætatibus plerunq; contingit, quod sic inuenies: Manū ad interiorē partē mittes, et à ceruice uesticæ sub ipso ano ad hip pocentaurū uersus palpabis digitis, & calculū ibi inuenies. Quod uitii difficile curatur. Nam interdū nimio conamine prope ipsum anū uesticæ disrumpitur, & lotiū per anū emittit, & quasi aquæ adsimilatur. Ideoq; missis digitis per foramen quod fecerit, longanoni & ipsius uesticæ aculeo calculum eximis, & curabis clysterijs collecticijs, id est, quæ glutinent, ut foramina illa sauentur. Potionabis autē illos duritica potione. Difficilis autē huiusmodi cura est quia uim patientes ex corruptione uesticæ tortione moriuntur.

De emphragma. Caput .XLVII.

QUodcumq; iumentum ex qualibet causa inueneris uolutare, oleo manum perunges, & ipsum anū oleo satiabis: post quod manū in interiorē partem longanoni protendis, & si inueneris ipsum longanoni clibano subtili patere, scias eū strophū pati, & continuo stercora eijciet paulatim ad manū, quibus egestis cito noueris animal percurandū. Si uero manu iniecta longanoni præclusionē inueneris, & stercoris mod cū, hoc est, duas aut tres pillulas squibala, et præfocatū longanoni quæ manus uix

D 3 introeat

ARTIS VETERINARIAE

Introeat, scias eum emphragma pati et periclitari, & ideo curadi sunt remedia medicaminibus superscriptis, & clystere utendum, quod indignationem intestini resoluat & curet.

De ileo. Caput .XLVIII.

Si manum inieceris, & totum uentre tympano similem pertractando senseris, scias eum ileum pati, & cito periclitari. Et ideo unctionibus calidis fricandus est uehementer & diu. Si uentum coeperit emittere, tunc in illo spes incipit esse uiuendi.

De dolore uentris. Caput .XLIX.

Item si manum miseris, & inueneris ualde pati longanone, & stercora non multa habere, nec esse uehementer inflatum, scias ipsum uentre dolere, id est, aqualiculū. Cito regescere solet, si celeriter supradictas et calidas accipit potiones, diligenterque ex calido unguento fuerit perficatum. Si moram curationis non abstuleris, difficile euadet. nam ex hac passione chorda psum fieri consuevit.

De dolore coli. Caput .L.

Si manum miseris, et similiter longanone pati sine ulla inflatione repereris, & non frequenter uolutantem se, sed proijcientem subinde in dexteram partem, et quasi extensionem interdum ad conamem minutionis, inuenies duriciem in intestinis ingentem cucurbitae similem, scias animal coli dolore cruciari: & quanto durius intestinum inueneris, tanto pluribus diebus dolore cruciatur. Ex qua causa raro periclitantur, & dolent biduo, uel triduo, uel si nimium quinq; diebus. Sed quanto inueneris molliorem ipsum locum, tanto uelocius mitigabitur dolor. nam quaedam stercora in longanone repies, et erit salubris curatio si post clysterem uel potionem multum stercoris adsellatus ediderit. quo facto statim intestinum, quod a colo induratum fuerat, & tumebat, non apparebit redditum sanitate.

De dolore uesicæ Ca. LI.

Si currendo fuerit inuersa, similis dolor sine inflatione ex cursu iniuria & nimietate frequenter emergit. Huic manum subijcies in anum, & depresses usque ad ueretrum uersus, ubi inuenies uesicam eius lotio plena, quam a dextra & sinistra parte leniter adducis sursum ad anum uersus cum oleo, et minutionem

tionem prouocas, tã diu donec urinã faciat: liberabitur piculo de quo animalia difficili'e euadũt.

Colli & lũbrici qua cura tollant ad manũ. C. LII.

SVM alij qui assidue dolorem uentris patiuntur sine ulla inflatione, neque uehementer se uolunt, & quasi in cursu prouocant, aliquãdo se proijciunt, et ilia sibi corrodunt, et quasi scalpunt. In huiusmodi dolore manibus imittis in longanone per circuitũ et interiore parte per plurima loca diligenter tentabis, & inuenies uermes collectos exisse in singulis locis, et intestinũ pertundere. Ex qua necessitate nascitur dolor periculosus. Digitis euellere eos, qui quidem uix euelluntur, & ipsa tibi in manu coheret ut difficile eos proijcias. ex qua ratione multa iumenta caudam frequenter parietibus fricant, propter morsum uermium, quos purgare de longanone studiose debebis, & potionẽ dare per plurimos dies eam, quẽ ad lumbricos faciat, ita omnes uermes, quos cossos appellamus & tineolas purgabis. Similiter etiam qui lumbricos habent in uentre, sic eos conuenit mederi: Pice liquida & oleo calido renes & totam spinam cum dorso perfricari oportet tam diu, donec calefactionem patiantur ex manibus. & auriculas eorum et anum ex oleo complebis. uentrem quoque & testiculos perunges, sal tritum cum melle decoctum mixtum in anũ subijcies, animal potionibus crebris ambulatiõibus potionatũ exercebis. Si ex hac ratione non mitigauerit, clysteriabis eũ calida, & afronitro et sale. Præterea super renes & dorsum sacculos calidos ex fursure plenos imponis, & tam diu innouabis calefactionẽ donec uentum reddat. Potionabis eũ potionibus supradictis & clysterijs ut à discrimine liberetur.

De syncopatis & confixis. Caput LIII.

SI quod iumentum syncopauerit his agnoscitur signis: Pigrius ambulabit, tanquam suffusione constrictum. Inter suffusos autem & syncopatos hæc distantia est, ut suffusi licet tardius à terra leuent pedes, flectentes crura incedere solent: Syncopati autem uniuerso corpore constricti & rigidi sunt, etiam cum se proijciunt, non sine genũ & toto corpore decidunt. Hi uero non sine febre erunt, cibum & potum fastidiunt, magis iacere cupientes. qui cum se leuare uoluerint, impetu conantur exurgere, sed propter dolorem omnium membrorum tardius exurgunt. Quod contingit ex magno

ARTIS VETERINARIAE.

ex magno labore & cursu nimio, uel ex humoribus nimijs, cū plurimus sudor fatigatis neruis mēbra conquasset, unde syncope, id est, defectio nascitur: cuius ista curatio est. Calida cum flore sceni cū somētabis à spina, armis, et re nibus, tepefactumq; diligenter tergendō siccabis, Tunc uino et oleo calido totum perūges, diutissimeq; confricabis: coopertū deinde locis calidis statues, molliq; substernes ut dormiat. Quod cū per triduū feceris, hac potione refuebis. Mirræ uncias 2. dragāti uncias 4. croci drachmas 4. meliloti uncia unā, anagallici librā, thuris masculi pondus unū. quæ omnia cribrata in puluerem rediges, ex quo duo coclearia cū aquæ calidæ hemina, & mellis coclearibus duobus, et olei rosei cyathis duobus potionē dabis plurimis diebus, donec sanum fiat. Etiam uulsis hæc potio, & tensione laborantibus prodest.

De his qui sanguinē per nares mittūt. Ca. LIIII.

Sæpe ex cursu nimio iumēta sanguis infestat, & per nares emanat, qui difficile ueluti ruptis uenis labore & calore substringitur, & uelocissimam etiam postulat medicinā. Succū itaq; uiridis coriandri, uel si defuerit, porri satiui succū in naribus periclitantis infundes. pollinis triticei drachmam, thuris puluerizati drachmā 1. anagallici uncia 1. amyli semiuncia, commixta & in tres partes diuisa, ex uino nigro suffundes naribus, sanguinemq; præcludes.

De infestatione sanguinis. Cap. LV.

Animal sanguine laborare hæc signa declarant: Oculi tumbunt, frigidum erit corpus et ceruix, tristitia fastidiumq; iungetur, difficileq; curabitur. Hac ratione curandum. A cibo potuq; temperabitur, somniq; indulgebatur copia mollibus stratis, tum de matrice quantū ratio postulauerit sanguis auferatur, nec potionis cura cessabit. Succū itaq; uiridis coriandri, uel si defuerit, porri sectiui, trixaginis quoq; & centaureæ uiolæ, & nitri æqui ponderis mixtura inungitur. Ex quibus tunsis atq; cribratis diurnū cochleare ex hemina aquæ tepidæ infundatur faucibus. Quæ potio humores & sanguinē, imminentesq; alios morbos purgat, phibet et sanat.

Quæ adhibēda diligētia, ut aīalia sana perdurent. C. LVI.

Obscuras difficilesq; curas prima fronte digestimus, consequenter ad cætera pergentes: sed necessarium credimus ostendere rationes, ex quibus

quibus incolumitas iumentorum incorrupta seruetur. Melius enim est diligēti studio custodire sanitatem, quā aegritudinibus pręstare remedia. Diligēs itaq; dominus stabulum frequenter intrabit, & primū dabit operam ut stratus pontilis emineat, ipsumq; sit non ex mollibus lignis, sicut frequenter p̄ imperitiam uel negligentiam euenit, sed roboris uiuacis duricia & soliditate cō pactum. Nam hoc genus ligni equorum ungulas ad saxorū instar obdurat. Fossa pręterea quę lotium recipiat, deductoriū debet habere cuniculum, ne pedes iumentorum redundans urina contingat. Patena, quę appellatur, hoc est, alueus, ad hordeum ministrandū sit munda semper, ne sordes aliquę cibarijs admisceantur et noceant. Loculi pręterea uel marmore uel lapide uel ligno facti distinguendi sunt, ut singula iumenta hordeū suum ex integro nullo pręripiente cōsumant. Nam sunt animalia ad edendū auidissima, quę cū celeriter propria deuorauerunt, partem consortis inuadunt. Alia uero naturali fastidio tardius comedunt, & nisi separatim acceperint, uicinis rapientibus macrescūt. Cratis, quę iacca uocatur à uulgo, pro æquorū statura nec nimis alta sit, ne cū iniuria guttur extendatur, nec nimis humilis, ne oculos contingat aut caput. Luminis plurimum stabulo infundi oportet, ne tenebris assueta, cū producuntur ad solem uel caligent, uel aciem uisus imminuant. Acstate in apertis locis tā noctibus quā diebus iumentis libera aura pręstanda est. Hyeme uero tepere debent stabula potius quā calere. nam nimius calor licet custodiat pinguedinem & reficere uideatur, tamen indigestionem facit, & uehementius nocet naturę. Propter quod diuersa genera morborum ex uapore ipso animalibus generantur. Si producuntur ad frigus insolitum, statim aegritudinem ex frigoris nouitate percipiūt. Curandū est pręcipue, ut siue foenum, siue paleas, uel manipulos uicia pro regionum usu uel copia animalibus prębeas, incorrupta ac bene olentia & munda mittantur. De hordeo quoq; non erit sollicitudo dissimilis, ne aut puluerulentum sit, aut lapidosum, aut mucidum, aut uetustate corruptū, aut certe recens de areis sumptum, & ipsa nouitate pręferendum. Aqua etiam limpida ac frigida, etiam perhennis ac profluens ministranda est. Nā quicqđ importunius fluit, uirus non admittit. Bis in die multorum manibus animalia sunt toto corpore confricanda: quę cura & mansuetudinem docet, & laxata cute pinguedinis pręstat augmentum. Hordeū quoq; non semel nec bis, sed pluribus portioni

E

bus prę

ARTIS VETERINARIAE

bus præberi conueniet. quicquid enim paulatim acceperint, legitima digestione conficiunt. Quod uero semel et enormiter sumpserint, cū simo indigestū integrūq; transmittunt. Vicinum uero stabulū conuenit esse loco arido, stercore uel paleis mollibus adopertum, in quo ante potum animalia uolūtetur. Quod exercitium & sanitati proficit, & ægritudinis uitium commonstrat. nam quoties animal, aut non solito more se transuoluit, aut omnino detrectat accumbere, scias illud ex tædio laborare, & ideo separari debere, atque curari. Ad quod opus quoque plurimum iuuat, si sæpius & cum moderatione animalia sedeantur. Nam imperitia rectoris & incessus eorum debilitat, & mores, præcipue seruorum impatientia, qui absentibus dominis ad cursum equos uehementer stimulant, & non solum flagellis, sed etiam calcatribus cædunt, dum aut inter suos uelocitatem cupiunt experiri, aut cum alienis uehementi obstinatione contendunt, nec reuocant aliquando currentes, nec temperant. neque enim de damno domini cogitant, quod eidem contingere gratulantur. Quam rem diligens paterfamilias summa seueritate prohibebit, et iumenta sua idoneis & moderatis hominibus, scientibusq; tractare committet. Post sudorem quoque si æstus sit, pusca os ablui conuenit: si hyems, muria. Vinum quoque & oleum faucibus infundi oportebit ad cornu, æstate frigidum, hyeme tepidum, ita ut hyeme meri sextario, olei unciae tres, æstate autem duæ tantummodo misceantur. Nec conuenientium potionum debet cura cessare. nam languor, macies, & tussis, & interiorum dolor facile submouetur, si sulphuris uiui semiunciam. i. 12. myrræ 4. redactos in puluerē, ouoq; crudo imixtos cū hemina uini optimi per os dederis. Est alia sumptuosior, sed accommodatior potio ad omnes morbos, quæ et celeriter reficit et cū intrinsecus purgauerit, curat omnes morbos, tussim ueterē, phthisicos, uulsores, et quæcūq; uexata sunt in opertis. Ptisanæ sextariū 1. seminis lini heminā, scenigræci heminā, croci unciam 1. acronē salsum porci pinguis, uel lōgano, uel si porcina defuerint, caput hædinū depilatū, cū pedibus suis, et cordubis intestinorum mūdis, hyssopi fascēs duas, cochleas germanas xv. bulbos xv. ficus duplices xx. rutæ fasciculū 1. baccarū lauri cū uirēt sextariū, dactylos xx. allij capitata tria, seui caprini uncias 6. pulegij sicci fasciculū; hæc oīa purgata leniterq; cōtusa decoques in aqua cisternina, donec acron ille, uel certe caput hædi liquecat et dissoluatur ab osibus. propter quod assidue aquā refundis

fundis ne cōburatur, sed seruēdo pinguescat, uel succus ipse pinguior efficiatur. Post hæc diligentissime colabis ad colum, tū draganti uncia 1. in tres diuīdes partes, ita q̄ exinde in unā potionē missurus es pridie infundas in calidā ut inturgescat. tunc addis passi sextarios 3. et tribus diebus sigulos sextarios dabis, oua numero sex, († indie secundo olei rosati oua plena nūero 2) butyri uncias 3. (In die tertio) anagallici uncias 3. amyli uncias 3. pulueris quadrigarij selibrā, lomenti fabæ selibrā. Quæ oīa misces, ut dictum est, æquis ponderibus p̄ triduū diuides, et ieiunū aīal potonabis, et horis aliquot deābulare facies, usq; ad septimā, a cibo abstineatur et potu. Animalia uero macie attenuata, nō absq; studio diligenti reuocantur ad corporum firmitatē. Nā oleo ueteri uinoq; permixtis, et tepēfactis in sole, per totum corpus unguuntur, et contra pilum multorum manibus perfricantur, ut et nerui mollescant, et cutis laxetur, et sudor erumpat. Quo factō cooperta in pontili strato collocantur. Et si hyems fuerit, condita cū semiuncia appij seminis triti, et olei tribus uncijis calefacta p̄ os ipsius oportet infundi. Si æstas fuerit, absynthiū uel rosatum cū 4 scrupulis croci, et duabus uncijis olei frigidū p̄ os similiter debet accipere. Quorū si nō suppetit copia, uinū simpliciter conuenit præberi cū cæteris. Præterea eiusmodi species tpe hyemis cū hordij modij 4 misces, fabæ sextarios 8. tritici sextarios 4. ciceris sextarios 8. fœnigraci sextarios 4. erui sextariū 1. et si meritū equi uel facultas domini suppetit, uua passæ et nuclei sextarios singulos. quæ omnia sollerter cōmista cū fuerit, unū modiu in aqua mundissima pridie debes infundere, et paululū mane siccare, ex quo equo semimodiū ante prædiū, et semimodiū ad uesperā dabis p̄ plurimos dies in loco optimo. uiginti uno die ita stabuletur ut intrinsecus bibat. Quod si ultra modum sagina prouenerit, ne pletura noceat auferendus est sanguis a matrice. Præterea graminum radices, quas aratrum frequenter euellit, studiose collige, et quā potueris longas minutatim concide, hordeoq; cōmisce, et quotidie præbere nō dubites. Aestate uero, excepto eruo, species illæ quas dixi, pro estimatione mensuræ ferragines adinuicem præbeantur, hoc est, hordei uiridis plures maioresq; fasciculos, tritici uel ciceris uel fœnigraci minores et pauci. Quæ oīa cōtusa oportet apponi. Præcauēdū tamē ut in lōgore uestitōe uel itineribus, iumētis urine copia nō negetur. quæ res nō sine piculo plerūq; differtur. Pedes quoq; eorū post uia erundi sunt diligēter, ne quid luti

E a uel sord

ARTIS VETERINARIAE.

uel sordium in articulis basiꝑ; permaneat. Vngueto etiam conficadi sunt, quo ungulae nutriantur, & medicaminis beneficio subcrescat quod itineris attriuerat iniuria. Alij capita tria, ruta ueteris fasciculum, aluminis scissi et cribrati uncias 6. axungiae ueteris pondo 2. stercoris asinini recentis manũ plenam, quibus cõmixtis atq; decoctis domi, ut uolueris in itinere uteris ad uesperam. Præterea aliud quod ungulas nutrit & firmat. Picis liquidæ libras 3. absynthij librā 1. alij capita 2. axungiae librā 1. olei ueteris librā semis aceti acrioris sextarium unum, uniuersa contundes & misces, et decoques, & ex eo coronas uel ungues animalium conficabis. De palatis singulis mensibus minuenta luna sanguis detrahatur. quo facto si qua est capitis passio releuatur, & ciborum fastidium tollitur. Oportet autem ferramento concisso animalium soleas ramulasq; purgari, quod euaporat atq; refrigerat, & fortiores ungulas reddit. Si animal domi forisq; perfrikerit, calidioribus unguentis, quæ multa sunt, lumbi eidem confricentur & cerebrũ, potionibusq; & pigmentis, & herbis quarum feruentior est uis, per os continuo oportet infundi, ut perfractionis incommodum euincatur atq; pellatur. Nā si in uisceribus permanserit algoris iniuria, diuersos, periculososq; procreat morbos. Si uero dierum canicularium tempore aestu animal fatigabitur, uel aquis frigidis est perfundendũ, uel in mare flumen ue mittendum. frigidis etiam potionibus recreandum, ut necessitati laboris aut temporis aptior medicina succurrat. Sed in equis non solum utilitas, uerum etiam decoris ratio seruanda est. Nunquam itaq; nisi necessitas passionis exegerit, de articulis refecandi sunt cirri. Naturale enim ornamentum pedum natura in illis constituit. Ceruicẽ etiam ipsam diligens debet ornare tonsura. Multa enim sicut currulibus, ita & sellaribus iumentis pressius colla radunt. Quæ res licet præstare creditur augmentum, tamen sub honesto seffore deformis est. Alij ita tondent, ut arcũ uideantur imitari. Nonnulli Armeniorum more crines aliquos in tonsura ipsa per ordinem derelinquunt, Sed gratiora sunt quæ translata de Persis posterior usus inuexit. Nam media iuba ad omnẽ accurationem ex sinistra parte tondetur, à dextra uero omnino insecta seruatur. Et nescio quo pacto plurimũ deceat, quia illud quod naturaliter laudatur Vergilius imitatur:

Densa iuba, & dextro iactata recumbit in armo.

Quod si bicomis fuerit, ut uulgus appellat, mediæ ceruicis setas æqualiter oportet

V. Gesn. de quadrario animalium soleas ramulasq; purgari, quod euaporat atq; refrigerat, & lib. 1. pag. m. 411. fortiores ungulas reddit. Si animal domi forisq; perfrikerit, calidioribus unguentis, quæ multa sunt, lumbi eidem confricentur & cerebrũ, potionibusq; & pigmentis, & herbis quarum feruentior est uis, per os continuo oportet infundi, ut perfractionis incommodum euincatur atq; pellatur. Nā si in uisceribus permanserit algoris iniuria, diuersos, periculososq; procreat morbos. Si uero dierum canicularium tempore aestu animal fatigabitur, uel aquis frigidis est perfundendũ, uel in mare flumen ue mittendum. frigidis etiam potionibus recreandum, ut necessitati laboris aut temporis aptior medicina succurrat. Sed in equis non solum utilitas, uerum etiam decoris ratio seruanda est. Nunquam itaq; nisi necessitas passionis exegerit, de articulis refecandi sunt cirri. Naturale enim ornamentum pedum natura in illis constituit. Ceruicẽ etiam ipsam diligens debet ornare tonsura. Multa enim sicut currulibus, ita & sellaribus iumentis pressius colla radunt. Quæ res licet præstare creditur augmentum, tamen sub honesto seffore deformis est. Alij ita tondent, ut arcũ uideantur imitari. Nonnulli Armeniorum more crines aliquos in tonsura ipsa per ordinem derelinquunt, Sed gratiora sunt quæ translata de Persis posterior usus inuexit. Nam media iuba ad omnẽ accurationem ex sinistra parte tondetur, à dextra uero omnino insecta seruatur. Et nescio quo pacto plurimũ deceat, quia illud quod naturaliter laudatur Vergilius imitatur:

portet attondi, ita ut tam dextri quàm sinistri limitis continuata serie iubæ relinquantur intactæ. Quod nihilominus inuētum constat à Parthis, quibus consuetudo est equorum gressus ad delicias dominorum hac arte mollire. nō enim circulis atq; ponderibus prægrauant ut soluti ambulare cōdiscant, sed ipsos equos, quos uulgo Trepidarios, militari uerbo Tottonarios uocāt, ita edomant ad leuitatem, & quædam blandimenta uecturæ, ut Asturconibus si miles uideantur. In sicco itaq; æqualiq; solo quinquaginta passus in longum, & qnq; in latum plenis cophinis digeritur per ordines creta, ad similitudinē stadij, quod aulicibus asperius sit, tum difficultate coronam uelocitatis optantibus ingerit, in quo spacio cum equus frequētissime exerceri cœperit, in illos aulices necessario offendit, et priores & posteriores ungulas impingit, et aliquādo uel cedit, uel sic offendit ut cadere uideatur, post quod admonitus iniuria, tollit altius crura, & inflectione geniculorum atq; gambarum molliter uehit. Præterea minutos gressus imitatur, ut inter aulices ungulas ponat, nā si extendere uoluerit, offendit in cumulum. Minutim autem equus ambulās commodius uehit, & pulchrius uidetur incedere. Potiones etiam hyemales æstiuasq; conscripsimus, quibus aut conseruetur sanitas perpetua, aut uehemens ægritudo pellatur.

Potio æstiuo tempore danda. Ca. LVII.

Dum æstus incanduit, hæc potio animalibus comoda est, quia humectat & refrigerat: Croci uncia unā infundes in uino ueteri, draganti uncias tres infundes in aqua calida, his adiunges fasciculū uiridis porri .i. item fasciculum uiridis apij, herbæ portulacæ succi heminam, lactis caprini sextarios tres, oua septem, olei rosei librā, mellis uncias 3. passi sextariū .i. uini ueteris quod sufficiat. Ex quibus omnibus diligenter commistis atq; contritis, ad cornu per triduum sextarios singulos animalibus dabis. Alia quoq; refrigeratoria potio: Vini ueteris sextarium, olei librā semis, oua tria, succi coriandri cyathum .i. lactucarum cyathū .i. sollerter admisce, & in tres diuides partes, daturus per triduum iumentis æstuantibus salutare remedium. Tamen eo momento quo potionem defusus es, per singula animalia singulas heminas aquæ frigidæ & recens sumptæ potioni debes adiungere.

E 3

Potio hy

ARTIS VETERINARIAE

Potio hyemalis Caput .LVIII.

HYeme quoq; potio ista præbetur: Vini ueteris sextarios 3. olei selibrā,
pipis uncia 1. rutæ uiridis uncias 6. cerefolij uiridis uel seminis ipsius
uncias 3. draganti uncias 1. seminis feniculi uncias 3. baccarū lauri un-
ciā 1. mellis uncias 6 oua quot uolueris, et passi quantum usus exegerit.

Potio in Autumno et uere præbenda. Ca. LIX.

Costi semiuncia, castæ fistulæ uncia, celticæ semiuncia, petroselini se-
miuncia, betonice semiuncia, glicericæ semiuncia, sagapini semiuncia
spicæ indicæ semiuncia, saxifragæ, eupatorij, meliloti, irisillyricæ, affi
semiuncia, centaureæ, gentianæ, aristologiæ longæ, affi uncia 1. amomi, aristo-
logiæ rotundæ, affi semiuncia, scinoanthos semiuncia, asari, aloë, affi semiun-
ciæ uncia, opopanax, radicis dracontæ, affi semiun. croci uncia, dragā-
ti unc. 6. castorei uncia, absynthij pōtici fasciculos 2. hæc oīa in puluere red-
acta ad. xij. aialia p triduū sufficere credūtur, ita ut cū uino optio digeratur.

Potio omni tempore necessaria. Ca. LX.

Costi, meliloti, hyssopi, irisillyricæ, aristologiæ, samplici, dracontij,
asari, draganti, centaureæ minoris, marrubij, gentianæ, spicæ celti-
cæ folia, æquis ponderibus misces, redactaq; in puluerem cernes. sed
si æstiuā dare uolueris potionē, cōmises croci, mellis, et dragāti quod suffi-
ciat. Si autē potionē facies hyemalē, addis, piperis, appij seminis, et semis si-
napis. utroq; autē tpe cū boni uini sextario plenum cochleare miscetur, fauci-
busq; animalū diffunditur.

De difficultate urinæ. Ca. LXI.

DE urinæ difficultatibus ordine suo multa dicenda sunt, sed uiatorium
istud, & physicum, & semper paratum te scire conuenit. Lutū ex
cuiuscūq; equi lotio factū uino p̄mises, colatūq; p̄ nares infundes, et
confestim prouocat urinā. Itē allium conteres et in anū incies et ueretrū,
mox egerit lotiū. Itē, Puluerem quoq; thuris cū ouo uinoq; p̄nuxitū, addito
succo apij et caulū, si potionē dederis, prouocabit urinā. Itē, Betas ac mal-
uas ad tertiā decoques, ex qbus aquā calentē ad med. ū sextariū cū melle cō-
mises, et p̄ os digeres, proderit minctioni. Itē, Cimicē quoq; uinū in aurem
equi mūt

equi mitte, et alterum supra naturam in ipso foramine quo mingit confica, facillimum certumq; remedium est.

De stropho. Ca. LXII.

ITinerum casibus subuenire cupientes, de pluribus pauca, sed manifesta libabimus. Nā aīalia sub sessore uel onere dolor uentris frequenter affligit, ut uolentur et procūbant. Semē itaq; rutæ syluestris uel hortēsis si illa defuerit, diligenter tritū cū uino calido per fauces oportet infundi. Præterea aquā in qua usq; ad tertiā betæ decoctæ sunt, succūq; earū nitro trito solenter admisces, oleiq; addes heminā, tepēfactaq; in intestinū per clysterē diffundes, cū prius pronū aīal statueris, ut iniectū ad interiora perueniat. quæ si forte defuerit, mel coctū cū tertiā pte salis triti coqis in pillulas, ita ut collyria ad oui magnitudinē facias, similiterq; pronō aīali in intestinū uel qnq; ut septē, aut nouem collyria inferere curabis. post soluturūctur et mitigatur dolor. Item, physicū traditur os limacis neq; manu immunda, neq; terra, neq; dente contactum alligare umbilico dolentis curare continuo.

De dorso curando. Ca. LXIII.

Plerunq; dorsum aīalibus aut sarcina lēdit, aut sella, propter stramētū negligentīā uel oneris iniuriā. qđ in itineribus interdū necesse est euenire, sed recēs tumor hac ratiōe curatur: mallonē cepārū uel ipsas cepas in feruentī aqua decoques, et calētes quantū coriū ualeat sustinere, tumori suppones, et fascia ligabis. una nocte oīs aufertur inflatio. Præterea sal tritum cum aceto miscebis, additoq; utello oui, loca quæ tumere cœperint perfricabis, recens indignatio descripta siccabitur.

De probatissima potione diapente. Ca. LXIII.

Cui cure est aīaliū salus, potione supius declaratā, quā specierū nūcro diapenten græco uocabulo nūcupāt, Gentianæ, aristologiæ, murræ, baccarū lauri, rasuræ eboris, paria pondera diligenter trita atq; pmixta, domi, siue in itineribus prius cōdita, habere oportet in promptu, ut quoties mœslū aut horridū uideris animal, aut morbi alicuius labe tentatū, statim plenū cochleare ex puluere memorato cum sextario uini optimi p fauces diffundas, et p triduū, etiā equo in labore constituto, digeras, ut aduersus uirus internum subueniat. probata curatio. Tusienti autem cum passi hemina dabis, et statim sentiet curam. Si liber, cui iam ponendus est finis, legem

ARTIS VETERINARIAE

tium non offendit auditum, sequenti uolumine inchoantes à uertice usq; ad ungulas ex diuersis authoribus enucleatas animalium publicabimus curas, ut ordo, qui à natura datus est, in medendi dispositione seruetur, ne indigesta ac membrorum consequētia repugnās pagina quarentē confundat aut tardet.

FINIS LIBRI PRIMI.

IN SECVNDVM ARTIS VETERINARIAE VEGETII LIBRVM, PROLOGVS.



Ml medicina ars iamdudum uitio cupiditatis, et exitu mercedis, nullo studiosius discēte, collapsa est. Nūqd uero exemplo Hunnorum siue gentium aliarū artis ipsius etiam usus intercidet, dum homines resurgentes expensas, barbarorum cōsuetudinem imitari uelle se simulant, & incurata animalia hybernis pascuunt, & negligentia casibus dedunt? Quae res nulli cōpendium, plurimis attulit damnum. Primo quod Barbarorum animalium alia naturae, & ad omnem iniuriam durius corpus est. Deinde quod sic instituntur à paruulis, ut nec potionē medicinalem requirant, & hybernis pascuunt, ac sine pernicie frigora pruinaeque sustineant. Nostra uero iumenta & mollioris generis sunt, & tectis frequentioribus assueta, calidissimis etiam stabulis imbuta, cum indignationem ex aliqua necessitate contraxerint, continuo in aliquod genus incidunt morbi. Diligens itaque paterfamilias, cum mortibus animalium suorum & cum medicinae expensis atque mercedibus faciat rationem, intelliget unius uilissimi iumenti pretiū ad multorum, quae sine dubio peritura sunt si curata non fuerint, salutem posse sufficere.

VEGETII RENA

TI ARTIS VETERINARIAE LIBER
SECUNDVS.

DE VALITVDINIBVS CAPITIS.
Caput primum.



IN VNIVERSO ANIMANTIVM genere caput obtinet principatum, quod eminentius cæteris, dominatum quendam circa loci ipsius conditionem sortitur. In eo est odor, gustus, auditus, ac visus: quod quantum habet potestatis, tantum sustinet ex labore discriminis. Causas itaq; ex quibus ægritudines generentur, & signa, per quæ qualitas eorundem possit agnosci: curas etiam, quarum medela sanitas reuocetur, per ordinem indicare tentabimus. Plærunq; autem in corporibus iumentorum indigestionis uitio sanguis corrumpitur: quod euenit cum ex aestu uel frigore debilitata sunt mēbra, & in capite frigus sanguis uertitur in uirus. Tunc enim repletis uenis cerebri membrana distenditur, & somni salubritatem frequenter excludit. Ex quo necessario dolor capitis, mœstitia, & imbecillitas subit. Quæ ualetudo & prima uidetur, & leuior, si uelox medicina subuenerit.

De Appioso. Caput .II.

CAeterum cum noxius sanguis membranam cerebri & ex una parte pertuderit, & eandē dolore nimio cœperit prægrauare, efficitur animal appiosum: cuius & mens hebetatur, & uisus. Nam cerebri incoluitas, & oculos pascit & sensus. In qua passione quia una pars capitis prægrauatur, tanquam ad molam uadit in gyrum.

De Frenetico. Caput .III.

CVM uero medium cerebrum corrupti sanguinis uirus infecerit, animal freneticum redditur, ut repente saliat, & uelut effugere uelit, parietibus

F

ARTIS VETERINARIAE

rietibus se tanquam irregibilis impingat, nec possit ratione aliqua contineri.

De cardiacis. Caput .IIII.

Cardiacus is est, cui cor dolet. Cardiacus autem fit, quoties sanguinis illa corruptio stomachi uel thoracis impleuerit uenas, cerebrūq; percusserit, cor etiam pestiferi humoris labe constrinxerit. Quae ualendo inducit mentis alienationē, & corporis sudore monstratur. ex quo difficillime liberatur.

De rabioso. Caput .v.

Quod si Appiosum, simul passio thoracis inuenerit, facit continuo rabiosum. Ex ardore enim nimio iecinoris & sanguinis, uenae cordis neruiq; praefocantur, ex qua constrictione fit dolor ipsius loci usq; adeo, ut mordendo se comedat. Ex quibus ualitudinibus si animal fuerit liberatum, & post curationem aliqua pars cerebri fuerit imminuta, uel tumor subreuerit, ineptum iumentum, pigrumq; redditur. & in illa parte capitis ubi uitium remansit, difficile se gyrahit, & ex eo latere se parietibus iungit, & tarde incedens, non sentiens plagam, ambulaturae gratiam perdit, et erit submisso capite, & cum stare coeperit cum tarditate se mouet, minus etiam uidebit, nec cibum nec potum recusat. Quem si curare uolueris, cyclo curabis. In omnibus suprascriptis ualitudinibus, primum de temporibus minuendus est sanguis, sed & de matrice aliquando tollendus. Cura autē penē omnium similis est, cuius ordinem sequentia declarabunt.

Qua obseruatione cyclo curentur anismalia. Caput .vi.

Memineris autem omnes ualitudines capitis, praecipue ueteres, periculosos, cyclo oportere curari. Cui haec obseruatio et ordo est adhibendus: Triduo ab hordeo abstinabitur animal, temperabitur etiam mollibus cibis, post diem tertiam de dextra ac sinistra, prout aetas aut uires, uel ualitudo permiserint, de matrice sanguis auferetur. Quo facto, per triduum uiridi cauliculorum ac lactucarum sustentabitur cibo. Primo uno die a cibo eum sustinebis & aqua. nouo autem die offas caulium cum liquamine & oleo optimo temperatas non minus uiginti digerās, cui nihilominus lactucam dab

cam dabis in cibo ter in die. post potionē bibere semper incipiat. Si uero uenter uehementer solui incēperit, caulū offas dare desistes: sed dabis paleas et fursures, ita ut sequente die penitus nihil manducet, sed solam aquam percipiat ad bibendum, ac postero die inducatur in cellam balnei calidā et sudet. Opus est autem diligentia ut reducatur celeriter de calore, ne intercluso spiritu pereat: tunc extergeatur diligenter, uinoq; et oleo largiter perfricatus, accipiet cum nitri puluere folia rasani conspersa, quantum commodum est. Postmodum cum radicibus cucumeris asinini uiridis minutatim concisis oleum optimū misces, et in uase nouo ita decoques ut tertiam perdat. ex quo singulas heminas per capita animalium per triduum dabis, ut potio uentrem resoluat. Sed si ultra modum fluere cōperit, lenticulam et hordeum pari mēsurā frigēs, et de his singulas bilibres per dies singulos cum fursure et paleis dabis. Quinq; itaq; diebus operam refectionis eius impendes, et leuiter exercebis, ut intelligas quantum uires corporis sanitasque profecerit. Post hæc eum pro arbitrio despumabis. Sequēte die caput eius purgabis exorica, uel radice dianaria, quam Artemisiam dicimus: si hæc nō fuerint, ex liquamine optimo cū oleo mixto. cuius caput pedesq; connectis, cum bene purgatū agnoueris, soluito, butyrum ex oleo roseo solutum infundes in nares, ut illo purgationis mitigetur asperitas, ita ut singule cotylæ singulis naribus infundantur. Si supradictæ potiones non soluerint uentrem, mellis, hellebori albi pondus unius denarij cum hemina dulcis uini bene tritum in potionē recipiat, uel certe scammonie pondus duorum denariorum diligenter tritæ cū dulcis uini hemina simili ratione diffundes in fauces. Quod si uenter ultra modum dissolutus discrimen importat, anagallicum succo ptisanæ ad restrictionem ipsius dabis, lenticulamq; et hordeum frixum, singulas bilibres cū paleis et fursure præbebis in cibo. Ad ultimum, partes quæ in causa sunt, sinapizabis diligenter, sinapizatum cauterē ferreo, uel quod utilius creditur cuprino combures, uisita curaturus ex more. Potionem quoq; ex antidoto polygresto per dies plurimos dabis, et exercebis leuiter, et ad cibaria ipsius aliquid per partes semper adiunges, donec ad pristinam consuetudinem reuocetur. Insanabiles ualitudines cyclo affirmantur posse curari, id est, insani corroborari, caduci cyclo curati uruntur in capite; morbidi uero, dysenterici, coriaginosi, orthopnoici, strophosi, cyclo curentur in renibus.

ARTIS VETERINARIAE.

De cerebro commoto. Caput .VII.

Cerebrum plerumq; diuersis passionibus commouetur, quod his deprehenditur signis: Ambulabit prauus, & frequenter offendet, & toto se corpore commouet. Cuius ista curatio est: Baccas lauri numero xx. nitri selibrā, ruta manipulum: quæ omnia diligenter trita, cū aceto non acro, & oleo optimo rosaceo cōmixta, hyeme calefacies, perunctoq; oleo capite eius & cerebro, uel auriculis, cerebellū de lauata pelle cōuoluis. Quæ si forte defuerint, farinam hordeaceam resināq; miscebis, ex quo cataplasma cōfectum cerebro oportet imponi. Præterea ceram oleo cyprino coniungis, & linteolo inter auriculas ad ceroti instar imponis. Sed & reliquum corpus potionibus resouendum est. Tres fluuiatiles canculos cōteres diligenter, et cū duabus uncijis succi caulii, addito lactis sextario olei duobus cyathis, pmiscebis, & colatum per os diffundes ad cornu. Quorum si inopia est, mellis cyathos duos, aquæ calidæ sextariū i. coquito, ex quibus pastillos facies, & in aqua frigida dilues, & dabis in potum. Præterea si hyeme curaueris, farinā triticeam: si estate, hordeaceam, aquæ frigidæ adinuicem amuli permixtā in potione præbebis.

De dolore capitis. Caput .VIII.

De capitis dolore multi authores multa dixerunt. Cuius hæc sunt signa: Tumor circa oculos apparebit, pabulum recusabit, lingua eius & palatum labiaq; tumbunt, quanto uehementius increuerit morbus, tanto exoritur amplius tumor: ambulantes toto corpore uacillāt, umbrāq; suam uelut odorantes expauescunt. Cuius passionis ex corruptione sanguinis nascitur causa, cum indigestio ciborum naturali meatu intercluso, uel certe derelicto, in eas uenas, quæ circa tempora sunt, defluit, membranāq; cerebri uitiat. Cui sanguinē de temporibus oportet minui, & cōtinuo oleo acetiq; permixto caput largiter perungi. Quod si hyems fuerit, hordeum pridie infundes in aquam & decoques, calidāq; in saccellos immittes, iumentorumq; caput fumentando diutius uaporabis. Alij authores tolli de palato sanguinem iubent. Tunc cimoliam cretam ex aceto infusam, & merdā bubulam recentem cum nitro trito miscent, & in cacabo super carbones decoquunt, calidāq; cerebro languentis imponunt, aceto rigantes ne creta astringatur.

gatur ad pilos usq; cum prius calida sumentauerunt caput. Dolorē capitis propē ad insaniam ista signa demonstrāt: Quoties graue est, & in præsepio se deponit, lachrymæ frequenter oriuntur, auriculæ stabūt, oculi grauiores erunt, anhelitus creber, aridus pilus, tremores frequentes, tristis aspectus. Quem in primis ab aqua abstinebis ne nimium bibat, de utraq; parte colli sanguinem detrahes, caput sicut scriptum est curabis.

De Distentionibus. Cap. IX.

Distentionis quoq; ualitudo ad capitis præcipue causam refertur. Cuius hæc erunt signa: Impediente caligine obscurabitur uisus, tremor & sudor totius corporis insequitur. Quod uitium contingit ex aqua, si sudans iumentum biberit: uel ex indigestione cibi, si non dormiat, uel substrictus manserit. Huic capitis membrana distenditur. Quæ passio cæterarū ualeitudinum & fons probatur & mater. Nisi enim inter initia curaueris caput ut animal dormiat competenter, sūt appiosi, insani, rabiosi, frenetici, capidiaci. Igitur cū aīal distentionis ægritudo comprehēderit, de ceruice eidē sanguinem tolle pro magnitudine corporis & ætatis. Et si æstas erit, oleo & aceto caput totumq; corpus perunges, & diutissime confricabis, loco refrigerato & opaco inclusum continebis, substernes etiam stercorea sicca uel paleas, ut prouocet ipsa mollicies ad cubandum, locum calidum declinabis, nam impedit somnum: surfure uel paleis uel folijs lactucarum reficies. præterea potum præbebis exiguum: cum cōualescere cœperit, modicis ambulationibus exercebis, ubi idoneum uisum fuerit ad cibaria largiora infusum hordeū ad primam consuetudinem paulatim per incrementa reuocabitur. Si die septimo non profecerit, sanguinem iterum de temporibus emittes, & caput sine intermissione curabis. potionem dabis qua sanatur appiosi: Nasturcij seminis, appij seminis, seminis lactucæ, anagallici, petroselini, aneti, papaueris syluatici seminis uncias singulas, piperis scrupulos 3, croci drachmā unā. Quæ oīa bene cribrata atq; cōmixta ex aqua temperabis, trochiscos facies, ut habeant minus quā singulas drachmas. In dieta unū trochischū in aqua dissolutum per os digeres: quod quotidie oportet fieri donec sanitas redeat. Si non appetit cibū, singulos trochiscos solutos cum succo ptisanæ quotidie præbebis. Vinū nūq; dabis. Capitis enim ualitudo sumpto mero deterior efficitur.

F 3

De app

ARTIS VETERINARIAE

De Appioso. Caput .X.

Si quod iumentum appiosum fuerit, in praesepio incumbit, oculos ten-
sos habebit, micabit auriculis, uisus caliginem patietur, & gyrat in cir-
culo tanquam ad molas.

De rabioso. Caput .XI.

Quod si etiam fuerit conuersus in rabiem, sic intelliges: Subbito hin-
niet tanquam sanus, parem suum appetit morsu, uel hominem, praese-
pia aut illa sibi mordicās rodit: quē sicut appiosum curabis. Pro-
sus abstinebis ab hordeo, mollibus cibarijs sustētabis. Praecipue tamē apiū ui-
ridem quantum uoluerit praebabis. Sanguinē de temporibus aut de ceruice
emittes, loco tenebroso statues, caput eidem huiusmodi acopi cōfectione cura-
bis: Opopanacis librā 1. resinae, terbentinae atq̃ uncias 2. galbani uncia 1. resi-
nae frixae uncias 3. mastice tritae uncias 2. olei ueteris librā 1. ex hoc ei cere-
brum & auriculas confricabis, oleū tamen solum ac liquidum in aures eius
suffundes. cuius tamen prius quā acopo utaris, saccellationibus caput cere-
brumq̃ uaporare te conuenit, & caput apposito cerebello communire. Po-
tiones quoq; ex trochischo supius memorato quotidie praebabis, collyrio acri
inungis assidue ut caligo ex oculis possit auferri. Quae cura si non profice-
rit, caput & tempora sub ipso protocomio semisse inuris cauterio, quod &
sup uenas tēporales facies. Plēriq; tamē facies ne deformet iumentū solo ta-
al's † usto. bulare palati († confecto) sani fieri possent. Feruor enim foci debilitatem ca-
pitis tollit, & membranam menti pristinae, sanitatiq; restituit.

De Infania. Caput .XII.

Alij authores insanientis iumentī ardentes & sanguineos oculos et
humore suffusos, stantes auriculas dicunt uel micantes, ut ad instar
indomitorū nec capi possit, & captum, parietibus se illidens conetur
effugere. terram pedibus fodiet, et multum flegmatis ex ore profundet. quod
hac ratione curatur, ut auferatur ei sanguis de angularibus uenis, de palato,
& post de cruribus. a cibo eadem die abstineatur & potu. Alia autē die aquā
frigida dabis ei bibere. Auferātur stercora quae in ano eius sunt, p̃ quatrīduū
continuato clystere, curabitur uenter, ungetur cerebrum, secreto conlocabi-
tur loco

tur loco, accipiet in substantiam porros, & herbam molliſſimā, aut molliſſimum ſoenū. His potionibus percurandum: pulueris turis drachmā 1. aceti albi ſextariū 1. radicis panacis unciā 1. herbæ ſaxifragæ uncias 3. ex aqua mulſa per os dabis. Lactis caprini ſextariū unū deſundis in fauces. quod ſi deſuerit, ciminū ruſticū pondo duo in puluerem rediges, additoq; olei optimi uno ebulo, ex aqua mulſa diſfundis ad cornu. Sed cæteris potio hæc aptior creditur: apij unciā 1. iuſquiami unciā 1. ſeminis apij unciā 1. ſeminis lactucæ uncias 2. papaueris ſylueſtri unciā, quæ oīa in puluere redacta cōmiſces, et unū cochlearium magnū ex aqua dabis, uel ſi cibū non accipit, ex ſucco ptiſanæ: obſcuro et frigido & laxiore loco ſtatues, ſilentiūq; præbebis ut dormiat. prius tamen oleo ac pice liquida caput perunges, auresq; complebis, tempora etiā munies cerebellare uel ſiſcijs, mirtam quoq; aridā conteres, & aceto oleoq; miſcebis, corpusq; eius totum diutiſſime conſtricabis. Solent conſtringi & obrui ſtercore ut ſudent & dormiāt. Quibus ſi ſomnus uenerit, aſſeret ſanitatē. Rabioſum uero iumentum eadem omnia, & maiora oſtendit quā inſanum. Nam & alia animalia comedit, & facit ipſa cotaſione rabioſa. Plærunq; etiā morſibus inteſtina ſua extrahunt & ineunt fortiter. Quæ ualentudo ex nimia ſanguinis abundantia & ardore contingit. Curatur aut obſervatione & potione ſuperius declaratis.

De Chirurgia. Caput .XIII.

Chirurgia appellatur quodcumq; ſecatur ferro, uel cauterijs uritur. quæ cum ſit omnibus membris aīalium, præcipue tamen capitis neceſſaria eſt medicina. Quodcūq; igitur iumentū in qualibet parte ſegerit caput uel nudauerit caſu, ſollicite curandum ne indignatio uulneris in neruos cerebrūq; penetrādo piculū generet, nec in primo medicamētis uti acrioribus cōuenit, ſed magis melle curare, cū ad maturitatē uenerint illa quæ fracta fuerant, oſſa laxantur, tenta ſollertiter, et mobili manu uel ſorſicibus eximito. Reliqua fragmenta oſſis, quæ aſperata ſunt ferramenti cædito atq; prædito, ut carnē facilius inducāt. Nūq; enim clauditur uulnus ſi non raſeris, do nec ſanguis per os ipſius reſpōdeat. In quo maior eſt adhibēda cautela, q̃a ſolet in locis oſſuoſis et cōmiſſuralibus fiſtula fieri. quæ cū euenerit, parum per iniuria afficit uulnus, per quod non ſanies, ſed humor liquidus emanat. nec unquam deducta cicatrice ſolidatur. Quod ſi euenerit, hæc ratione curabis.

ARTIS VETERINARIAE

Papyrum per ipsam fistulam traicies, ita ut capita papyri, quæ extra fistulam eminent, ex utraq; parte alligas lino ne cadat, et diebus v. uel pluribus, donec callositas fistulæ papyri distentione turgescat, et maius vulneris foramen fiat. Tunc ad mensuram vulneris ex fistulari medicamento collyrium faciens, ex empto papyro intra fistulam injicies, ut impleatur ex integro, plane ne excidat munies diligenter. Post dies quatuor uel quinque soluis. si fistula ceciderit, traumatico curabis, quod vulneri semper immittes, donec spissa sanies et non multa in eo loco reperiatur. Cum autem iam lymphidum uideris collyrium, fac pollinem herbi, et thus masculum tritum æquis ponderibus cum melle decoquito, et plage ipsi imposito, per dies plurimos quotidie curato ita, ut deprimas ipsas partes vulneris, quatinus iunctæ citius coherescant. Si grauius offenderit caput, ut cerebrum uexet intrinsecus, continuo de temporibus sanguinem eidem oportet auferri, et spongiam aqua, si æstas fuerit, oleo roseo, et aceto æqua parte commixto capiti eius imponi, fasciâq; connecti, et cibos uirides præberi. si nec ipsos appetit, quia omnem cibum recusat, fabam moles et conuerteris in pollinem, farinam quoque triticeam pariter admisceas, et cum mulsâ per cornu ad substantiâ animali tam diu faucibus eius infundes, donec cibos uirides appetat, quos aqua marina uel salsa oportet aspergi.

De auribus. Caput. XIII.

Aurium ut uicinitate proxima, ita periculi non discrepans cura est. Quæ si casu aliquo fuerit à radice contusa, et collectionem fecerit, eam cum maturauerit, scalpello secato, et pus finito fluere, tum linis aceto acerrimo et oleo per triduum, quarta die traumatico curato donec sanetur. Etiam si cartilagnem uexauerit, eiusdem medicinæ obseruatione proficiet. Si uero à radice auriculæ, uel commissura capitis tumor magnus cum duricia extabit, ex scæni græci et lini semine et tritici polline cataplasma imposito, maturatam collectionem scalpello secato, ita ut inferius plaga spectet, quatinus humor per prona decurrat. Vino, oleo, et sale mixto infusos leniscos inducis, et uulnus per quatríduū fouebis, post traumatico uteris. sed difficilis cura est, quia fistulæ in talibus locis frequenter oriuntur. quæ si cernerint, suprascripta curatione curantur. Si tamen ægritudo uulneris ulterius etiâ post medicamenta procedat, uicinæ urendæ sunt partes, et cauterio in ipsis coll

ipsis collectionibus infigenda sunt puncta uehementius, ut et cutis et causa perrumpatur interior. post solerter uita curanda sunt. Non enim aurium est negligenda curatio, ne ex dolore nimio generetur insania. Primum purganda est auris diligenter intrinsecus, ut auferatur quod dolorem mouet, aut lædit. Si nihil inuenitur, spongiā nitro & aqua molliter infundes et dilues, unamq; noctem intra auriculā infusā spongiā manere patieris. Die tertio nitro & aqua calida fouere incipies frequēter et diu, donec dolor recedat. Quod si aqua fuerit ingressa, oleū uetus & acetum æquis ponderibus adiecto nitro in aurem mittito, & succidā lanā superimponito. Si uulnēra fuerint lyparem auribus inseres & curasti.

Depilis qui nascuntur in oculis. Cap. xv.

Quodcumq; iumentum in oculis tritiacem patietur, id est, ut pili aliam palpebram urentes lachrymas moueant, uisumq; conturbent hac ratione curatur. Non longe a pilis ab interiori parte scalpello plagam dabis in cute palpebræ, post forpicebus per longū ad mensurā oculi fasciolam præcides, et impositis fibulis consues palpebram foris uersus, ut oculus sine deformitate recipiat uisum & gratiā naturalem. Tūc uero optimo oleo, necnon etiam muria infusā spongiā superpones, & oculū fasciabis. Post die quinto soluis, tunc intrinsecus oculum collyrio curabis. de foris uero tetracharmum impones, nō prius fibulas ablaturus quā duxerit cicatricem. Nihilominus & cadentibus fibulis, collyrij cura non deerit, ne caro rursus superflua excreseat. Sed pleriq; adhibent cum deformitate cōpendium, ut partem quæ prominet ad mensuram naturæ forpicebus amputēt, pusca quæ frigida sunt propter fluxum sanguinis foueant, oculum collyrio intrinsecus curent, ne indignationis necessitate lædatur.

De suffusione oculorum. Caput. xvi.

Suffusio sicut hominum, ita iumentorum impedit uisum, cuius tria genera ab autoribus indicantur: Stenochorialis, plotochorialis, hypochorialis, græce papula nōiatur. Stenochorialis dicitur, cū constringitur uisus et uires amittit. Quæ hac ratione curanda est, ut sanguis de temporibus auferatur: radicē quoq; feniculi, et herbam celidoniā uel rutā decoques ad tertias, et cotidie ex ipsa aqua quantū manus patitur, oculus foueatur. Inun-

G gesetiam

ARTIS VETERINARIAE

ges etiam collyrio opobalsamo, quod suffusionibus prodesse consuevit. Aduersus infestantes pilos tertia cura est, ut leni tenuiq; cauterio genae quae procreuerint inurantur, quo facto, ducta cicatrice conteritur pellis, & palpebra alterius eleuata a pupilla cursu pilorum arcet iniuriam. Platochoriasis autem est cum se ultra naturalem modum pupilla diffundit, & eripit uisum, nec curari ullatenus potest. Nam sicut oui uitellus casu aliquo disruptus in priorem formam coire non potest, ita semel pupilla diffusa recipere non potest usum uidendi. Quod euenit equorum sudore dum membranae quae continet lumen, indignatione caloris disrumpitur: uel certe sollicitudo longi itineris ad indignationem iumenta compellit, aut laesum oculum dominus curare neglexerit. Quod cum accidit, oculus uidetur incolumis, nullis lachrymis, nullo sanguine, nulla indignatione prodit iniuriam, sed uisus tantum declaratur indicio, quod in pupilla ipsius imaginem tuam tanq; in speculo uidere non potes. Hypochoriaxis autem a capitis humore descendit, & in uno oculo sese primo ostendit, postea etiam ad alterum transit, intelliguntur autem humore uel lachrymis. Continuo sanguinem ei de supercilio uel de ipsa parte temporum detrahes, fomentabis ex tepida aqua, in qua radices feniculi decoctae fuerint cum ruta. Preterea iunges collyrio opoponato & opobalsamato. Quod si insisteris medicinae per lachrymarum cursum consuevit saepius caligo sanari. Temporales quoq; uenae cauterijs inuruntur, & meatum humoris excludunt.

De paracenthesi in oculis. Caput .XVII.

Quod si uis passionis intulerit cicatricem, diligenter attende quo colore sit membrana, quae apposita pupillae impedit uisum: si auroso colore fuerit, insanabilem scias. Si candida nimium, etiam noueris non posse curare ipsam. Si uero spissa fuerit colore oleagino mucosae similis, per paracenthesin ad hominum similitudinem, cum fuerit maturata curatur. Iumentum igitur pridie temperabis a cibo, uel potu maxime prohibebis, in loco mollielides, caputq; eius & ceruicem apte collocabis, ita patentem oculum facies, ut claudere non possit. deinde ab ipsa fronte paracetherium inter tunicas oculares subijcito, ne pupillam tangas, aut aliquid laedas interius, sed ipsum album de superiori parte ubi hypochysis posita est, capitello paracetherij deorsum deprimis

primis ad palpebrā inferiore subtiliter. Quod si depositū fuerit, nō prius paracetherium eximas, nisi clausum oculum penicello calido diutissime uaporaues, solet enim resilire. Quod si ita euenerit, reprimito, donec ita componatur ut resilire non possit. Cum itaq; intellexeris claritatem pupillæ sine ullo obstaculo hypochisis, tunc eximes ferrum, & inuenies aīal uidere. curabis sic. Ex oleo roseo & oui albo anacollima facies, lanam infundes, & super oculum curatum impones, ac desuper fasciabis. Caueo ne ipsa die manducet, & moueat oculum agitatione maxillæ, sed tamen si uoluerit bibat. Altera die soluis & calida fomentabis diutissime. deinde fœnigræci succum in oculo subfundis, & rursum anacollima supradictum similiter imponis, fasciabisq;. Quod cum per triduum, aut quatriuū feceris, oculum soluis, & fœnigræci succo fomentabis, ex melle optimo attico unges donec cicatrix se confirmet & oculus.

De oculolunatico. Caput. XVIII.

Est aliud uitium eiusmodi, ut interdum oculo album inducat, interdū limpidet: ex qua passione lunaticum oculum ueteres nominauerunt. Cuius ista curatio est, ut de ipsa parte temporum detrahatur sanguis, interpositis diebus sub oculo. Nihilominus sanguinem oportet minui. Cotidie quoq; calido fomento oculum curabis de foris, Intrinsecus autem inunges collyrio thermantico et acerrimo per plures dies donec recipiat sanitatem. Si nihil ex hac ratione profecerit, uenas superiores in temporibus supra ipsum locum qui sustinet passionem, diligenter perquires & inures, ut humor uoxius possit arceri.

De staphylomate oculi. Caput. XIX.

Quodcumq; iumentum in oculo habuerit staphyloma, incurabile est: talis tamen curatio consueuit adhiberi: De sub oculo sanguinem ei detrahes, & fomentabis calida cum radicibus fœniculi & rutæ decocta, inunges etiam collyrio non ualde acri, si uulnus fecerit & deplauauerit, ex succo fœnigræci fomentabis, & inunges collyrio leni, quod facit ad tunicas ruptas, donec se cicatrix cum planitie claudat, tunc uteris acriori collyrio, & per dies plurimos, donec quacunque pars æquari possit

ARTIS VETERINARIAE

aquare possit ad naturæ similitudinē, cōpleaturq; ut nō deformatur obtutus.

Ad album de oculo tollendum. Caput. xx.

Si casu aliquo aīa oculū impegerit, aut cōfricauerit, uel ex percussura laeserit & albū induxerit, etiā si totus oculus præclusus sit, tamen expi-
mētis hac ratione probatū est cito posse curari. Hederam colliges terre-
strem & in pila mundissima diutissime contundes, succum exprimes, ex hoc
animal inunges; potestate medicaminis quīvis desperata, consumitur albugo.
Sed si terrestrem hederam nō inueneris siue baccas hederæ siue folia contū-
des, & succum exprimes, & ex eo succo inunges. Si hoc quoq; difficile ui-
debiatur, aut morosum, paululum aquæ frigidæ cū folijs hederæ diutissime cō-
tundes, succum exprimes, & per siphonem ei in oculum defundis. Quod
cum per dies plurimos tam mane quā ad uesperam feceris, albū omne tol-
letur. Sed si uinū miseris optimum & recens efficacius curata sanat.

De suffusione curanda per nares. Cap. xxi.

Aliqui authores dixerunt, si dexter oculus suffusione suscepit, uel
album incurrerit, dexteram partem naris, si sinister sinistram dili-
genter inspiciet: in ipsa callositate narium foramina subtilissima in-
ueniet, quibus tenuis inferenda est fistula, per quam ille qui curare debet
os plenum uino insufflet, ut merum per foramen illud penetret. Quo facto
oculus incipiet lachrymare. Velocius autem proficiet, quia per interiores
uenas meri uirtus ad oculum penetrat.

De diuersis passionibus oculorū. Cap. xxii.

Iumentum in oculo in osse percussū, si tumorem fecerit durum, callo-
sum, & ossilagini similem, hac ratione est curandum: Deiecto animali
contra causam ipsam, cutem aperito, & ossis cisorio gingiuam, uel
cartilaginē uel os quod ex se excrecere coeperit, cedito, ut deplanes ad simi-
litudinē partis alterius. Si apte deplanaueris, aceto et oleo lineolis uel licinio
ad dito, locum ipsum complēs, & fasciabis. tertia die solues, & similiter cura-
bis p̄ dies .r. donec feruor desinat. post traumatico uteris. Catustolico quoq;
medicamento libraturā cutis consumis, quam diu lymphidum uulnus curetur et
adequetur. Quo d̄ si ipsum os concarnari non potuerit tam diu cotidie era-
dicato,

dicato donec sanguinet atq; concarnet, ita ut medicamenta congruentia vul-
neri imponas. Quod si post sanitatem causa eadem crescere coeperit, pun-
ctis cauterio subaliter urito. Oculorū epiphora infra oculū detractus sanguis
emendat, si usq; ad sanitatem melle optimo inungatur assidue. Preterea pro-
dest eidē passioni: myrræ pōdus denarij unius, crocodili stercoris semiuncia,
salis armoniaci semiuncia, sepiæ ossiū semiuncia, mellis attici cyathos 2: ex
quibus omnibus tunsis atq; permixtis oculū perunges. Magnæ lippitudini
adhibetur tale remedium: Murre trogloditis uncia 1. thuris masculi, croci si-
culi, limpidis cipriæ, eris usti, añ uncias 2. teres simul, consparges & cernes,
aque coelestis, & falerni uini, mellis attici adicies quantū sufficit, in uase ui-
treo condes, & cum necesse fuerit uteris. Si casu ciliū ruperit, fistulam dabis
& mannā thuris cum ouo impones. Discutit cicatricem oculorū eiusmodi
compositio: Spicæ nardi uncia semis, salis armoniaci uncias 3. catimæ uncia
semis, croci uncia 1. piperis semiuncia in puluerē conuerteres & uteris. Albi
uitia deterget ista curatio: Sepiæ marinæ ossis rasi 3 decem, croci 3 duos, salis
armoniaci scrupulos 2. myrrhæ, crocodili stercoris scrupulos duos. Item,
album siue glaucomata emendat: uini amenij ueteris sextarij tres, gariofilij
sextarius, mellis uncia tres, quibus omnibus decoctis uteris. Album tollit
si ex humore uel percussura euenerit: Sandaricæ uncia 2. ossis sepiæ combu-
sti uncia 4. piperis albi semiuncia, salis armoniaci uncia 2. cum melle permi-
xtis. Cicatricibus oculorum medetur ieiuna salina, si cū sale mandatur in
ore, & expuatur in oculum. Sal quoq; tritū cū osse sepiæ, & sinapis agre-
stis semine. Collyrium nardinum; opopanacis scrupulos 2. uiolæ uncias 2.
spicæ nardi, cassiæ, marrubij añ semiuncia, croci siculi uncia semis, olei semi-
unciam & scrupulos 4. piperis albi uncias sex, gummi scrupulos 5. Item
alia confectio collyrij: Eruginem eris & salē optimum æquis ponderibus
& aceti quantum sufficit musces. Necessaria compositio: rute scrupulos 4.
thuris masculi, stercoris columbini, murius, olei, croci, mellis, catimæ, olei
rosati añ scrupulos 4. diligenter trita miscebis & uteris. Si uero oculus ictu
uulneris insanabilis redditur, & (ut Mulomedici dicunt) canchremata fece-
rint, ne periculum mortis incurrat, erui pollinem cum oleo roseo & ouo si-
mul immittito. Cū purgatum uulnus fuerit, cum melle attico inungito. Sunt
& alia multa collyria, quæ quia eandem uim, easdemq; species continēt, enu-
merare superfluum duximus.

G 3 De stru

ARTIS VETERINARIAE

De strumis iumentorum. Caput XXIII.

Plerumque strumae, uel parotides, aut scrophulae iumentorum guttur infestant, & faucium tumorem producunt. Nam & subrecto sunt capite, et tanquam ab stranguria praefocantur. Hos primum somnibus calidis, et cataplasmate ex polline hordeaceo & resinae uncijis tribus mero ualido coctis, curari expedit: & cum collectio fuerit maturata, scalpello secari opus est, & quicquid collectum fuerit emittere, et aceto, et sale, & oleo infusos lemniscos subijcere. ceteris quoque diebus traumatico, et medicamentis aptis sollerter curare si uulnus pateat, dum sanetur. Nam in his locis ex praeclosure cito solet fistula fieri: quae si euenerit, ut supra demonstratum est, papyro & collyrio poterit persanari.

Deglandulis. Caput XXIII.

Glandulae quoque aialibus, et praecipue pullis, usque ad periculum interdum moleste sunt, et in morbum transeunt aliquando. quae inter maxillas inferioresque fauces nascuntur, et ad similitudinem pillularum maiores, aliae uero minores conexas ex carne obdurescunt, et tumore sine doloribus faciunt. Quae inter initia peruncta oleo, picula perfricari solent, uehementiusque manibus corrumpi, et ita uelut uanescendo sanari. Quod si excreuerint amplius, deiectione animalis, ita ut per medium secantur scalpello subtiliter cum radicibus eximuntur, ne aliqua uena tangatur. Quo facto, aceto & oleo cum sale, medicamentisque superius declaratis sananda sunt uulnera. Plerique urenda dixerunt. Sed si paruae sint prodest, ceterum maiores excandae sunt ferro.

Depullaribus. Caput XXV.

Dum caput pullorum calefecerit prima dentitio, inter gingiuas atque maxillas tumor, collectioque generatur, quae pullaria uocatur. Cuius passionis tanta tensura est, ut masticare uix possint. Sed cataplasmatibus studiosissime maturanda sunt, deinde scalpello aperienda, post sale et aceto & oleo curanda. Plerique etiam, cum ferro exemptae fuerint glandulae, propter sanguinis fluxum loca uiri debere praecipiunt, post sale & oleo octo diebus utuntur, nec non ex nitro et aqua calida diluunt. Si nitri inopia est, lotio calido aut lixiuio utuntur. Deinde uinum & oleum & farinam de eruo imponunt per triiduum, consequenter de uino ac oleo, & farina hordeacea, et melle percurant. Addentes, quaecumque plaga fuerit aut strumae uel parotidis, glandulae, quae tolluntur

luntur licio medicamento, uulnera percurari ita, ut de mali granati sicci puluis aspersus, celeriter adferat sanitatem.

De fistula maxillæ, Vel de conficiendo collyrio
fistulari. Caput .XXVI.

SI ex aliqua huiusmodi curatione iumentū fistulam in ore fecerit, hac ratione curabitur: papyrum injicies in fistulam, ut pars eius in ore extet, quam lino diligenter ligabis ne possit elabi: pars uero foris exeat, quæ nihilominus constringenda est lino ne cadat, triduo permaneat, quarta die papyrum eximes, Collyriumq; ad longitudinem et cauituram uulneris ad arctum fistule subijcies, et ne forte labatur, fasciabis locum, ita ut ad māducandū possit maxillas agitare: tertio die solues. Si fistula ceciderit, diebus septem unguento traumatico curabis. deinde collyrium ex melle et erui polline decoctum subijcies ad plenitudinem foraminis diebus plurimis. Ad ulamum, anapleroticum ipsi uulneri medicamen imponis, donec omnis plaga, ducta cicatrice, solidetur. Fistulare aut collyriū hac ratione conficies: anisi uncia .i. ferule uncia .i. æruginis æris uncia .i. battitur et calcetis uncia .i. cimini seminis uncia .i. teres cū aceto acerrimo, et secundū qualitatem uulnerū, cū usus exegerit, collyria formabis.

De expositione fistulari. Caput .XXVII.

Fistule nascuntur, quoties neruus, aut cartilago, aut os negligentia uel impitia curantis, ex plaga alicuius tabido humore uiciatur. Tūc enim quæ commeauerit ad instar cuniculi carnem indurat et incallat, et fit fistula, quæ nulla ratione sanari potest, nec aliquando coire, nec solidari, nisi penitus eximatur. Huius à diuersis autoribus tradita est diuersa curatio. Alij enim scalpello ressecari et apiri iubēt, et stringotomio decarnari, medicamentisq; acerrimis cōsumi, et sic postmodū uulnus ad cicatricē coire. Quod cū laboris ac discriminis habeat plurimū, minus tamē prodest. Alij uero cauterio omnē fistulam inurendā, uicinasq; partes eius punctis feruentibus præripendas esse duxerūt, quatinus per ignē callositate submota, astalticis medicamentis uulnera pcurētur. Sed melius est fistulā, sicut supius declaratū est, papyri injectiōe curare. quia neq; neruus, neq; uena, neq; cōmissura uexatur. Nā scalpello uel cauterio sæpe fit causa deterior, et piculū creāt. Collyriū uero

omnem

ARTIS VETERINARIAE

omne callositatē fistulae de alto à radice eius eximit. Quod si os fuerit uexatum quod oporteat radi patens uulnus, per medicamenti curam nō potest impediri. Si uero in alto tabes aliqua uel nervus aut cartilago remanserit, ex eodē collyrio puluerem facies, & frequenter iniicies. Omnia enim uulnera elympidat atq; persanat.

De tumore faucium uel capitis. Cap. XXVIII.

Interdum ad similitudinem synanches animalibus fauces & caput interius intumescunt, adeo ut bibere aut manducare non possint. Cuius totum & os & lingua, aqua calida fomentatur, & taurino felle perlinitur. Potio autem datur huiusmodi ad cornu: olei ueteris libras 2. uini sextariū 1. cōmiscet quoq; nouē caricas cū nouē capitibus porrorum, decoques, & diligentissime conteres, & in aqua ipsa nitrum alexandrinū tritū quantum sufficit misces, & ex his omnibus potionem mane & ad uesperum heminas singulas dabis, ut tumoris ipsius relaxetur ac mitigetur asperitas. Manducet autem herbam uiridem, aut qđ melius est pascatur. Quae si defuerint, farinam de hordeo facies, cui nitrū admiscebis, & sic apponis. Foenū quoq; molliissimum eliges; quod nihilominus nitro & aqua cōsparges, sanguinem non detrahas nisi forte de palato, despumes, cum coeperit conualescere, nitrum tunsum & cribratum, pulueres de radicibus cucumeris asinini syluatici cōmiscet & uini sextariū, coclearia pulueris ipsius iunge, ut huius potionis ui resolutio uentre purgetur. Alij authores tumorem capitis ac linguae uel faucium, etiā si obdurauerit, ita festinantes propter periculum curare nituntur: lapides molares plures igne succendunt, cum candere coeperint, caput equi cooperiunt, & uas plenum lotio sub ore & naribus supponunt, & per uices singulos candentes lapides in lotium immittunt, ut ille uapor ac fumus à calore lapidum concitatus, os equi & nares impleat, et suste transversum, ut apertum os habeat debet accipere. Quod cum diutissime feceris, aquam marinam calescito, uel certe salem in aqua dulci miscebis, fouendoq; dissoluis, addito aceto acerrimo, caput eius & os & ginguas diutissime confricabis. Postea simū bubulinū cum acri aceto miscebis, & tepe facies, ex quo caput totum frontemq; & labia perunges. tunc farinam hordeaceam cum aqua tepida sufficienter pro cibo dabis & potu.

Si ex ple

Si ex pletura sanguinis fauces tument. Cap. XXIX.

Quod si ex sanguine tumor ille indignationis euenerit, ita intelliges, si uenit tēsis obturabitur & halitus, et oculi sanguinei apparebūt, cui de ^{als auditus.} temporibus si non tument, aut certe de palato si ibi indignatio nō erit, sanguinem oportet auferri. cretam cimoliam duabus partibus & tertiam pariē crete nigræ, ex uino austero tēperabis, & dū calet illinis caput.

De intomatibus. i. de Tuberibus. Cap. XXX.

Sciendum est autem tubera in corporibus iumentis frequenter excrescere, quæ greci intomata uocāt. horū uariæ q̄litates & diuersa sunt noīa. Stechatoma est tuber qđ in se adipem uel pinguedinē cōtinet. Melicæris est tuber in quo caro inspissata, quo modo in uerrucis inuenitur. Aneutrisma est tuber in quo sanguis cōspiratus uberis uenæ similis inuenitur. Acteroma est tuber in quo farinosa cōgeries repitur. Ganglion est tuber quod fit ex duplicatione nerui, similis tubero cum dolore immobili. Horum omnium una est curatio. Iumentum colligatum deponitur, & contra locum causæ sagitta aut scalpello in longum dextra ac sinistra pro mensura tumoris aperitur, ita ut media fasciola cutis, quæ supra tuberū est, intacta permaneat. Post egestis uel euersis omnibus quæ tumorem mouerant, medicamentis cōpetentibus, ea quæ supra declarata sunt, producit ad cicatricem.

De lingua incisa. Caput. XXXI.

Si iumento lingua fuerit incisa, statim cum fibulis consuito, deinde uino lauato, post gallam tundito & puluerem cernito, ex eo imponis donec sanetur: cui dabis scenum molliissimum concisum, & pro hordeo sursum res. Alij postq̄ fibulas acceperint linguaq; uino fuerit elota, mel imponendum esse duxerunt, ut plagam purget & curet. Ad ultimum ex malo granato puluerem iniecerunt.

Degingiuus & dentibus. Cap. XXXII.

Si iumento loculamenta dentium. i. ginguæ uel dentes doluerint, hijs agnoscitur signis: hordeum solidum glutiet, macescit, saluarum plurimum effundit, ginguæ intumescunt. Cretam cimoliam cum aceto acer

H rimo ma

ARTIS VETERINARIAE

rinto macerato, & calentem extrinsecus maxillis inducito, ne minus quā quibus: gingivas autem interius cum puluere corticis malignanati, & melle tertia die diutissime confricato donec egesta sanie conualeſcat. Quod euenit, cum humor acrior ex capite, in maxillarum defluxerit uenas.

De osse fracto.

Caput . XXXIII.

Quod si animal iuxta collum uel molares, uel alio oris loco os freg-
rit, ut morsum claudere non possit, et apertiis dentibus horreat pro-
pendentibus labris, continuo calida fomentabis, & labrum & quae
sunt disrupta componis, fasciola tenuissima aceto & oleo madefacta diligen-
ter unam partē, deinde alteram cōpingis ad locū, & similiter fasciato, ne iterū
dissipetur: Cui & corbē cōstrictam oportet imponi, ne deprauet dentes
& labia. Cum solueris ad curandum, manu quae ante composueris contineto,
furfurem & farinam hordei mixta in cophino ad manducandum dabis, ita
ut quamdiu manducat, manus tua à loco quem continet non recedat. Cum
iam manducare noluerit, offerito ei aquam ut bibat. Cum biberit curato sumi-
liter, ut supra scriptum est. cui et succum ptisanæ conuenit dari, si minus for-
tasse manducauerit. Quem tali obseruatione per dies quadraginta curatum
restituēs sanitati.

De cartilagine narium si sanguis fluat. Ca. XXXIII.

Imento nariū cartilago si corrupta sit, & sanguis reprimi non possit,
spongiam asfram & thuris masculi pollinem commixtum impone ad lo-
cum qui laesus est, et si uulnus factum fuerit in cartilagine, hac ratione
curato. Interdum animal despumatum remissus semel de palato sanguis nō
potest reprimi, propter quam necessitatem, sicut superscriptum est, in loco
in quo sagitta ruptum est palatum, spongiam imponis, caputque eius sur-
sum constringe, & aqua frigida renes cerebrumq; testiculosq; persundis.
Quae res si tardius subuenit acatiam nigram & thuris pollinem aequis pon-
deribus ex aceto acerrimo temperabis, totumq; caput illinies, donec sanguis
ipsa cōstrictione claudatur.

De palato, si uena se nō clauferit. Ca. XXXV.

Mature piculū creat cū incisa uena claudi nō potest in palato, sed cō-
tinuo sanguis pfluū inhibetur, si aut candēti cauterio fuerit meaz-
tus ille cō-

eius ille cōbustus, & suspēsum altius caput. Cū per nares sanguis defluit, nec potest aliter retineri, coriandrū uiridē sufficienter tundes, succumq; eius ex pressū, substricto equo, naribus infundes, frigore naturali uenas prius claudis: chartā etiā et lanā cōbures, ipsumq; puluerē p̄ fistulā insufflabis naribus.

De genere & qualitate mucorum qui per nares fluunt. Caput . XXXVI.

Mucorum etiam qualitates, qui per nares effluūt, conuenit nosse, ex quibus genus passionis ostenditur, & causa cognita facilius curari potest. Mucus lymphidus cotidianus est, & nisi minus fuerit, non debet esse suspectus. Crassus autem & candidus à cerebro defluit, & admonet ad medelam capitis festinandum. Rubens, tenuis, frigidus, ueteris perfrictionis prodit iniuriam. Propter quod thermanticiis potionibus calefieri animal oportet. Cœruleus, i. fuscus leuis ab interioribus uenit, q̄ indicat febrē. et ideo conueniēs leptiperifis. i. piretran adhibenda curatio est. Crassus autem, spumofus, & pallidus, à pulmonibus nascitur, qui suspitiosos ostendit: quibus difficile, nisi festinatum fuerit, subuenitur. Fabaceus uero à glandulis serpit, quæ celeriter aut eximēdæ sunt, aut ferro curandæ, ne cōuertātur in morbū.

De cuserino. i. cum post cursum sanguinis de naribus fluit. Caput . XXXVII.

Sæpe sine ictu uulneris animalibus per nares sanguis fluit. quod uitiū cuserion uocant, quod præcipue contingit, si equus ultra uires agatur ad cursum: omni corpore oleo & aceto perungendum est animal, ac loco tepido statuendum, cooperiendum etiam diligenter, dandāq; opera ut mollior cubet, nec ad deambulādum cogatur, sed cibo diligentius reparetur. tunc erucæ unciam i. cum lacte cōteres & per cornu naribus infundes. Quod si eruca defuerit, aristologia uncia i, croci semiuncia cū uino dulci conterito, & deijcito per nares. Similiter coriandri uiridis succum exprimes & naribus infundes.

Depolypo. Caput . XXXVIII.

Si polypus oritur in naribus, præcluso spiramine strāgulabitur. stertet, humidi profluēt muci, picula passiōis plurima. hæc medicina subuenit. Si prope polypus fuerit, acutissimo excabatur ferramēto. Curādū his

H 2 rebus

ARTIS VETERINARIAE

rebus quibus circuncisa sanatur. Si uero altius fuerit, cauteriū plumbeū quādratū facies, ex quo calefacto polypū frequēter inures, & sic polypū sanas.

De siderato. Caput .XXXIX.

Iumentum si fuerit sideratū, his agnoscitur signis: Labia eius & maxilla nec non etiam nares eius deprauantur in parte, ita ut uix cibaria dentibus inlidat. Quæ etiam humoribus plena reperies, & cum uoluerit bibere, os usq; ad nares demerget in aquam; quia infirma sunt labia, quibus haustus attrahitur: aceto & sale lingua eius & labia diutissime perfricantur, donec sanguis emanat. Tertia die causticum crudū in illa parte labij imponis, quæ sentit iniuriam, cū cautela, ut prius alliges linguā, ne medicamētū uolentia noceat. Cum medicamento labia perusta uideris, aqua lauabis, deinde aceto & oleo fouebis, sicut alia uulnera, & hac ratione curabitur. Si uero maxillā sideratam habuerit & tortam, hæc est cura: De temporibus partis ipsius sanguinem detrahis, sinum bubulum acerrimo aceto permiscebis, & diutissime decoques, & parti temporum ex qua sanguinem extraxeris, calidū inducis sepius, ut exiccetur & curet, hac usus potione: Trixaginem, hyssopum syluaticum, origanum, serpillum, aristologiam, mannam croci pro æquis ponderibus cōundito atq; cribrato, ex quo puluere plenum cochleare cū aqua mulsa oleo & uino per narem sinistram ad unam heminā quotidie oportet infundi.

De obseruatione flebotomi. Caput .XL.

Conuenit de ceruicis curatione dicturo, obseruationem indicare flebotomi; quia circa ea loca frequēter operatur. Detraheturus sanguinem animal à cibo abstinebis & potu, equali loco constitues, tunc locū supra ceruicem alius teneat et adstringat ad normā, ut uena facilius appareat, Deinde supra laqueū de sinistra manus pollice uenā deprimas, ne ludat, tunc sagitta tangas. Duæ autem uenæ à capite summo descendunt, & conueniūt se sub maxillis usq; ad gulam, inde à geminis uenis inferius quatuor digitis, feramentum deprimis, ne in gulam mittas, & bifurcum tangas, & iumentū oculis. Statim sagittam duobus digitis tenebis, nec plus ferri imprimas, quā extra digitos eminebat. Nihilominus etiam mediano digito manū tuā modo suspende, ut sit leuior, ne uehementius imprimas quā oportet. quia nō plus debet quā mucro descendere. Si parum apte profluat sanguis, iumento

foenum

foenum dabis, aut aliquid quod manducet. Agitatione maxillarum plus sanguinis uena profluat.

De ceruicibus. Caput .XLI.

SI iumentum ceruicem eiecerit, aut laxauerit, aut certe uertibulas eiecerit, uel extorserit, hac ratione curabitur: Deponito iumentū atq; constringito, & ceruicem eius extendito supra fossam, donec omnia uertibula laxentur. Post oleum uetus & axungiam ueterem tunsam colatāq; permisces, & cum calefacto eodem unguento ceruicem diligenter infundis, in loco reponis, & fasciā tenuem & amplam ex oleo tepido & uino madefactā alligabis ad corpus. Lanās quoq; succidas ex oleo & uino infusas supra conuerteres, post regula soleagnijs nō minus quatuor digitis, ita ut tantum spacijs sit inter regulas alligatas & cōnexas, & lino constringes. Et si aestas fuerit quater in die suffundis; si hyems, bis. Cum modum fecerit, regulas solues. hoc die quinquagesimo & primo, post unctionibus uteris, donec ad sanitatē perducas. Si tardius confirmabit uires, regulatim & solenniter uita curabis.

De malandria. i. de uulneribus ceruicis. Ca. XLII.

SI iumento malandria de ceruice auferre uolueris, ita facies: Candentia prius cauteria pręparabis, deinde ferramento decarnabis, sic, ne nervos tangas, & uenulas quas cunque uideris emitte sanguinem, aduris. ut possit cruoris fluxus inhiberi. Caue autem ne cauterijs plus aduras, et indignatione neruorū periculū facias. Post axungia ueteri ceruicem perfricabis, & fasciā munies. Sequenti quoque die cataplasma imponere incipies, ablataq; († ferunt) lotio calido fouebis, deinde aceto & oleo dilues, & medicamentis aptis curabis. Si iam uideris cicatricem pilos renouare, puluerem ex canino capite combusto, & adipem suillum recentem permisces, & inducis; ex quo medicamento & sanitas consequitur, & pilorum redit ornatus.

De distillatione ceruicis. Caput .XLIII.

SI ceruix distillationē patiatur, tumidior uidebitur quā oportet, foetorem habebit canceraticum cum humore nigro & liquido. Cuius foramina scrutaberis diligenter, ne ulterius inter nervos aut armorum distillationem fecerit. Quod si accidit, pauca hinc difficulter euadunt.

H 3

Nam

ARTIS VETERINARIAE

nam his signis discriminē ostenditur: stridet de pectore, & per nares humorē liquidū proijcit. hac ratione curabis. Foramina de super marrubio et sale pariter contuso implebis, atq; calcabis, subter autē cataplasmate aposto laxabis. Et si loci cōditio patietur, dieresim dabis ut foras per plagas humor emanat. tertio quoq; die calida urina lauabis. deinde traumatico & pannis lineis lymphida & purata iā uulnera sanare incipies, Cuius cōpositio talis est: erui pollinis sextarium, irisillyricæ uncias 2. thuris masculi uncias 2. miscebis, & facies cephalicum medicamentum, quo uteris ad consumptionem medelæ.

De dissolutione scapularum. Caput. XLIII.

Quod si iumēto scapulae fuerint dissolutæ, diligēter inspicias, ne quas inter nervos & cōmissuras pendignes faciat, quod si inueneris quacūq; parte plagas accipere poterit, cataplasmatibus mollire, & scalpello uel cauterio aperire curabis, ut sanies illa atq; collectio defluat. Foraminibus autē traumaticū & linteola sicca dabis. Si quod inter nervos foramē factū fuerit cautiissime curato, ne ulterius aut ferrū aut cauteriū procedat, neq; putorem neq; putredinem lauis, sed magis siccis omnibus curare festina. Nā omnis humor distillationi præstat augmentū, Quum incisa uel iusta duxerint cicatricem, pro confirmatione in ultimo causticum imponitur.

De armislæsis. Caput .XLV.

Si armus læsus erit, in medio crure utræq; soluētur uenæ, et puluerē thuris cum eo qui profluit sanguine copiosissime immisto armi lineantur. Quod si plus profluat q̄ necesse sit, stercus ipsius iumētū fluētib; imponitur uenis & fascijs alligatur. Postero quoq; die quasi apoferesis fit, & ex eisdē locis sanguis detrahatur, atq; similis in omnibus cura procedit, Ab hordeo abstinēbitur, sceno sustentabitur exiguo per triduum. deinde porri tres cyathos olei heminā miscebis, & per cornu faucibus infundes. Post sextum diem lente ingredi cogatur, & cum ambulauerit, mittatur in piscinam uel flumen aut mare ut natet, cum sparcia & pannis uincto pede, postea firmioribus cibis ad saginam pristinam reuocādus. Si leuiter dolebit, uino & oleo tepesacto perfricetur in sole: si ualidius dolebit uentum in armū mittito, atq; pertundito à summa iuba infra digitos octo, ne cartilaginem tangas. Et cū inflaueris ferula uel uirga molli armum cedito, sale & oleo perfricato. ipso die postre-

die postero stracta uteris; cuius hæc erit compositio: simile sextarios duos, si defuerint pollinis triticei sextarios duos, cum aceto acri & cum tribus ouis miscebis: sed ouorū solū albū mittes: adijcies etiā pulueris thuris unciā semis. Quæ omnia manu subigis, & in armos inducis, & per dies multos armum aqua calida cū floresceni fouebis diligenter, ut mollescat, stractam quotidie imposito, de uino puro armum lauato, Additurus unguentum: baccas lauri selibrā, olei sextariū, uini boni sextariū, nitri uncias 3, sed nitrū et baccas lauri in puluerē rediges, & cribrabis. Ex quo in sole, cū calida armus fomentatus fuerit, inungatur ex tepido, & diutissime confricetur. Post syncrisma ad curandos armos inducitur, & cum melius habuerit natatum mittito. Quod si eiecerit iuxta consuetudinem ad rotam armum reponito, & supra scriptis medicamentis curato. Si non senserit, ultimum est ut uratur. Armi doloris hæc sunt signa: pedem priorem tantum quasi rigidum a foris extrahit (sed conuenit inspicere diligenter utrum ex percussura uel casu coeperit eā) & si ex iectura fuerit, prius locis suis reponenda sunt membra, & sic reliqua facienda. Quod si ex humore uel sanguine armi grauabuntur, sanguinem emittis à pectore uel unctionibus uteris.

Degenuemotouelbasi. Caput .XLVI.

Genu uel basim si semouerit ad tormētum rotæ uel macine, locis suis eiecta restitues, lanam succidam ex oleo & aceto infusam imponis, et alligabis ex more, tertio die solues fomentabisq; , post resinam induces & piculam, ad ultimum malagma uteris aut caustico.

De fractura articuli, cruris, uel coxæ. Cap. XLVII.

Impulsu axium uel rotarū in circo uel in alijs locis uarietate casuum animalibus crura franguntur, aut coxæ uel articuli, in qua necessitate si extracutē fractura ossis erupit, hoc est, si exbercenfecerit, difficile noueris et prope insanabile curā. Similis desperatio est, si coxam fregerit, aut tacrocearia, aut supra gambam, insanabilis est casus, quia non recipit ligaturam. Si uero fractura sit sine uulnere in his locis, quæ constringi possunt, hac ratione curabis: Primo fracturam recompones, & fascies, mundis scissilibus infusis ex uino & oleo conligabis, Insuper lanarū munimenta coniuges et regulas circunduces, lumentū aut in cauterio uel in scalis uel in suspenso loco, ut

als. † atrocola.

ARTIS VETERINARIAE

als. ne fractu loco, ut fractura uelut leuiter commeet, cui quotidie mane & ad uesperam
ra flebiliter, suffundes, tertio die solues, & expleta curatione ligabis. Quinto quoq; vii.
aut ix. die eadem facies, donec corpus inducat. Post hæc adijcies muscum de
uitice, aut salicis radicem, & oua cruda quinq;, uerum non regulis, ut prius,
sed circumductis ferulis alligabis. die tertio solues & fomentabis, de resina &
axungia perunges: ubi cura profecerit, malagma uel causticum inducis, non
ante tamen permittis stare iumentum quàm dies quadraginta prætereant.
hoc autem tempus est quo diuulsa uel fracta solidantur.

De flegmone, marmore, siue mallonibus. Cap. XLVIII.

Plerunq; in genibus, uel articulis aut phlegmon oritur, aut marmora,
aut mallones. Quæ uitia ex malo humore generantur, & passionem
cum deformitate tumoris ostendunt; Sed ista distantia est, quod phle-
gmon tuber est molle, marmor duriciam ostendit ex nomine, mallo inflatus tu-
ber est sine dolore, quibus recentibus potest facilius subueniri. Primo lanam
succidam ex oleo & aceto induces, contra aquam frigidam & currentem
animal constitues, Post sine ferro hac ratione curabis: Sinapis & salis ale-
xandrini 3. 4. aceti cyathos 2. axungie ueteris selibram, simul conteres & in-
duces, post diem tertium soluis. Si aperturam fecerit, spongiam cum aceto &
lasere imponis, uulnera stiptico curabis. Preterea locum, quem curare uolu-
eris, inducto pilotro decaluas, Radicem filicis & eruum & ficus aphros
contundes in pila & induces in panno, per triduum ligatum patieris mane-
re. Alij radicē filicis & eruum cum axungia ueteri & aceto acerrimo pu-
tant oportere misceri. Item cineris quoq; de foco uncias 3. calcis uiuæ un-
cias 6. uino subigito ad crassitudinem oximellis, & anteq̃ obdurescant, tu-
bercula obline. Quod si assidue in recenti feceris, passionis molestia sticabi-
tur: Si uetustiora sint, punctis subtiliter inurantur, ne ui & igne uiciantur.
Talis quoq; cōpositio spargere phlegmon asseritur. Rhododanes uncias 3.
bituminis, nitri aff. uncias 3. axungie ueteris colatæ uncias 3. pleriq; dixe-
runt cauteria cuprino candenti duobus punctis debere prærumpi, & phle-
gmon effundi, licineo quoq; intorto cū axungia, & aceto, & oleo loca, de qui-
bus muscus eiectus fuerit, satiare: per foramina etiam ustionis lemniscū trahi
debere, ut quicquid humoris est, egeratur. Post hæc cataplasma et foenugræ
co, &

co & uino confectum inducis, cū uista ceciderint & tumor resederit, lemniscum eximis, traumatico curabis, ad ulamum causticum inducis. Alij sagitta pertuso corio phlegmon effundunt, & lanā madidā cū aceto et lasare plagis inferūt, sic spongiā cum pusca acri & lasare supra uulnus imponūt: tertia die solliunt, lanam eximunt, & tetrapharmaco curant quinq; diebus uel septem. Si uero marmor habuerit, ex quo ualidius claudicet, & uix flestat articulos, inurēdus est leuiter. Cui post feruntam malagma, quæ cupressina appellatur, oportet imponi. Ex qua curatione sanitas redditur, & deformitas permanet. Si autem mallon in genibus uel articulis excreuerit, continuo curam adhiberi oportet, ne neglecta passione deformitatem tumor augeat, uel obduratione diuturna conuertatur in marmor. Aperies in pedibus siue genibus dextra ac sinistra uel ferro uel cauterio cuprino, sicut superius declaratū est, lemniscum traicies cum aceto, et sale, & oleo, ut supra, cataplasma imponis, donec feruor desinat et saniem faciat. Post purgatis uitijs lemniscos eximis, et traumaticū imponis, et ternis diebus interpositis solues, et medicamentum renouabis, donec sanetur.

De aquatilibus & ozœnis. Cap. XLIX.

SI aquatilia in articulis uel in gambis fuerint, frigido ferro oīno nō sunt tangenda, ne abundantia humoris iumento discrimen importet. Sed utēdum est scarificatione subtili, et detractione sanguinis, post quæ lauis ualidissimis, tam cum aceto quā cum optimo sale tunso, et oleo, uel axungia, per dies quinq; conliganda sunt loca. Si tardius hæc cura profecerit, utendū est feruēntissimo caustico ut faciat ustiones. Alia quoq; ratione sanātur, si sile tam qua trictores utuntur, et salem pro dimidia parte commisceas, lanamq; succidam ex aceto alliges, post diem tertium soluturus. Si aperturam fecerit farinam hordeaccam ex melle coctam cum lini semine & scenigræco inducis, ad ultimum malagma crudum impones. Præterea atrametum sutoriū, gallulas minutas, & alumen æquis ponderibus tunsum cum axungia miscabis, addito puluere mali granati, nitro, & aceto: quæ in commune decocta, uitium si adiungatur emendat. ficus sicca cum sinapi cōtusa mixto aceto imponuntur. Post diem tertium soluto medicamento, si tardius profecerit, eadem cura renouatur. Cum melius habere cœperit, allicem impone articulis. Alij opoponacem cum farina hordeacea coctum in modum cataplasma-

I tis im-po-

ARTIS VETERINARIAE

tis imponunt. Nonnulli fabam fractam in aqua decoquunt, & mixto melle deterunt, & in panno inducentes curant. Ad ultimum malagma cupressinum imponunt. Plures calcem uiuam & cineres ex melle & uino commiscet, et ozænis frequenter imponunt. Ad ultimum caustico utitur. Quæ generaturarum et posterioribus pedibus adhibenda ueterum censet auctoritas, usus inuenit, addito sale et aceto cilicij ozænas defricare, donec cruor aut tumor emanet. Quæ obseruatio etiã si non persanauerit, sequentes tamẽ adiuuat curas.

De pedibus reumaticis siue uentosis. Cap. L.

Interdum reumatici iumentorum, interdum uentosi sunt pedes: quæ uitia nunquam tangenda sunt ferro, sed exiccanda per malagmas uel causticum, et aliquando urenda leuiter per uenas, ut cauterij meatus, qui humorem suscipiunt angustentur, et cõstringantur, ut pro tẽpore afferant medicinã. Quia in totum, etiã si intercise & adustæ sunt uenæ, non poterit talis causa sanari.

De impetiginibus. Caput .LI.

Impetignes quoque in articulis uel genibus inter neruos commissuralibus locis aliquando nascuntur, & sit uulnus simile ragadio, & non facile sanatur, nisi stalticis uel stipticis rebus, non sine alligatura, uel interdum adustione curetur. Malagmas quoque conuenientes oportet imponi.

De uligine. i. dulcedine. Caput .LII.

Vligines etiã in pedibus, cruribus, unguibusque uel sub armis aliquando generantur, quas quidam dulcedines uocant, habent similitudinem scabiei. Quæ cum se diffuderint, pedes exulcerant ad similitudinem lepræ, & urgente prurigne animalia sibi partes illas corrodunt uel alternis pedibus confricando uulnerant. Quod uitium à crudo uel putrido humore consuevit generari, & idem curatur detractione sanguinis, unctionibus, & purgationibus uentris, si radix cucumeris syluatici cum nitri pulucre misceatur infusa per fauces, humores pessimos purgat.

De podagra iumentorum. Caput .LIII.

Podagra uero nonnunquam solet occupare iumenta, cum hominum uitium transit in pecudes: cuius passionis hæc sunt signa: nec stare potest nec ambulare, sed si cogatur, claudicat, & sæpe se proijciat, sicut indigesta ex hordeo

hordeo animalia faciunt, quæ propter dolorem non coquunt cibum, & ideo fit horridum, & corpus eius calebit, uenæ etiam extabunt, natura submissa erit, in pedibus sterco hærebit propter nimium eorum calorem, sicut subtritis solet euenire: cui proderit si non sinatur accubere, sed minutim deambulare & loco sicco, donec sudet, multorum manibus confricandum est, ut uehementius sudet, sanguinem ei detrahes à capite à superioribus uenis, sed non multum. sequenti die de posterioribus locis detrahes supra talos. tertio de gambis uel de sub ipsis dolorum locis. Memineris semper parum oportere detrahere. Aquam calidam dabis in potu, in qua adijcies puluerem nitri, & triticam farinam, pollinem quoque thuris acetabulum plenum in uino maceratum infundis, & triduo per nares singulas cotylas: betas etiam excoques & aquam earum ad tres cyathos suffundes, & exercebis eum singulis diebus, uentrem quoque eidem expurgabis ut auferatur humor pessimus, qui descendit in uenas. Hoc genus purgationis adhibebis: thimi acetabulum plenum in uino ueteri dulci macerabis, ei singulas cotylas per nares eidem infundis, scenum uiride adponis. Quod si defuerit, sic cum nitro aspersum dabis. Si nihil profecerit, castretur, & uitio carebit nam podagra raro uexat eunuchos.

De orthocolis siue stillosis. Caput .LIIII.

O orthocola etiam iumeta uel stillosa dicuntur, quæ contractionem neruorum patiuntur in pedibus, & de capitibus ungularum calcant, & sunt rigidi articuli, plenas ungulas in terram ponere non possunt. Quod uitium nascitur ex enormitate onerum & labore confragorum uiarum. sed hac ratione curantur: sanguinem ei de subcirro uel de coronis detrahes, ungulas bene compones, pollinem ex hordeo & resina cum axungia decoques, & ter in die perunges: tepida quoque in qua uerbena decocta fuerit, consuebis, et tota eius crura acopo perfricabis. Post dies quique cataplasmas eum ex poline hordei & lini semine & scenigræco æquis partibus ex uino decoctis: cataplasma imponis in omnibus cruribus ante acopo perunctis ab auriculis usque ad genua: quæ loca lanis succidis munies & fasciabis, & ter in die paulatim incedere facies. Si hoc non profecerit malagma hæc auriculis eius imponis: armeniaci, galbani, opoponacis, medullæ ceruinæ lib. 2. resinae terbinthinae uncias 2. apocimatis librâ, resinae frictæ librâ. S. oleum uetus quod sufficiat, lento igne decoques et colabis, impones in alutam per dies plurimos oibus pedibus, donec sani

I 2 sunt. Sed necessar

ARTIS VETERINARIAE

necessaria festinatio est, quia sic solent remanere si tardius cura praestitur. Alii uero uros censent paulatim in articulis, sed raro etiam praesista medicina.

Depedibus & ungulis. Caput. LV.

A Nimalium ungulae asperitate ac longitudine itinerum deteruntur et impediunt incessum. Ex tortura quoque, si in aspero uel lapidoso itinere iumenta coguntur ad cursum indignationes oriuntur. Postremo etiam si nulla causa praecesserit, ociosa in stabulis ex collectione humorum incipiunt claudicare. Oportet autem solum ungulae celeriter aperiri, ut per inferiores partes apostema digeratur, ne eruptionem super coronulas faciat, et difficile ac tardius cura procedat. Cuius haec sunt signa: Pedem priorem planum ponet, quod si suspendere uideris gressum, ut diligentius intelligas causam, ungulam subradis, et locum quem uideris nigriorem digito pulsabis, si cesserit in dolore et maturum fuerit, aperies, et saniem emittis, pendig-nem circuncides ad uinum, ex oleo roseo, et aceto et sale cum stercore ipsius linteola imponis, animal calciabis, tertio die soluis, si caro excreuit gramen decoques cum oleo et impones. Si uideris carnem ipsam nigrescere, inspicies ne aliquam fracturam habeat, neque clauum aut lapidem acutum, aut spinam propter quod fomentis et resina utaris, ut possit educi. Cum purum uideris uulnus, traumaticum impone. Post quod adicies fuliginem siccam. Cum autem compleueris curam, resinam remissam et sulphur imposito. Quod si adhuc in alto apostema fuerit, hordeum uel fabam in aqua decoques, et ex inde fomentabis, ut exinde ad maturitatem possit adduci. Subtritos pedes fomentabis aqua calida, axungiaque ueteri perunges. deinde testa candenti decoquis, oleo post et sulphure pariter cotrito lana candente leuiter ures per tri-duum. Si uero contuderit, sanguinem de corona emittes, et calida fomentabis, axungia ueteri perunges, ouinum quoque, sterces cum aceto permiscebis, et imponis; quamuis alij caprinum efficacius credant.

Si pulmunculum ad aperturam fecerit. Cap. LVI.

S i iumentum ad aperturam pulmunculum fecerit, scias totum solum, hoc est assen, hac ratione tollendum; ungulam subradis, deinde inter commissuram calcis et assis in circuitu incidis, subleuabis a parte priora et solum calcis retrouersus expelles, ubicumque pulmunculus fuerit, radis ad uinum, et adicies.

Et adijcies lanamentum ex oleo, et aceto, et sale, et stercore ipsius imponas et calceas, tertia die soluis et tollis post hoc fomentabis: farinam hordeaceam resinā, et acetū decoques, per triduum impones; hoc enim medicamento etiam fracturam curabis, si frequenter apponas. post etiā traumaticum cum liniamento impone, et cum corpus fecerit, coriū maligranati et bitumen iudaicū ex aceto decoques et impones triduo, et cum solueris iterū impone, donec obdurescat in cornu.

Si exungulauerit iumentum, et si suffusionem pedum patiat. Caput .LVII.

Si exungulauerit iumentum cura difficilis, sed profutura si non egebit industria, papyrum cadelarum purgatam, subtiliter carpis, intingis nōi crudi albumento circa nudatum pedem in circuitum pones, panno et fasciolo superligabis, post diem tertium soluis, fomentabis farina frumentacea, resina, aceto et melle pariter decoctis, interdum, iumentum pro farina mittis. Si uulnus non erit purum, uino tepido lauabis, liniamenta cum melle impone; cum purgauerit traumatico uteris. Cum autem duxerit cicatricem corium fabae cum pelle ceruina cumbures, ex melle temperabis, addito puluere bituminis iudaici et maligranati, cum aceto: alternis diebus medicamentum renouabis, donec cornu ungulam faciat. Ad ultimum sparciam ueterem contundes, ex aceto in olla noua decoques, ex quo ungulam obdurescentē obuolues, et ad plenā reuocas sanitatem. Si suffusiones pedes patiatur, ficus siccas cum sale pro aqua parte contonde et ungulis impone.

De pedibus attritis siue mollibus. Cap. LVIII.

Animalibus exiguae ungulae crescunt, uel attritae reparantur, si alij capita 7. Ruti manipulos 3. aluminis tumsi et cribrati uncias 7. ex ungue ueteris pondera 2. stercoris asinini plenam manum commisceas ac decoques et utaris. Prudentius consilium est pedum tueri sanitatem, quam passionem curare. Coroborantur autem ungulae, si iumenta mundissime sine stercore uel humore stabulentur, et roboreis pontibus consternantur. Articuli quoque uel suffragines post iter calido foueantur uino. Naturaliter autem molles ungulae solidantur, si hederæ seminis duas partes et alluminis rotundi unam partem pariter contundas, et calciatis pedibus per multos

I 3 dies

ARTIS VETERINARIAE

die inducas. Item subtritis pedibus prodest, picis liquidae selibrā, aceti hemina, salis librā, hederæ folijs quantū sufficit pariter contundis, & laboranti quotidie pedes perunges. Mollissima ungulae hoc uno medicamine, quo potentius nihil est, assolēt indurari. lacertā uiuū uiridē in ollam nouam mittis, adijcies olei ueteris librā i. aluminis iudaici selibrā, ceræ librā, absynthij tunsi selibrā, & decoques cum lacerto: Cum fuerit resolutū, calētia uniuersa colabis, abiectisq; ossibus & purgamentis, liquatum medicamen in ollam remittes, & cum ungues indurare uolueris, ungulam subradis, & factum unguentum in cannam uiridem mittes, adhibitis carbonibus, prope feruens, per cannam instillas ungulis; prouisurus ne coronam tangas aut ranulas, si his exceptis, in solo & in circuitu solidaturus ungulam confricabis. Memineris autem ungulas excresecdo renouari, & ideo interpositis diebus uel singulis mensibus talis cura non deest, per quam natura emendatur infirmitas.

Dedorso confirmando. Caput . LIX.

A Nimalium dorso ut laboris plurimum sentiunt, ita diligentius sunt curanda. Exceptis enim his, qui deputati sunt circo, reliquum mulorum, equorum, asinorumq; genus sub sellis aut sagmis solo tergo prestat officium. Vnde laudabilior industria est, quæ incolumitatem tuetur, quam quæ cupit lesa curari. Nam diligentia defendit à uitio, si centones uel saga primū sufficientia, deinde mollia imponantur, & lota, atque ad tempus diligenter excussa, ne aliquid sordidum aut asperitatis inhaereat quod sub pondere inulceret pellem: tunc sagmarum uel sellarum mensura conueniens, & apta qualitas debet adhiberi. Si enim ista minora fuerint uel maiora, angustiora uel ultra modum lata uel quæ non congruunt, grauius nocent. Hinc enim collisiones, suppurationes, apostemataq; nascuntur, cum nimis locis inaequalibus premitur pondere, uel discites tracturam mercurius aut spina deteritur. Ipsorum quoq; pondere, etiam si in stratis nulla sit culpa, enormitas nocet. & ideo temperanda est mensura ne inferat uulnus.

De dorso curando iam læso. Caput . LX.

Quod si dorsum sedentis iniuria tumere iam coeperit in recenti statim mallonem cepearū i. calamos siccos unde faeces dependent, inquam seruentissimam mittis, & aliquandiu maceratum, calidum super tu

super tumorem impones, fascia constringes uel cordis cum super impones, una quoque nocte manere patieris absque suppuratione palpabitur tumor. Quod si clauum fecerit, farinam hordeaceam cum folijs caulium contundis pariter et tepida impones. Cinerem quoque cum oleo miscebis, et inducis quam diu clauus cadat: cum ceciderit lyppara utere cum minutissimis pannis, uel mel cum linteolis; cum ulcus purgauerit, licio percurabis.

Si pulmunculus nascitur in dorso animalis. Cap. LXI.

Si pulmunculus natus fuerit in dorso, difficile est eum medicamentorum appositione siccare: sed si paruulus fuerit, cauterere, et precipue cuprino aperiendus est, ut sanies quam colligerat, egeratur: tunc curandus est sicut moris est uista curari: sed commodius est pulmunculum decusatim ferro secare et eximere, ita ut pellem ad modum precipidas, ne cum cicatricem duxerit, inueniatur epidarmus: oleum, acetum, et sale continuo addis in plagam, et ne nimius sanguis erumpat, stercus ipsius uulneri superponis et colligabis, die tertio folia caulium tinsa cum oleo, et aceto imponuntur per dies quinq; Cum iam ducere cicatricem coeperit, licio curabitur.

Si uulnus fecerit. Caput. LXII.

Si uero fecerit uulnus, indulgebis otium, ut diligentius curetur, et recepta sanitas confirmetur indutijs, nec imponendus est labor qui rescindat adhuc teneras cicatrices. Sanatur autem ulcus si gallas syriacas combustas cum melle superimponas. Pulueres quoque corticum pini et flos calcis uiuæ æquo pondere miscebis, et uulneribus inspergis. Pillulas quoque cypresi tinsas, et cribratas, et cortices quercus tritos et in puluerem redactos mitis. Præterea ossa sepiarum et testas etiam ostriarum in puluerem rediges, et arei quoque uasis fuliginem pariter miscebis, quæ bene tinsa si frequenter asperseris, siccatum uulnus ducet celerius cicatricem.

Ut pili renascantur. Caput. LXIII.

Quod si pili tardius cresciunt, uiuam testudinem supra sarmenta combures, et cineres eius in nouum cacabum mittes, additis uncijs 3 aluminis crudi, medulla ceruina quod sufficit, et uino infuso decoques et diebus plurimis

ARTIS VETERINARIAE LIB. II.

alis. † uino rimis imponis reuocare pilos creditur. Puluis de fabis cōbustis, uel de lupinis crudis uel de folijs fici cōbustis † seu cōmixtus superponitur assidue. Quod si nulla praeceat causa decidūt pili, Spica nardi, uinas passas pariter tundes. Ex aceto decoques, calidumq; medicamentū glabro corpori impones.

De denigrandus pilis albis. Caput .LXIII.

*gea Gesn. sutorij
de quadr. elododaphnes
pag. 444. succi
n. 42. sepi caprini*
Si album pilum nigrescere cupias, atramenti sutoricij scrupulos 7. odor
laphinis succum scrupulos 4. cepi caprini quod sufficit pariter tempera
rabis & utris.

Ut pili nigri albescant. Caput .LXV.

*Gem. ex Siberia rōp
innotat. pag. 169.*
Si diuerso albos pilos facere uolueris, cucumeris sylvestris radicem li
bram unam, nitri scrupulos duodecim, in pulueres cogis, heminam
mellis adijcies, quibus permixtis utris.

FINIS LIBRI SECVNDI.

IN TERTIVM ARTIS VETERINARIAE VEGETII LIBRVM, PROLOGVS.



MVLomedia me commentarios ordinante, ciuium,
atque amicorum frequens querela, accepti operis cō
tinuationem suspendit, desistentium aegritudines, mor
tesq; clamorissimas boum, cum magnopere peterent
publicandum, si quid pro salute tam commodorū ani
malium scriptum reperiretur in libris. Cedens itaq;
familiarium honestissimae uolūati, ex diuersis autho
ribus enucleata collegi, pedestriq; sermone in libellū conuuli. Cuius erit prae
cipua felicitas si cum nec scholasticus fastidiat, & bubulcus intelligat. Maxi
mo autē incitamento mihi fuit ipsorū boum utilitas & gratia, sine quibus nec
terra excoli, nec humanum genus sustentari ullatenus poterunt. Cuncta igitur
legumina siue frumenta bobus merito aratrisq; debentur: uinearum ipsa
rum usus

rum usus periret nisi eorū adminiculis subuehendis carpēta sudarēt. Quid de diuersorum onerum cōparatione referamus, dum inter mobilia & quicquid grauius est, absq; uehiculis pene reddatur immobile? Reliqua quoq; animalia, ipsæq; cohortales aues & eorum capiunt labore substantiam. Vnde enim equis hordeū, unde cibum canibus, unde porcis pabulū dominorū solertia ministraret, ni pararetur boū labore frumēta? Et ne longū faciā bobus debēt alimēta quicquid ali potest. Apud alios genus mulorū, apud alios camelorū, apud paucos elephātorū licet exiguus usus est, nulla potest natio esse sine bobus. Postremo ut ad prouidentissimorū uirorum scripta redeamus quorū firmatur auctoritas iusticiā iumentorum eade uiolenta derelictis terris ad siderum remeasse consortem. Quid potest laudabilius reperiri quā ut nomen æquisissimum, boum sugaretur interitus? quod dum homicidia fierent permanebat in terris. Duplicem igitur sollicitudinem oportet impendi, ut sanitas incorrupta maneat, et ægritudo quæ ex casu uel negligentia siue labore contracta est, competentis medicina curetur ratione.

VEGETII RENA

TI ARTIS VETERINARIAE LI-

BER SECVNDVS. TERTIVS.

DE OBSERVANDA BOVM SANI-

TATE. Caput primum.



T LONGÆVI ET SANI SINT boues, bubulcum cōuenit providere uel dominū, quatinus frigoribus calidissimo cubili muniantur, & si fieri potest, semper foco uicini sint boues. Quodam enim beneficio naturali eiusmodi animalibus semper ignis commodum est, siue q; inutilis & pestifer humor exudat, siue conceptū ex pastu uel opere frigus expellitur, siue in flammarum halitu interna curantur. Præsepium oportet extructum esse

K

diligenter

ARTIS VETERINARIAE

diligēter, ne quid pabuli inter pedes animalū pereat. Bouile autē loco sicco statuendū est, assidueq; mundandū est, ita quod quotidie pabulū ad edendū inutile subternatur, ut boues siccius & mollius cubent. Parum quoq; fastidium est cum boues reuocantur ex opere, ut colla eorū ex uino tepido perfundantur, & diutissime perfricentur. Cum uero de uia uel pastu redeunt luculentia adhibita, priusquā deducantur ad bouile, aqua diluendi pedes, ne inherentes corpori sordes ulcera generēt, uel ungulas faciant molliores, uel certe molestiam manducantibus, uel inquietudinē afferant dormituris. Sed hyeme omni solertia frigus est prohibēdum, uelut aestiuis mēsis pura aura quærēda. Per diē igitur sub umbra, per noctē sub diuo boues stare conuenit. Nō enim pauciores si aestuauerint, quā si alserint colligūt morbos. Preterea unum ouum crudum cum hemina salis et sextariū uini per singula capita septimo diffusi per commodum est. Iuuat etiam si allium tritum hircino misceas sepo, herbam quoq; uerbenam additam deteras, rutam herbam, etiam pollinem iniungas, & cum uino per os digeras. Cauendū præcipue est ne aut cursu nimio, aut longo itinere fatigentur, uel ullis grauioribus certe oneribus affligantur: nimiam enim lassitudinem sequitur ægrotudo, & omne animal est debile si rumpitur. Aquam quidem istius generis animal non requirit nitidissimam, nec usq; adeo læserit si sordidam biberit. Sed tamen bubulci diligentius est procurare ut mundam semper & optimam bibant. Maxime autem studendū est ut competentibus redundantibusq; saturi semper habeāt et pingues. Omnis enim ægrotudo exordium sumit ex macie. Exhaustū animal celerius labor frangit, æstus uexat, frigus penetrat. Non solum enim aestiuis mensibus pascuum sufficit ubi frondes diuersi generis addantur, & minuat uarietas ipsa fastidium. Hyeme non tantum paleis, sed fœno quoq; et hordeo, & sæpius eruo saginādi sunt boues. Nullus autem uberiores ciborum repudiabit expensas, qui considerare uoluerit boum per inopiam pereuntium quā cariora sunt precia. Aduersum boum morbos non minor adhibenda est diligentia quā equorum.

De morbis boum, & primo de malleo. Cap. .II.

Nam equinū genus morbus q̄ appellatur malleus, diuerso genere passionū emigrans per plures cōtagione cōsumit, boues quoq; idē morbus

bus interficit, sed à diuersis diuerso nomie uocatur, quæ plerūq; uulguſt ap-
 pellat. Hic morbus bouē ſi quando tentauerit, iſtis agnoſcitur ſignis; erit pi-
 lo horridus et triſtis, ſtupentibus oculis, ceruice deiecta, ſaliuis aſidue per os
 fluentibus, inceſſus pigrior, ſpina rigidior, ſaſtidium maximum, pauca ru-
 minatio: cui ſi inter initia ſubuenire tentaueris, diſcrimen euadet: ſi per negli-
 gentiam adhibeatur tardior cura, ueuſtioris morbi non poteſt ſuperari per-
 nicies roborata. Inter exordia igitur tediātī boui aduerſus oēs morbos potio
 iſta ſuccurrerit: tres ſemis uncias ſquilla minutatim conciſas, præterea ra-
 dices teneræ popinum effoſſas & diligenter lotas cōtondes in pila, & tria ex
 hijs pondera addito ſextario ſalis in uini ſeptem ſextarios mittere, & per ſe-
 ptem dies per os bobus ſingulos ſextarios digeres. Quod ſi toto anno aduer-
 ſus oēs ægri tudines deſperatas boues ſtagnare uolueris, incipiente uere. i. ab
 idibus februarij quindecim diebus continuis, hanc potionem dabis omni-
 bus diebus, quæ uſq; adeo ſalutaris eſt, ut approbatū ſit integro anno boues
 ſic curatos nullius morbi cōtagione tentari. Talis etiā compoſitio & morbis
 reſiſt it, & uires animalū ſi rmat: ſolij caprinus, ſolij mirti ſolueſtris, ſolij ci-
 preſi atī uncias tres diligentissime deteres, infundes in congū aquæ, & una
 nocte ſub diuo manere patieris, & inde unoquoq; boue tepēfacto per triduū
 ſingulos ſextarios dabis: quæ potio ad ſtagnāda aīalia quater in anno facien-
 da eſt ultimis tēporibus ueris, æſtatis, autumnī, et hyemis. Morbos ægri tūdi-
 nesq; depellit. tres uncias baccarū lauri, gentianæ, ariſtologiæ lōgæ, myrrhæ,
 betonicæ diligentissime deterere et miſce cū mero, ex quo trinas heminas triduo
 iugiter iumēto p os dabis. Spicæ quoq; allij tritæ, cū uino quoq; per nares in-
 fuſæ purgāt capita iumētorū. oua cruda cū melle iumētorū ſaucibus inſerun-
 tur, atq; ita ſaſtidii ac nauſia diſcutitur. Expedi tamen ſalē pabulis miſceri,
 Marrubiū quoq; tritū mane cū oleo uinoq; diſfundere, thuris puluerē cū me-
 ro ſiue per nares inieceris, ſiue p os dederis prodeſt. Nec minores medicina
 bobus horū copia ſubminiſtratur. Nam porros, rutā, apium, & herbā ſau-
 næ ſi quis large deterat, et miſceat uino, ternasq; heminas præbeat ad potan-
 dum ægrotantibus ſubuenit. Plurimiq; caulē uitis albæ cōciſam atq; ſerpillū
 & ſquilla partē in aqua macerāt, ternasq; heminas per triduū digerū, quæ
 potio uentrem purgat, uires quoq; confirmat. Ad interna autem curanda
 præcipue amurca creditur ſalutaris, ſi tantundē aquæ miſceas, & animal

K 2 bibere

ARTIS VETERINARIAE.

bibere consuescat. Sed quia licet sitiat, potum fastidiat ignotum. Primo cibi asperguntur, deinde aqua exigua potio medicatur, ad ultimum pro mensura miscetur, & usq; ad saturitatem sitientibus datur. Quocūq; autem tempore, sed maxime aestate, si boues concitentur ad cursum, aut alius eorum ad pernitentem soluitur, aut febriculæ cōmouentur. Natura enim pigrū, et labori potius q̄ uelocitati accommodū, uehementer læditur si ad opus cogatur insuetū. Periculosum quoq; est, si ad præsepia sues aut gallinæ peruenerint. Nam bos cum gallinæ finem inter pabula sumpserit, statim nimio uentris dolore torquetur, inflatusq; moritur; cui hac ratione succurri cōuenit: Apij seminis uncias 3, cimini sextariū semis, et duas lib. mellis cōmiscet, et tepidū per os infundes, ac tam diu ambulare compellis, & confricas manibus plurimorū, donec uentrem potio moueat. Gisi quoq; cum uino deterere, & per os dare creditur salutare remediū. Lixiuū quoq; ex arbore ulmi, uel cuiuscunq; generis ligni cinerem, dūmodo bene coctum, cū oleo miscebis, & liquidū ac tepidū diffundere per fauces, aduersus stercus plurimū prodest. Si aut porcini stercus bos deuorauerit, statim pestilentiā cōtagionis solius mallei sustinet morbi. Qui cū semel in gregē uel armentorū uel domitorū inceserit iumentorū, statim oīa animalia quæ leuem suspicionē habuerunt, de possessione tollenda sunt, & distribueda illis locis, ubi nullū pecus pascitur, ut nec sibi inuicem, nec alijs noceant. nam pascēdo herbas inficiunt, bibendo fontes, stabulo præsepia: et quāuis sani boues, odore morbidorū afflante depereunt. Vsq; eo etiam mortua caduera ultra fines uille proijcienda sunt, & altissime obruenda sunt sub terris, ne forte ipsorū corporum interna sanorū contingantur & pereant. Vno quidem uocabulo pestilentia appellatur, sed habet plurimas species, quas enumerare non licet (uel riget): facilius ipsa principia a diligentibus intelligi possint. Est itaq; humidus humor, quoties per os et nares humor effluit bobus, & fastidium ægritudoq; consequitur. Est siccus quoties nullus humor apparet, sed animal quotidie macescit & fit deterius, nec iuxta consuetudinem appetit cibos. Est articularis quoties interdum de prioribus, interdū de posterioribus pedibus claudicant boues, cum habeant ungulas sanas: Est & subrenalī quotiens a posterioribus debilitas appareat, & quia lumbi dolere creduntur. Est sarciminosus quoties per totum corpus bobus tubercula exeunt, aperiant se, & quasi sanantur, & iterum in alijs locis exeunt. Est & sub-

tercutane-

tercutaneus, quoties humor pessimus in diuersis partibus corporis bobus erumpit & decurrit. Est elephantiosis, quoties uelut scabies minutæ cicatrices excunt extra coriū, et ad similitudinē lēticulæ. Est mania quæ refectis bobus eripit sensum, ut nec audiāt more solito, nec uideāt: ex qua passione celerissime moriūtur, quāuis hilares pinguesq; uideātur. Hi oēs morbi cōtagiōe sunt pleni, & si unū animal apprehēderint, celeriter ad oīa trāseunt, & sic interdū aut integris armētis, aut oībus domitis afferūt interitus. Vnde oī stultitia quæ semel tentata fuerūt segregāda sunt animalia, et ad ea loca mītēda, ubi nullū animal pascatur, ne cōtagiōe sua oībus periculū generet, et negligētia domini (sicut solet à stultis) diuinæ imputetur offēsa. Euincēdi tamē sunt, & exquisitis remedijs expellendi quāuis acerbissimi morbi. Paracem supplarsijs comparas. Eryngion autem herba dicitur, quæ in littore nascitur prope undā maris, florē habet quasi aureū uel galbineū, folia eius sunt quasi folia cardui sylvestris, inter arenas littorum largissime spargitur, has effodies, & in umbra siccatas seruabis, aduersus morbū tam equorū quā boū plurimū profunt. Ex quibus potio cōponitur ista: Radicis panacis, itemq; radicis herbæ eryngij ternas uncias, seminis quoq; foeni uncias 3. pariter deteres diligēter, addisq; farinæ triticeæ sextariū, ita ut prius frumētū frāgas et molas: quæ oīa de calida seruēte cōspergis, et cū melle uel sapa nouenas offas singulis diebus digeres. Præterea sanguinem marinæ testudinis colliges, & cum uino per os dabis. Quam quia inuenire difficile est, uulgariū testudinū prodesse estimant. Quod utrū bene opinātur, usus uiderit. Nā auctores de terrestri testudine tractauerunt. Puluerē et cassiæ fistulæ, necnon etiam thuris pro æqua parte admisces, ex eo unā semis uncia cum sextario uini ueteris in die per nares bouis infundis. Quod medicamentū per triduū facies. Morbi quoq; quos superius noīauimus amari sunt, & nō nisi amaris potionibus superantur. Nā cōtraria cōtrarijs potionibus curātur ratione medicinae. Ideoq; puluerē herbæ absynthij et crudorū lupinorū, herbæ quoq; centaureæ uel peucedani æquis pōderibus diligēter mīsces et in sextario uini ueteris trina coclearia singulis diebus, additis uncijis 3. olei, per os dabis. Præsens quoq; remediū experimentauerunt: radicula herbæ cōsiliuginis (quā alij pulmonariā uocāt, alij tantūdem radicula) sinistra manu ante ortū solis collige (quia sic maiore uim habere creditur) tunc ad acum uel acutū cuprinum

ARTIS VETERINARIAE.

ps auricula quæ lata est, quasi in circulo signatur, adprematq; ut rupta cute leuiter sanguis exeat. Quod cum ex utraq; parte feceris, medium orbiculū perforas ad acum, & in eodem foramine inseres: quod ubi exierit, omnis pestilentie uirus per ipsum defluit uulnus, donec ille solus locus, qui designatus est, putrescat & decidat, atq; ita animal liberetur. Vsci folia cū uino trita defunduntur in nares, atq; ita singulis bobus, siue uniuersis gregibus cum morbum incurrerint subuenitur. Suffimenta quoq; plurimū uiuant, sulphur, bitumen, allium, origanum, semen coriandri, carbonibus insperge, & cooperta bouum supra uas, in quo suffimenta incēderis, diutissime continebis, ut fumus os eorum capiat, ac nares impleat, atq; ita ad cerebrum & interna salutari remedio penetret. Sed & totū suffimentare percomodū est, ut ab eodē morbo pncipes expellatur, et cætera pestilētiæ cōtagio nō coingret. Generalia igitur remedia aduersus morbos generales contagiososq; retulimus, nunc aduersus ualitudines, q̄ singlis aīalibus accidūt, nec in alia trāseūt, remedia subiūgem⁹

De cruditate. Caput .III.

CRuditās plurimum nocet, cuius hæc sunt signa: crebri ructus, cibi fastidiū, sonitus uentris, intensiōes neruorū, oculi hebetes: propter quæ nec bos ruminat, neq; linguā detergit ut solet. Prodest itaq; ut duos cōgios ubi bibi possit digerere per fauces. Post quos statim brassicas triginta caules modicas decoques, & ex aceto dabis, suspēsūq; aīal ab alio cibo penitus abstinebis. Alij cruditate laborantes, clausos in bouili detinēt, nec cibos præbent. Præterea lentisci et oleastri cacuminū pondera 4. deterūt, et cū lib. mellis atq; aquæ congio miscēt, quæ una nocte sub diuo mittūt, atq; ita faucibus digerūt. Deinde interposita hora, macerata infusaq; erui 4. lib. obijciūt, ab alio quoq; cibo uel potione prohibētur. Nā si neglecta fuerit cruditas, uentris inflatio intestinorūq; subsequitur, exprimit gemitus, cibosq; capere nō sinīt, nec in loco consistere, decūbere & uolutare cogit, caudamq; frequēter cōmouet. De exprimēto medicina est caudā iuxta clunes resticula uel lino uehementer astringi, uiniq; sextariū cū hemina olei tepidū dare p fauces, atq; ita p mille quingēto s passus bouē currentē trahere: si dolor permāserit, ungulas eius secare, et unctā manu p anū simū extrahere, & rursus agere currentē. Si tardius proficit, tres partes lauri diu cōteruntur, et cū duplici aquæ calidæ dantur. Si ista nō ualent, mirtæ foliorū syluestris duæ lib. tundūt in pila, & duæ ex

duæ ex calida aqua miscentur, ac per uas ligneū faucibus infundūtur. Atq; ita sub cauda quatuor digitis ab ano percussa uena sanguis emutatur. Qui cū satis effluxerit papyro ligata cauda restringitur. Post cōcitatus bos agitur usq; dū anhelet. Ante detractiōē tamē sanguinis adhibentur ista remedia: tribus heminis uini, quatuor uncie cōtriti olei pmiscetur, postq; potione congregetur currere; duæ quoq; uncie salis cū decem uncijis ceparū atterūtur: mel quoq; decoctū admiscetur, ex quo facta collyria longiora nō parum ualida immittunt in anū, ut uērem resoluāt: atq; ita bos currere cogitur. Ventris quoq; & intestinorum dolor sedatur, si anseres natantes, & maxime anates animal aspexerit. Nam anas mulos, etiā equinū genus cōspectu sui celeriter sanat. Sed interdū in illa medicina cōuenit sequiturq; omniū uitū, quorum signum est si exuentū † mutosumq; uentrem ediderit, singulare remediū est cupressinæ quindecim, uerbenæ quindecim gallæ diligentissime trita quantum utraq; ponderatur tanti ponderis uetustissimus caseus, quibus pariter detritis admiscetur uini austeri sextarij 4. & in potu dantur, ita ut lentisco mixtaq; oleastri cacumina præbeantur. Si uenter coeperit fluere, & uideris egere corpus et uires capiti plerūq; inutile reddit, quia ex cibarijs ad mede † lam bouis nil peruenit, quod sic uideris per uentrē projicit quā quod mādū cauerit. Quæ cū acciderint prima die à cibo et potu abstinēdū est, ita qđ nec secunda die bibere permittatur, cacumina tamē oleastri et cannæ syluestris, itēq; baccae lentisci et myrti dandæ sunt, nec post triduū etiā potestas bibendi nisi per parū cōcedenda est. Sunt qui ex folijs lauritenis librā 1. abrotanum hortense pari portione deterūt cū aquæ calide 2. sextarijs, atq; ita faucibus infundūt, pabulaq; supius præbēt. Aliqui uero 2. lib. ex uinaceis ad focū torrēt et cōterūt, et cū sextario uini austeris ad b. bēdū dāt, et cūmerata scapius cacūina obijciūt. Qđ si neq; proluuiēs uētris erit neq; intestinorū dolor recusat tamē cibos et prægrauato capite erit: lachrymæ quoq; oculis et piuita naribus currit, usq; ad ossa frons media uratur, auresq; ferro discindātur, sed uisura igne factæ ut sanescant ueteri urina bouis ipsius cōfricandæ sunt. Aures uero scissæ picula oleoq; curātur. Periculosum fastidiū bobus ranulæ faciūt, quæ aperiendæ sunt et allio cū sale pariter trito ipsa uulnera cōfricada, ut omnis humor exeat prouocatus. Melius creditur si ad acutā cannā execes ranulam, post uino os lauatur. Interposito unius horæ spatio uirides herbæ

uel frons

ARTIS VETERINARIAE

vel frondes dantur. Tam diu aut sustentantur mollibus cibis, donec facta uulnera cicatrices ducant. Si neq; ranula fuerit, & non appetent cibum, allium eritum cum oleo naribus infundes.

De Febre.

Caput .IIII.

Bos si febrile coeperit (quod ex uenarum inquietudine, & calore totius corporis uel oris intelliges) una die a cibo est penitus abstinendus, ita ut postero ieiuno eidem sub cauda exiguum sanguinem detrahas, atq; interposita hora trigesima paruos aculeos decoques, et ex oleo ac liquamine per os digeres, eamq; escā per dies quinq; ieiuno dabis. Præterea cacumina lentiu, uel oliuarum, uel tenerrimum queng; frondem, ac pampinos, si eodem tempore sunt, præbebis in cibo. Labra quoq; eius deterges ad spongiam, & aquam frigidam ter in die offeres ad bibendū, ita ut infra lectum bos febriens teneatur, nec antequam sanatus est dimittatur in pastu. Febrientis autem ista sunt signa; lachrymæ profluunt, grauatur caput, oculi semiclausi sunt, labra saluiis madida, longior & cum quodam impedimento tractus spiritus, frequenter et gemitus. Tussis bouum non minus diligenter sananda est quàm equorū: si recens fuerit, sextarius farinæ hordeaceæ cum uno ouo crudo & hemina passi per os datur ieiuno: gramen quoq; concisum tunc sumq; admixta farina fabæ frixæ & pollinis lentis, sextario aquæ calidæ miscetur, agitataq; diligenter per os diffunditur. Veterem tussim sanāt duæ libræ hyssopi macerate ex aquæ sextarijs tribus, quod infusum teritur, & cum duabus partibus farinæ miscetur, & per os datur, super quod aqua hyssopi, in aqua decoctum infusum decoctumq; etiam propinatur ad cornu. Porri etiā succus expressus cū oleo & ipsi febri cum hordeacea farina remedium præstant. Radices quoq; eius diligenter lotæ, & cum farre triticeo contusæ, ieiunoq; datæ, discutiunt uetustissimam tussim. Idem præstat eruum si in pabulis cū pisana hordei molitum, & cum aqua tepida uel mulsa in fauces saluanti ore dimissum. Suppuratio, quam apostema dicūt, melius ferro aperitur, post cū expressum pus aut sanies fuerit, sinus ipse, qui eā continebat, urina bubulina calida lauatur, ac linamentis ac stuppis sue lintrolis pice liquida et oleo infusis curatur. Quod si colligari ea pars, ubi est ulcus, non potest, lana candente seipsum caprinum aut bubulinum stillatur. Aliquātī, cū uitiosam partem inunxerint, tunc uirina ueteri humana lauant, atq; ita æquis ponderibus pice liquida cum ueteri axungia

axungia incoquunt & liniunt. Sanguis cum ex aliqua necessitate ad pedes uenerit bouum, claudicationē affert. Quod cum accidit, inspicito ungulā, inuenies eam ultra solitū calere, & uitiatā partem premi uehementer bos non patitur. Sed si sanguis adhuc super ungulas in cruribus est, ad triduū triti salis perfricatione discutitur. Quod si tantū in ungues descēderit, cultello leniter inter duas ungues aperies, & mundabis deintus, et postea stuppam sale atq; aceto infusam applicabis ad solū, sparta opere calceatur, maxime quæ datur operantibus, & in aquam non mittat pedem, sed ubi siccum est ambulet. Cui sanguis nisi emissus fuerit saniem creabit. Quo suppuratio etiam curabitur. Nam primo ferro circuncisus expurgatur ad uiuum. Deinde panis aceto & oleo & sale madefactis impletur, mox axungia ueteri & sepo hircino pari pondere ferro candenti stillantibus curatur, & perducitur ad sanitatem. Si sanguis in interiori parte ungulæ est, nec aperturam facit, & tantū claudicat animal, extrema ipsius ungulæ ad uiuum refecantur, & ita remittitur, ac stuppa uel linteolis cum sale et oleo & aceto infusis pes inuolutus sparta munitur. Mediam uero ungulā ab inferiori parte non expedit aperiri, nisi eo loco in quo suppuratio facta est. Si claudicat ex dolore neruorum, oleo & sale genua poplitesq; & crura confricanda sunt calido aceto, & lini semen aut milium detritū infusumq; aqua mulsā imponendum est, & sponsa quoq; feruenti aqua infusa & expressa, conspersaque postmodum melle, genibus circumdatur ac fasciis alligatur. Quod si humor est cum tumore, fermentū uel farina hordeacea ex passo aut aqua mulsā incocta imponitur, & cum maturauerit suppuratio, scinditur ferro, emissaq; sanie (ut supra docuimus) percuratur. Potest etiā radix lilij uel squilla cum sale, uel herba sanguinalis (quam palaganon Græci appellant) uel marrubium ferro aperta sanare. Omnis autem corporis dolor, si sine uulnere est, recens fomentis mellinis discutitur. Vetus autem uritur, Et supra uulnus uel butyrū uel caprina instillatur axungia. Scabies anatis trita oleo defricata; Eodemq; remedio rabiosi canis sanatur morbus uel lupini uulnus illatum. Vetus quoq; salsamentum utranq; perhibetur plagam curare. Ad scabiem quoq; præsentior medicina ista est: si cumulā bubulam sulphurq; conteritur, admixtaq; myrrha cum oleo atq; aceto decoquitur, & cum tepescere coeperit, alumen scissum tritum inspergitur: quod medicamentum candentis olei illinitum prodest.

L Vlceribus

ARTIS VETERINARIAE

Vlceribus gallarū tritarum puluis inspergitur. Succus quoq; marrubij impositus cum fuligine sanat. Inſeſta peſtis eſt bubulun pecori (quā magnū ruſtici uocant) cum pellis ita dorſo heret, ut apprehenſa manibus deduci nō poſſit à coſtis: quæ res non aliter accidit quā ſi boſ ex languore aliquo ad maciem deductus eſt, aut ſudans in corpore faciente refriguit, aut ſi lapſus ſub onere uehementer eſt inſuſus in pluuiā: quæ quandoq; pernicioſa ſunt: cuſtodire debemus, ut cum ab opere redierint boues adhuc eſtuantes anhelantesq; uino aſpergantur, & offula panis uino inſuſa faucibus eorum inferantur. Quod ſi prædictum uitium inheſerit, expedit decoquere laurū, et cum calida & oleo & uino ſpinam dorſumq; animalis conſtricare contra pilum, ac per omnes partes apprehendere pellē, & uelut à coſtis ſeparare. Quod aut in loco calidiſſimo faciendum eſt, aut ſub diuo ſole ſeruenta. Aliquantifecies uini & axungie cōmiſcent, eoq; medicamento tepido poſt ſomentū prædictum utuntur. Et cum grauis pernicies, ut cum pulmones exulcerantur, unde tuſſis & macies, ad ultimū uero phtifis inuadit, quæ mortem aſſerant, radix conſilignis, ſuccus porri, omniū hemina per meſuram olei miſcetur, & bibendi ſunt cum uini ſextario per dies plurimos. Nonnunquā & tumor palati ciborū ſaſtidium facit, crebrumq; ſuſpirium. Prodeſt palatum ferro aperire ut profluat ſanguis, cui eruum ſine corio maceratum ad manducandum dabis, uiridemq; frondem uel quodlibet aliud molle pabulum dum ſanetur. Si in operibus contuderit collum, præſantiſſimū remedium eſt, ſanguis ab aure emiſſus. At ſi id totū in tempore quæ uocatur † amati amaticum ſale tantum & imposito. Si ceruix mota & deiecta eſt, conſiderabimus in quā declinet, et ex diuerſa parte ſanguinē detrahimus, ex ea uena quæ in aure uidetur ampliſſima, quæ ſarcocata prius uerberanda eſt, & cum intumuerit ferro aperiatur, effuſoq; ſanguine poſtero die ex eo loco emittitur cruor, et bi duo uacatio operis datur. Tertio uero die leuis iniungitur labor, & paulatim ad operis conſuetudinem reuocatur. Quod ſi ceruix in neutrā partem deiecta eſt, mediāq; intumuit, ex utraq; auricula ſanguis emittitur. Qui ſi inter triduum q; boſ uitium cœperit emiſſus non eſt, intumeſcit collū, neruiq; tenduntur, & ita nata duricies iugum non patitur. Tali uitio comperimus aptum eſſe medicamentū, ex pice liquida et bubula medulla, hircino ſepo, et axungia uetri, oleo quoq; uetri æquis ponderibus impositum cōcoquitur, quo

quod utendū est cū bos ab opere disjungitur. et in piscina in quolibet tumore
 ceruix lauatur, cōfricaturq; diligēter prædicto medicamento, deterfaq; diluī
 tur. Si ex toto propter tumore ceruicis iugum recusat, paucis diebus requies
 ab opere danda est, et ceruix cū aqua frigida lauāda, et spuma argēti liniēda
 est. Celsus quidē iumentī ceruici herbā quæ uocatur ama (ut supra dixi)
 cōtundi et imponi iubet. Quæ ceruicē infestāt minor est cura. Nā facile sanā
 tur per ardētē lucernā oleo instillato. Melius tamē est custodire ne nascatur
 uena. Etiā colla caluescunt, quæ nō aliter glabra fiunt nisi cū sudore aut plu
 uia ceruix madefacta est in opere. Quod si acciderit, puluere lateritio trito
 priusquā deiungatur, bouis colla cōspergi oportet. Et cū exiccati fuerint, ex
 inde oleo iterū infundi. Si talū uel ungulā uomer laeserit, picem durā et axun
 gam cū sulphure et lana succida inuoluito, et candēte ferro supra uulnus im
 ponito, et ungitō: quod remediū optimū facit, si clauū calcauerit, aut acuta
 testa uel lapide ungula pertūdatur: quæ tamē si altius uulnerata est, latius ferro
 circūciditur, ita inuritur ut supra præcepi. Deinde ex parte calceata p
 tridui aceto suffuso curatur. Qd si uomer intrauerit, lactuca marina, quam
 Græci cyniolā uocāt, admixto sale imponitur. Subtriti etiā pedes eluuntur ca
 lefacta bubulina urina. Deinde fauilla sarmentorū feruētē calcare cōpellitur,
 et pice ligda cū oleo uel axungia cornua eius unguntur. Minus tamē claudi
 cant si ab opere disiunctis frigida pedes lauentur, et suffragines coronæq; ac
 scissura ipsius ungulæ, ueteri axungia defricētur. Frequēter etiā uel ab aspe
 ritate itineris, uel in proscindēdo duritiā soli, aut obuijs radicibus obuoluta
 tus cōuellit armos: Quod cū acciderit, ex prioribus cruribus sanguis emitti
 tur, si dextrā ex sinistro. Et si uehementius utraq; uitiauerit, etiā in ante
 rioribus cruribus uena soluitur. Perfractis uero cornibus, linteola, sale, atq;
 aceto et oleo imbuta ponuntur, superligatisq; per tridui eadem infundun
 tur. Quarta die tantum axungia cum pice arida et cortice pini pari pon
 dere imponitur, et ad ultimum cum iam cicatricem producant, subito in
 fricatur. Solent autem neglecta ulcera uermes creare, quæ si mane ex aqua
 frigida perfundantur, rigore eius cōtracti, decidūt: Vel si hæc ratio nihil pro
 fecerit, marrubium aut porrum conteritur, admixto sale imponitur, uel calcis
 uiuæ puluis inspergitur, aut cucurbitæ uiridis succus cū aceto mittitur. Ideoq;
 uniuersis ulceribus picem liquidam, oleum uetus et axungiam oportet adhi

ARTIS VETERINARIAE

beri, & extra vulnera etiam eodem medicamento circumliniri, ne infestentur à muscis, uel uermes creent cū uulneribus inciderint. Serpentis quoque ictus mortiferus est bobus, sed & minorum animalium noxium uirus. Nā uiperæ & celicia cum in pascuis bos improvide supercumbit, stimulo morsus imprimunt. Araneus quoque, quem Græci migaltem appellant, parui quidem corporis, non paruam solet inferre perniciem. Verum uiperæ uenenū depellit, supra tumorem, qui inflatur ex ictu, scarificatio ferro facta, ita ut herba quæ personatiam uocant, imponatur trita cum sale. Creditur radix si contusa conatur, uel siler montanum reperiatur, & trifolium simoniamū, quod fragosis locis efficacissimū nascitur, odoris grauis, bitumini similis, propter quod à Græcis asphaltum appellatur, nostri autem propter figuram acutum trifolium uocant, nam longis & hirsutis folijs uiret, caulemque robustiorem facit quā pratense: huius herbe succus cum uino faucibus infundatur, atque ipsa folia cū sale trita imponantur in plagam. Quod si uiridem minime reperiunt, semina eius collecta & trita dantur ad potandum cum uino. Radices quoque eius cū succo caulis trite, addita hordeacea farina & sale, cū aqua mulsā scarificationi superponuntur. Est etiam præsens remedium si fraxini cacumina tenera contras cum sextarijs uini quatuor uel olei, expressumque succum faucibus infundas. Itemque cacumina eiusdem arboris cum sale trita lassis naribus superponas. Celiciæ enim morsus tumorem, suppuratumque generat. Idemque facit muris aranei. Sed celiciæ morsus sanatur, si acu ærea locum læsum compungas, et creta cimo ea ex aceto oblinis: Muris uero perniciēs, si animal ipsum oleo mersum nece, & plagam dentium ex eodē confrices. Quod si nō fuerit, contritum ciminum cū picula & axungia, ut similitudinē malagmæ habeat, impositū plagæ, perniciem submouet. Quod si antequā tumor discutiatur suppurationis fuerit generata, optimū est ignea lamina uel cauterio collectionē apire, qui quod diutiosum est inurere, atque ita cū liquida pice & oleo inlinere. Quidā mium muris araneū creta figulari circumdant, & colla bouum suspendunt, moxque ipsius bestie submouent. Oculorum uitia plurima in illis sanantur. Nam siue intumuerunt aqua mulsā triticea farina cōspargitur & imponitur, siue album in oculo est salis fossilis Hispani uel armeniacci, uel cū melle pexmixti uitium extenuant. Idem præstat trita sepiæ testa, & per fistulam oculi ter in die insufflata. Prodest etiam radix, quā Græci silpion uocant, nostri

autem

autem laserpitium, huiusmodi quantum uolueris ponderis cū decima parte salis armeniacy & cū fistula oculo insufflas. Quæ radix tunsa et cū oleo lentisci mixta uitiū expurgat. Si genæ humorē profundūt, lachrymisq; uisus cōfunditur (quam epiphorā uocant) polenta ex hordeo mulsa aquæ cōspersa super genas superciliaq; imposita reprimit humorē. Pastinaca quoq; agrestis, quā armoneacea uocant, cū melle trita oculorū sedat dolorē. Memineris uero quoties mel aliō sue succos remedio adhibes, ut prius pice liquida cum oleo circūlinias oculos, ne à muscis apibúsue uel uestpis infestētur, quas dulcedo mellis inuitat. Plurimūq; hirudo, id est, sanguisuga, cū foris iuxta fauces hæret, sanguinē trahit, eam à iumento digitis oportet auferri: sed si interiorius sit, ut manu detrahi nō possit, cannā uel fistulā perforatā inserito faucibus, ac per eam calidū oleū infundes. Nam eo cōtactu bestiolæ importunitas recedit. Odor quoq; cimini super carbones impositi ubi sanguisugam afflauerit, euellet à uulnere. Quod si stomachū uel intestinū tenuerit, calido aceto p cornu infuso necatur. Machina quoq; describēda est fabrica, qua cōclusa cuiusuis generis iumēta bouesq; curātur, ut et tutus ad pecudē medendū accessus sit, nec luctando quadrupes aut mēbra cōuxet, ac sic remedia despuet. Roboreas asses cōstringis, soliū, quod in longitudine nouē pedes debet habere, in altitudinē pars posterior duos sumipedē: Pars uero quæ ad priora animalū pertinet quatuor pedes: textūtur ita ut uelū in caudā ductū non possit exire. Sed à parte posteriori paululū latiorē, à priore strictiorē machinā cōpingi oportet. Cui trāsuersum trigillū ad modū iugī confirmandū est, ad quod equorū capita uel bouū cornua religātur. Nam reliquū corpus ad temones socios uel funibus alligetur, ut iuuamentū præstetur ad medentis arbitrium. Quæ machina ad omnium maiorū animalū medelā solet esse cōmunis.

Ab initio huius tertij libri usq; huc, nō habentur in uetustiore codice, et totū censetur una rubrica (ut ait) quatuor capitum: & propterea subsequens reputabitur caput secundum.

Si uermes animal fecerit. Caput .II.

SI uulnus in dorso, aut quacūq; parte corporis cœperit habere uermes, & timetur ne putredo uulneris transeat in cancrum, nepitā & cedrinā

L 3

sive cimi

ARTIS VETERINARIAE

Mercurius siue ciminū ut cicutā cōteres ex aceto, & imponis. Calcē quoq; uiuā ex aceto acerrimo temperatā necare uermes experimenta docuerunt. Si tūermiculus dorso putredinem fecerit, utilissimum est cauterizare subtiliter, postea cū melle & uino cōterere & imponere. Pannos quoq; minutos cū oleo & aceto uulnera purgare manifestum est. Quo factō si necessitas fuerit, ustio rursus adhibetur. Ad ultimum cornu caprinum combustum & contritū uaget, ulceribus superinspergitur, ut recuperetur & sanitas ei detur.

De curalumborum. Caput .III.

Lumborum quoque cura uicina est. Nam animalia aut cum nimio pondere, aut cum transcendere fossam conātur, si posteriores resederint pedes, aut nimio frigoris dolore renū cōtrahūtur. Ideoq; aqua calida cū flore fœni diutissime consouendi sunt lumbi. Inunctionibus etiā calidissimis perfricādi, et ad ultimū afro nitro diluti, inducto caustico corroborandi. Quod si dolor uehementior fuerit, de inguibus soluendae sunt uenae, & oleum cum axungia sanguini qui profluit immixta, renibus inlinuntur. Et si necessitas fuerit, cataplasmis utendum est. Potio quoque renibus subuenit, si pillulas cypressi incidis duodecim supra carbones, nitri quoq; uncias tresas, et utraq; in puluerem redigas, cum uncis tribus mellis, & uini ueteris sextariis tribus, & olei boni tribus uncis, quod per quatrimum aqua parte faucibus digeris. Vitio lumborum medetur hemina seminis brassicae cum sextario polentae attusa ex aqua frigida subacta atque imposita dolentibus locis. Si sembrum quoque cum polentae sextario & aqua subactum medetur. Efficacius tamen est si cypressi folia ad modum heminae diligentissime contundas et polentae sextarium admisceas, acriq; aceto subactis dolenti imponas. Praeterea resina dura uncias sex decoquas ut liquecat, cui seruēt superaspergis hordeaceam farinā quā diu inspissetur ad similitudinem pulmenti, & diu subactis, & calidum ita ut manus pati possit, super illius renibus. Quod si frequenter renouaueris, & dolori subuenit & tumori. Si uero tanta indignatio fuerit, ut eiusmodi non sentiat curas, aut cauterio cuprino locis opportunitis urendo deprimes puncta ne deformetur animal, taut si uilius est, aut necessitati aptum, quos decori gratia lare sicut moris est, uteris.

R Quibus signis renū dolor indicetur. Ca. II. II.
Etiam autem dolor his agnoscitur signis: Posteriores ungulas trahit, lumbos

bit, lumbi uacillabunt, cauda deiecta erit, & foetulēter mingit, ilia dura atq; contracta. Interdum tales sunt renes, ut sanguinem mingant, et si nimium effuderit incurabilis est passio. Si parū cruoris abundauerit, scito posse curari. Cui post detractum sanguinem uel de matrice, uel de femoribus, hanc potionem dabis, uidelicet porri sectiui succum ex aqua.

De internis musculis. Caput .v.

SAepe musculi, qui in renibus sunt, uexantur ex casu, & exteriores facilius curantur, si iusta medela afferunt tarditatem. Optimū est quoties ceciderit iumentū loco nō moueri, & aqua frigida perfundi, & postmodum unguentis uti. Quae passio ista cōsuevit ferre indicia: renes obdurescūt, cōtrahuntur testes, coxāq; trahit, & colligere se nō poterit. Quae ualitudo nascitur ex itineris longi fatigatione, aut ab infractu cliuorum uiarū. Incitatio quoq; cursus, & saltus extensio hanc adferunt causam. Sanguinem igitur ex uisceribus oportet emitti, pro ut qualitas corporis patietur. Vtendū est potionibus etiā ad ualitudinem necessarijs, molli dormitione animal collocandum.

Si talus exeat animalī. Caput .vi.

EX perfrictione nōnunquā animalibus exit foras talus, qui hac ratione curatur: Scalpello scarificabis, praecipue loca quae uidentur eminētiora, similiāque uesiculis, scarificatio digitis exprimitur et decarnatur, puluere salis perfricatur, donec cum sanguine actus humor exiccetur. Post calida & sale fouebis, & deprimendo intus remittis, & continuo reuertetur ad locum unde exierat. Altera intus digitis mustis inlita lypparia uel meliloto, donec sanetur. Quod uitium si ferro tangere dubitas, hoc medicamento curabis quotidie: Castorei uncias tres, salis triti pondera duo, salis armeniaci lib. unā, sinapis pontici uncias 6. omnia trunsa et cribrata pariter decoques, impones talo, & alligabis quotidie, aut lixiuio calido fouebis, et medela cōtinua usq; ad sanitatem. Potionibus autē thermanticis calefiet agrotū. Alij in hac passione cū axungia ad manus talos fulciri & reponi oportere dixerūt, postea spongia apponi caudam supra alligando. Si tamen diebus aliquot fuerit cura neglecta, prius foueri ad sex ex lixiuio, uel sale & urina calenti, & sic reliqua curationibus impleri.

De dolore

ARTIS VETERINARIAE.

Dedolore renum. Caput .VII.

Dolor renum animalibus sæpe contingit, his proditur signis: nec incedere poterit, nec cubare, ilia eius inflantur et obdurescunt. quorum ista curatio est. Sanguis de utrisq; femoribus emittitur, postea lotiū uetus & putridū in uase supponitur, & lapides molares feruētes mittuntur, animal sagis diligentissime usq; ad ungulas operiatur, ut uapore lotij uenæ testium sudent, post aqua calida confouentur, nitrum & alumen scissum pariter conteres diligenter, & admixto oleo testes perunges fricando. Si molares huiusmodi rei proditur & ma lentis hemina unā decoquis, admixto uino mortario teres, cypressi folia 3 4. mollissime pariter trita commiscis, tantundē etiā suillæ adipis adiunges, uinumq; uetus desuper sparges, panno inlinitū testibus apponas, donec sanitas procuretur. Si tardius dabitur sanitas, testes subterstilatis cauterijs urito, uel leuiter scarificato.

Detumore testium. Caput .VIII.

Hordeum cōburito, pulueresq; ex eo trito suillæ adipi misceto, ex quo medicamento mane et uespere testes illinito. Physicum autē creditur, testes animalium ablutos canino felle sanari. Alij authores aqua calida testes cum dolent fouendos esse duxerunt, suffumigandos etiā uiridibus folijs, cypressiq; arboris specialiter mederi testibus creditur. Sed si defuerit testes ardentes nihilominus in aqua calida mitti, & inde suffumigari, post creatas cimolias cū stercore bubulino ex aceto acerrimo calentes induci, & quotidie reuocari, quousq; sanitas subsequatur.

Si natura reuocari non possit. Caput .IX.

Si natura iumento excedit, & reuocari non possit, in aqua frigidissima constituendum est, & ibi fouendum, & sublitam manum in anum eius iniicies, & contra uesicam fricabis, post diligenter cooperies ne perfriescat. Potiones dabis, stercus suillum quotidie ex uino, aut in aqua dulci, donec liberetur.

Si iumentum sanguinem minxerit. Ca. X.

Si iumentum sanguinem minxerit, uel adsellatum fuerit, hac ratione curabitur: De superiori uena sanguis auferatur, aphodilli quoq; herba redix teritur

dix teritur, & cum uini albi dulcis duabus cotylis per os infunditur, quæ glutinosa uideatur. Prodest etiam farinam triticeam cum adipe suilla et puluere corticis mali granati decoquere, & non crassas potiones, sed liquidas per os fundere, et non solum à cursibus, sed etiam ab ambulatione abstinendum est, ut glutinetur uena quæ interrupta est. Contingit enim cursu uel saltu, ut intrinsecæ uenæ rumpantur, quapropter rebus stipticis, & his quæ cōsolidationem faciunt curentur. Super renes hoc anacollima oportet imponi; bulbos tascideas uiuas contusas, allia quinque, anagallici libram, quæ omnia pariter bene trita commiscis, et renibus eius imponis. Qd̄ prodest etiam illis, quibus euulsi uel emoti sunt renes. His autem quibus per nares effluit sanguis, pusca frigidissima caput eius fouebis, modicum salis adicies, post anacollima in capite & in temporibus oblinis, & in medicamento constrictis uenis fluxum sanguinis reprimis.

De dysenteria. Caput .XI

Si dysenteria iumentum apprehenderit, reuersatur eius extalis, quæ ut curetur circumsecanda est cautissime, ne intestinū, quod præpositū est extali, frangatur. Procidit intestinū à cōtactu, uitæ periculū facit si tangatur: quod semel nō redit, & sic remanebit, & paululū exit extalis supra.

Si otiosum animal sanguinem mingat. Cap. XII.

Animalibus otiosis & pigris contingit expletura sanguinem mingere, cum hoc quod abundat, erumpendi per urinā inuenit uiam: attenuati & exhausti animalis interdū est in terra sanguinea. Quod accidit, aut ex nimio ascensu, aut labore ponderis, aut nimietate cursus sodalis. Qui ex delitijs aut abundantia contraxerit passionēs, de matrice auferunt sanguinem: attenuatis uenas laxare cōtrarium. Vtrisque tamen salutaris est potio, si lac caprinū cum à matricibus obolis, & uitiolari herbe succo paulillos facias, ex quibus unum per os frequēter infundas. Certissima quoque ad ipsorum salutem potio prædicatur, si draganti unciam semis, mespili æstheracis æ tres, nucleos pini. hos purgatos ducentos decē infundis in uino optimo, & diutissime, post ad magnitudinem nucis auellane cum apibus attritos et uini sextario resolutos dabis ad cornu, & faucibus digeres per dies continuos septem, quod etiā omnibus prodest cum fabæ magnitudine cum ouo dedisse.

M

Si animal

ARTIS VETERINARIAE

Si animal sanguinem uomat. Caput .XIII.

SI uero sanguinem uomat, oportet genestæ succum cum uino atq; porri succo lixiuo oleoq; permixto faucibus infundere. Aliquando animalia sanguinē uomūt, q̄bushac potiōe succurritur: absynthiū pōticūet spicā nardi aquis pōderibus in cacabo nouo cū aqua decoques, & dabis in potu.

Si percussa uena claudī non possit. Cap. .XIIII.

SI sanguis interdum nimis per uenam cum percussa fuerit ut claudī nō possit erūpat, remediū est, stercus ipsius animalis supponere fluentibus uenis: Aut si perseverauerit, urere cauterio subtiliter ne nerui ledātur. floccum etiam competenti oleo tinctum uenæ admoueto: etiam assem lineum in uena qua sanguis profluit, ponis, & ligas, præsens est remedium.

De indignatione uesicæ. Caput .XV.

Vesicæ indignatio generatur ex plurimis causis. Quapropter urinae difficultatē, immo præsens discriminē inportat. De qua ualitudine diligēter tractari cōuenit, ut passioni competens medela succurrat: quæ his agnoscitur signis, mingere nō poterit, omnia crura flectētur, dimittitur uenter ad terram. Et si difficulter mingit dysuria appellatur. Sed quando guttas per uere trū mittit cū labore, strāguria dicitur. Quū in totū non potest mingere dysuria appellatur, & uicinus est morti. Propter quod extēsiōnes & tubercula nascūtur in dorso, & præfocatio circa fauces ex dolore uentris. Cui hac ratione succurris: de pectore uenas pungis, & sanguinē quantum uidebitur detrahis, & sic accipitur lauamentū. Præterea manū tepidam cū oleo in anū mittis, et si qua stercora iueneris intus, quia impedimentū præstant, attrahis. Post cū libra olei, salis triti plenū acetabulū misces, & calefactum inijcies in anū, iumeto in locis pronis posito, ut facilius ad interiora descendat, dulcedo enim sequitur ac solutio uētris, & dolor mitigatur. Quæ remedia si tarde subuenerint, manus & brachia perungito, & cū magno sensu atq; cautela manus inijcito, et in partē dextrā et in partē sinistrā, et sic manū plenā leuiter præmito, ut incipias in hac procedere, & sic liberabitur. Valde spinæ est cōtrariū. Exhis causis passio ita descēdit, si iumentū in ope aut cursu magna pte duci cogatur, et urinae facili spaciū denegatur, et à uesicæ meatu usq; ad

usq; ad ueretrū nascitur tumor, & cū dolore egestionis foramē angustatur. Ediuerso, si iumentū exerceri solitū, diebus plurimis steterit, indigestione nascuntur spurcitie, & humores efferūtur usq; ad uesticā, cōpunctiones etiā et morsus urināi fistule præstant, ex quo stranguria plerūq; cōtingit. Ex perfrictione & indignatione dysuria solet uenire, cum nimio rigore meatus intumuerit. Et ideo calefactionibus diuersis à frigore soluenda est iniuria celeriter. Interdum & indigestione hordei, & cum aquam frigidā auidissime biberint, dolores ueneris animalia patiūtur, & propter uicinatē commota uestica stranguriam sustinent. Aliquando & sterco pullinū, & alia noxia in cibo sumpta, cum inflationem fecerint, impediunt minctionem. Bestiola etiam quæ appellatur uulpestres, aranie similes, cum deuorata fuerint animal præfocant. Aqua quoq; coeno uel limo turbida si bibatur, meatus impedit minctionis. Vermes quoq; uel lumbrici in intestinis cum ex ulcere uenerūt, uesticas ledunt, & dupliciter animalibus discrimen important. Quod his deprehenditur signis: animal quod tardius mingit latera sibi scalpit uel terrā mordet, scias eum uermibus uel lūbricis extorqueri. Cui hac ratione succurris: brassicæ folia subtilissime cōtundis & cōmiscis boni uini cotylas quatuor, et per sinistrā narem infundis: laser quoq; syriacū & nitri puluerem cum uino decoquis et per os digeris, Inambulationibus et leni cursu exercebis in loco molli uel herbido, uel ad aquam leuiter abeuntē ad urinam inuitabis. Si ubi aliquod aliud animal minxerit, teneatur, facilius prouocatur. Quæ præmittuntur ut ueniatur ad curas: aqua enim calida diutissime lumbi fouebuntur & renes, tunc hauenam agrestem ex uino dulcissimo duabus cotylis decoquis, & per sinistram narem infundis colatos humores; ficus præterea optimas decoques in aquæ cotylis quatuor, mixtoq; nitri puluere similiter diffundes. Aliū quoq; cum uino decoctū, & per sinistrā narem infusum producit urinas. Memineris statim cum in passionē ceciderit, hordeū eis subtrahendū penitus & potus, herbas uirides uel farragnes ad sustentandum dandas. Sarmatarū autem æquitatus ueteres plurimū ualuerunt, usus inuenit, ut animalia à collo usq; ad pedes inuoluantur de sagis, suppositisq; carbonibus uiuis, addito castoreo, suffumigentur, ut totum uentrem testiculosq; eorum castorei fumus euaporet, & confestim detractis carbonibus cooperti deambulant, & mingunt. Allumen salsum, & sale fricato admixtoque oleo,

M a & melle

ARTIS VETERINARIAE

& melle collyrium longum & tenue facito, & in ueretri ipsius foramine in-
 serito, continuo prouocabitur. In ano panacis quantum digiti minoris extre-
 mitas est, dabis. Alij cepas acerrimas & leuiter contusas tres aut quinq; po-
 nunt in anũ, & sic de ambulare faciunt. Ad urinas inuentus est qui affirmat
 & ungulam equi ipsius radi & teri cum uini sextario, & per nares infundi
 ad celerem mictionem. Si non tali ratione prodesset, betas & malas deco-
 ques, & aquam earum calentem cum melle ad unũ sextariũ naribus infun-
 des. Si tempus uirides denegat cibos, foenum mellicrato aspersum praebebis;
 uel succum ptisanæ hordeaceæ cum mellicrato similiter dabis. Aliquantũ ros-
 marinos decoquunt, & ex ea calida fouent. Alij cimices tritos in nares ani-
 malis mūtunt, & aliam super naturam quam ingunt cōfricant. certissimum
 dicitur. Porros decoques, & succum eorum exprimes ad sextarium 1. et cū
 uini ueteris et hemina olei acetabulũ permisces, & per narem dextrā dabis,
 deambulādo ducis. Vulgare et uerũ est remediũ, lutũ de uia ex lotio cuiuscũq;
 equi factum, uinoq; permixtum & colatum naribus infundas. Apij radices
 aut mellicrato decoctas praebebis, pulueremq; thuris ouumq; crudũ cum ui-
 no dulci permixta & calefacta supra renes & ilia inungens consuebis. Ex
 melle quoq; decocto & sale collyria longa & tenuia foramini immittun-
 tur quo emanat urina. Musca uiua & loco ipsi immittitur, uel mica thu-
 ris apponitur, & de bitumine collo inseritur, ut prouocetur urina.

De fluxu uentris. Caput .XVI.

Quibus modis strictus uenter solui debet saepe praedictum est, Nunc
 exponendum est quemadmodũ, si solutus, postea restringitur. Et
 enim hoc animalibus periculosum nimis est, nisi uelox medicina sub-
 uenerit, cuius necessitas de experimẽto principali tenendũ est. † Clistere un-
 ciam ex uino austero dabis, caryotas tundis & gallas syriacas, & exinde da-
 tur potio salutaris. Talis quoq; subuenit cōpositio: cerae uncias 2. lardi librā
 unā, piperis uncia semis, piculae semiuincia diligētissime tundes, cassiae un-
 cia semis trita pariter conspergas, offas facies, solito more intinges in cera cū
 remissa est. Sic quoq; digeres stercoris ouis libram, & in aceti et mulse sex-
 tario per cornu dabis, herba rubea restringes, si dederis in uino spongiam.
 Offam intinges in pice liquida, post cōbures, farināq; eius cum uino austero
 defundes.

defundes, farinae triticeae heminas quatuor pariter cōmifces & digeres. Nitrum quoq; si potest fieri, uirgineum diligentissime tritum & in puluerem redactum, cum aceti semiuncia diligentissime tritum dabis heminam. Puluis ex pumice datus cum uino in potu, mox medetur.

De uerrucis. Caput .XVII.

Alijs quoq; partibus corporis nascuntur aliquando uerrucae, & uitiū difformitatis important, hac ratione curandae: lino subtili cōfiringentur ipse uerrucae, in causticum crudum imponitur & sponte decidunt. ferro etiā praeciduntur, & de cauterio leuiter adusta sanantur.

De uitijs coxarum. Caput .XVIII.

Misera fit coxa, cui de uenis femoris sanguis emittitur, & in uase diligenter excipitur, admiscetur etiam puluis sulphuris, nitri, baccarū lauri, simul tritis, & contra pilos diutissime perfricatur, & per triduum sic permanere permittitur. Aqua etiā, in qua uerbena cocta sunt tepida (datur indie) fomentabis: pedes quos sanos habet glante ferreo, uel si defuerit, sparteae calceabis, cui lemniscos subijcis, et addita fasciola diligentissime colligabis, & suppositiciam facies parti illi quae misera est, ut planas ungulas possit ponere, in crisma etiam perunges in sole non minus quam hora, contra incisuras quatuor foraminibus cauteri pertunde, & pannos uel lemniscos ex aceto sub cute per foramina traice per triduum, post traumatico illinitos pānos diebus nouem per eadem foramina traicies, uel calida uerbena utaris, et sic lemniscos subijcias. Undecim quoq; lemniscos inducis et incretas locū ut cutis ad pulpas adhereat. Cū cicatrices se clauferint, causticū imponunt. Hac ratione emota uel laesa coxa sanabitur. Vel si coxa se laeserit, uel à Mulomedicis dicitur filius laesisse, certior & facilius curatio inuenta docetur, & probata. Nā dudū claudū aīal in sole ponūt, uino & oleo calefacto calefaciūt ipsum, hoc est, iuncturas coxae diutissime confricant, donec sudet. Tunc animal capistro trahunt, & sensim currūt, alius lorū uel funes tenet, lassus sequitur, & subito dum animal currit, rectā ad se coxas ipse cum impetu trahit, si fouerit, scias loco suo redisse, paululumq; cessabis, post sensim deambulando tentabis. Si ad locum suum redierit, retractos pedes ponit, & minus claudicat. Vltius animal non conuexabis, sed per triduum fomen-

M 3 tabis:

ARTIS VETERINARIAE.

tabis calida uerbenatia, post causticum induces. Quod si prima die iunctura componi non potest, secunda die simili ratione coxas sepius trahis, donec reuertatur ad locum. Quicquid autem uexatum uel remotum fuerit uel ictu rotæ, aut quocumq; alio casu, in prioribus uel posterioribus partibus, uel articulis, uel genibus, hoc anacollima constringit & consolidat. Bulbos rufos triginta, cochleas uiuas triginta, anagallici libram 1. plantaginis uiridis manū plenam diligentissime contundis & misces, additis tribus ouis, cū stuppa imponis, & colligas. laxata constringet, & tumefacta sedabit.

De laccis gambarum. Caput .XIX.

Si iumento laccæ enatæ fuerint in gambis, his agnoscitur signis: Dextra ac sinistra ad similitudinē uesticæ inflabitur cutis. Curādū est aut hac rōne qua flegma in genibus diximus oportere curari. Est & alia medicina. Lentes quæ supra aquā natāt colligas atq; cū tundis, additaq; ueteri axungia colligabis. Vitii exicare prohibetur. Si gamba uel armus aliquo loco ex ictu aliquo tumere cœperit, cretā cimoliā & lubricā ex aceto acerrimo miscebis & oblinis.

De gamboso. Caput .XX.

Si gambosum factum fuerit aīal, & recens passio est, de tibia sanguinem emittito, lanā succidā circūligato. Caue ne fomentis aut cauterio tangas, utrūq; enim in tali curatione contrariū est. Malagma cruda uteris, tertio die semper soluis & curas. Cū uideris aīal profecisse, causticū inducis. Si quod iumentū coxā fregerit, aut supragambā, scias nō posse curari q̄a partes istæ ligaturas tenere non possunt.

De his quæ læduntur à rotis. Caput .XXI.

Si iumentum aut rotæ, aut axis ictu fuerit elisum, in recenti lanam succidam ex aceto & oleo colligabis per triduū, post ficos duplices & nitrum pariter tritū imposito, die tertio soluito ac renouato. Si nihil profecerit, malagma tetrapharmaci imposito per triduū. Si & ipsa tardauerit, imposito malagnā quæ dicitur meliacinus, usq; dum sanetur.

De Syrmatico. i. quod coxā subito trahit. Ca. XXII.

Syrmaticū iumentū his agnoscitur signis: Prodiēs de equili, uel de loco ubi steterit, coxā trahit, & trāsuersum ungulā inflexis coronis terræ superim

superimponēs ostendit, & syrmaticū (et ragidorū paleis quæ trahuntur) dicitur. Sed quāuis alienata horū, uel emota coxa uideatur, si super (tempaueris ^{als. si super ip-} pedes cessis) compellatur, continuo emēdabitur gressus, & sine claudicatione ^{sum cess.} rectus incedet. Ex hac autē ratione contingit, si cōmissurā uertibuli ex corruptione corporis, uel perfrictione natus humor intrauerit, tunc se defundit ad nervos, & eos reddit immobiles, & uelut alienatos. quæ hac ratione curantur: Sanguis ei de subgamba detrahatur copiosus, in quo admiscebis sal, sulphur, marinas cochleas, mannā thuris, felam, nitrū, baccas lauri, æquis pōderibus, cōtusa oīa atq; cribrata, uino quoq; ueteri et oleo miscebis cū sanguine ipsius; q̄ unctione præparata, post inflationē illinis. coxas calida in qua uerbena decoctæ sunt, interposito triuo, diutissime cōfouebris, post unctionē renouabis. Si ex hac re plenā nō recepit sanitatē, uulnus uris cauterio in ipso uertibulo. Similiter scyaticis fieri consuevit. Quæcumq; autē de oxænis, caterisq; uitijis articularū, uel de ungulis priorū pedū nunc dicta sunt, scias etiā in posterioribus debere seruari.

De morbo alienato, ex quo infecta animalia moriūt. C. 23

Alienatum morbum auctores uocauerunt, quoties hæc signa procedunt: Patentes oculos animal habet, nec sentit hoīs aduentū, qbus et labra, & ipsa orificia intumescunt quasi ab aliqua bestiola cōtacta. Quē morbū alij auctores orabum nūcupauerūt. Est autē nequissima passio. Primo q pestifero transiū contagionē spargit in plurimos. Deinde q impietis decipit specie sanitatis. Nā resicta et bene curata animalia ex hac passioe subito inflata moriūtur. Alienatus autē uocatur q aialibus eripit sensus, Maleus, qd pestilētiæ internociūū contagiū facit. Plerūq; autē uiscera interius uermibus cōsumit. Quorum morfu pertuso aqualiculo aialia suffocata subito moriūtur. Sed si uelocior medicina succurrat hac ratione saluātur: de ceruice sanguinē detrahis, potionē cōponis huiusmodi: Gallici lib. unā, hyssopi librā 1. abrotani librā semis, aristologie rotundæ lib. semis, mānæ succari uncias 3. trixagnis uncias 3. Quæ omia cōiundito et cernito, ex aqua mulsa copiose decoques, et aial diebus pluris potionabis ægrotū, sed qd plerūq; huius ægritudinis pestilētia trāsit in p̄ximos, totū gregē si inciderit, ut aut singulas heminas singulis digeras p̄tionare te cōuenit. frequentissimis etiā suffumigationibus, stagnare p̄ter & curare, sicut in malleo superius constat expositum.

Quibus

ARTIS VETERINARIAE

Quibus usque adeo mutanda sunt pascua, ut si fieri potest, in alias transmittenda sint regiones. Nam qua transeunt in t^{er}ranis & in ipso anhelitu inficiuntur uniuerfa. Velocius autem curabuntur, si separata fuerint atq; translata.

De roborosis. Caput .XXIII.

Roborosa passio dicitur, quæ animal rigidum facit ad similitudinem ligni, cuius hæc sunt signa: Totum corpus astrictum, extensæ sunt nares, & aures frigide, immobilis ceruix, os constrictum, caput extensum, colligati armī uel crura, pedes etiam constricti ut nulla commissura flectatur, cuius caput si erigere uolueris, non poteris, oculi præcluduntur, spina prærigida, & ideo difficile erigit caudam, ut eam flectere & mouere non possit. dura ilia, astricti sunt renes, cubare penitus non potest. Cōtingit autem hæc passio ex nimia perfrictione uel spasmō neruorum, uel tremore, unde contacti dicti sunt. Plerumq; in hanc ualitudinem incidunt, qui cum ab igne castrati fuerint negliguntur, & inambulantes frigore leduntur. Quorum nerui recenti dolore & frigore compelluntur, & spasmus patiuntur, & obdurefcunt in robur. Ediuerso etiam altius quā expedit in pedibus ista iumentā, uel quocunq; alio loco contactis neruis patiuntur spasmus, & robur incurruunt. Ex nimia quoq; pruina, uel si in nimio frigore sudabunt, uel è calidis stabulis producātur in frigus, fieri adsolent roborosi. Sed si à posteriore parte fuerint comprehensi, ut morbus desinat in lumbos, opisthotoni fiunt, calesfactionibus tamen, unguentisq; curantur. Si quod uero robur à priori parte comprehenderit, ita ut os aperire non possit, desperanda sunt. quia constrictis dentibus, fame perire coguntur. Quæ autem ex toto corpore æqualiter periclitantur, ita ut ex aliqua parte os ualeant aperire, tam diu unctionibus calidissimis perfricanda sunt, donec sudent, coopertaq; sags copiosissime, loco calido statuuntur, ignisq; iuxta ea fieri consueuit sine fumo ut amplius sudet. Surculos quoq; laureos ualidiores in os eorum inter malas mittito, ut rodendo eos exagitent maxillas & calefiant. Fabas quoq; solidas cum baccis lauri mixtas ieiuno dabis. Aquam quoq; calidam offēres ad potandum. Ventrē ipsis cum mulsā calidā, admixto castoreo, clystere purgabis; oleum quoq; optimum cū succo ptisanæ mixtum per narem sinistram defundis. hordeū emoliturum cum furfuribus admixtum dabis ad substantiam, donec sanetur. Ali-

quantū

VEGETII LIBER III.

43

quantū dixerunt oportere eos aere candenti, in arena fluuiali uel martina colligatos obrui, ita ut caput eorum extet & nares, & tam diu deteneri donec sudet. Sed ex suprascripta cura saepe plures constat esse sanatos. Quod si ex hac re non profecerint, ures eius cervicem dextera sinistraq; decussatim, saccellationem ex furfuribus supra totum tergum calidum imponis per triduum, & hac unctione quotidie uteris in sole si caluerit, uel in calidissimo loco; Cerae libram, affronitri libram, resinae terbetinae selibra, galbani libra, castorei selibram, opopanax libram, piperis unciam, medullae ceruinæ uncias duas, olei ueteris uncias duas, & semis, uini ueteris optimi quantum opus fuerit admisceas & uteris. Praesens tamen experimento remedium est, si picem liquidam cum oleo & uino ueteri decoquis, calētiq; medicamine iumentum perungis. Ex qua unctione & auriculas cum oleo reperfuso oportet infundi, ut sanitas matura proveniat. Sed ut uenae eorū calefiant intrinsecus, & conceptum frigus exudet, necessaria potio est, quae roborosos, tetanicos, & epistotonos salubriter curat, clabi † seminis uncias 2. cimini alexandrinae uncias duas, agallici, castorei, abrotani uncias singulas, trixaginis uncias duas, mannae croci unciam unam, succari unciam, hyssopi unciam unam, piperis albi semunciam, quae omnia diligenter trita atq; cribrata redigantur in puluerem, ex quo bina cochlearia lassus & periculo se habentibus cum succo pitulae tepidae propinātur: forcioribus uero cum uini ueteris calida hemina defunditur in os, nunquā tamē sine oleo propter leniendā potio nis austeritatem, & cannalem faucium mitigandum. Alij auctores eiusmodi passionem hac dicunt ratione curandam: De temporibus sanguinem detrahes, excipiesq; diligenter, intecto nitri puluere, sale, atq; castoreo, animalia perfricari, & loco calido statui oportere, atq; hanc offerri potionem: lac caprinum, rutam, baccas lauri, piper album, oleum, et fabas solutas: hordeūq; etiam datur ut agitet edēdo maxillas, die tertio de cauda sanguinem tollunt, & renes calidis unctionibus fouent. Interdum etiam in balnea intromittunt animalia, ut diligentius conualescant. Dant etiam quotidie potiones sustes quoq; uel de salice, uel de robore in os mittunt, ne maxillarū usus indormiat. Si melius habere coeperit, post duodecim dies coopertū exercebis ut sudet. Si ista non ualuerint, uteris superius declaratis. Plurimiq; asseuerant, ficulneas frondes roborosis oportere praebere, quae naturaliter calent. Potiones

† al's dauci

N quoq;

ARTIS VETERINARIAE

quoq; per os dandā: opopanacis uncias 2. storacis uncias 3. gētianae uncias 3. mānā succari uncias 3. myrrhæ scrupulū 1. piperis lōgi scrupulos 2. cum uino utteri tepido, atq; ad cornu digerere. Hac etiā unctione ad curandū robur uel expellēdum frigus utuntur: Cera librā, resinæ terbenīnæ uncias 8. opopanacis uncias duas, medullæ ceruinæ uncias duas, storacis uncias quatuor, baccarum lauri selibram, olei pini prout opus fuerit: quæ omnia in unum adiecta in aqua decoquunt, & perfricantes inungunt.

De hydropicis. Caput .XXV.

HYdrops nō leuius animalia quā homines frequēter infestat. In talibus namq; uitijis cū digestio ciborū plena non prouenit, humor noxius perniciē corporis, tumorēq; cōsuevit inferre. Quā ualitudine hæc signa demonstrāt: Turget uenter & crura, testiculi, scapula, latera et tergus inflatur usq; eo, ut nec ī capite eius apareāt uenæ. Cui cū sublinguā tetigeris subtusiet. Hunc ambulationibus breuib; opertū grauioribus sagis donec sudet exercebis in sole, et aduersum pilos per totū corpus pos. modū cōfricabis. Cibū daturus radices cū folijs suis, quia & purgationē faciunt & uitio medentur: foenūq; cōpersum aqua nitroq; præbebis, die ac nocte maceratos lupinos in aqua, rursumq; siccatos, præbebis in cibo. Radicē quoq; cucumeris syluatici uel folia, quæ uentrē moueant, eidē dabis ut purges. Quæ curatio si tardauerit sanitatem, euocandus est humor. Quatuor itaq; digitis ab umbilico ad ueretrū uersus sagitta pungis, & periconiū ipsum pungas, sed caue ne intestina tangas, et an malia perimas, subijcis fistulā centimālē et patieris humorē currere quantū aestimaueris necessariū, quē in uase excipies. Cum fistulam absteris duo uel tria grana salis in plagā inseris, ne claudatur. Insuper & pastillos imponis. Alia uel tertia die apoforesim quasi facturus, denuo fistulā appones, humorē eijcies, donec partes totas exiccet. tunc uulnus curādū solēniter, potiōesq; catharticas po. dabis frequēter. Inter diu usq; dū sudet exercebis. Quāto fortius esse cœpit, tāto diligētius est curādū, et semper abstinendū a potu, ut tepidū et modicū ad suscitacionē bibat tantū.

De sarcostis. Caput .XXVI.

SARCOSTIS quoq; talis est pastio: Iumentū cū biberit inflatur & sufflat. hac eum ratione curabis: cineris uel lixiuij sextariū unū, seminis plātaginis unciās 5. cōteres & cum uino dabis & oleo celeriter, usq; quo resideat in

Ratio. Alij auctores asserunt ab umbilico duobus digitis cōtra pectus plagā fieri debere, & fistulā poni, & educi humorē uel aquā noxiā usq; ad sextarios tres, uel amplius si maior est tumor. Sed cautius est per paries saepe tollere, ne repētina exiccatio periculū faciat. Potionibus utēdum esse dicunt, quā urinas moueāt, frequēter etiā cōfricandū esse ut sudet, pro foeno gramen accipiet & pro hordeo ciceres infundi. Prodesse etiam dicunt si inter pigmentarios frequentissime deambulet animal: quia diuersi odores latenter pulmonibus prosunt. Potionem etiam huiusmodi dant: Petroselinum & mala grana cōtundunt, et cum uino ueteri per os digerunt. Apium quoq; quantū appetere uolueris offēres ad edendū. Asparagi syluestris radices uncias 2. cū uini ueteris sextario decoquis, ut ad tertiā redeāt, et ad heminā p os digeres. † al's apponere

De tympaniticis. Caput XXVII.

Tympaniticus quoq; hydropico similis est, sed alijs agnoscitur signis: uenter quidē eius crescit ut hydropici, & ceruix fit rigidior, sed nec testiculi, nec crura intumescūt. Cōuenit itaq; tympanitico calidū cinerem cū liquamine optimo in panno, uel linteolo umbilico uel uentri subponere, & fascijs colligare, sed à pluribus aīal tenendū est ne luctādo moueat ligaturas. Radicē panacis sit. gallicū pariter cōteres, et cū oleo uinoq; tepesctō p cornu faucibus digeres. Preterea tymū syluestre & etargū in uino decoques, et singulas heminas per tridū dabis. Tympaniticū hęc signa demonstrāt: ciborū bibēdiq; fastidiū, exiguus somnus aut nullus, si p nares mucos coeperint emitte desperandū est, si mūdās nares habuerint hac ratioe cura bis: cremorē ptisanæ et defruti binos cyathos p tridū dabis tepidos. Preterea hyssopi uncias 4. alei uiridis manū plenā, palmas numero uiginti, sceni-greci cyathos sex, aquam cisterninam & unum odoratum uetus pariter mifces, diligentissime decoques, & in potionem per triduum dabis.

Delienosis. Caput .XXVIII.

Lienosis ut manifestū est periculum, ita manifesta sunt signa. Nam oculi inuertuntur & suffusi sunt sanguine, tardius ambulant, collum habent extēsum et fit deterius et rigidius. Quæ passio principū indicat roborosi, quorū latera intumescūt, siue ceruicis media spina ad similitudinē aluci sit cōcaua, astringūtur aliquādo maxillæ, quod uicū cōsueui inferri

N 2 ex nō

ARTIS VETERINARIAE

ex nimia perfrictione, cū animalis dorsum aut frigore, aut pluuia, aut grā
dine cædiur, aut nubibus. Cuius ista curatio est: De cauda parum sangui-
nis demis. Nam si amplius tuleris infrigescet, & rigori additur rigor, admi-
sces in eum merum, & oleum, & calefacies, & statim hac dorsum & cerui-
cem perunges, saccellum quoq; ex fursure calidum impones, ut totam spinā
tenere possit & lūbos, altera die extergebis diligenter & unctione eadē per-
fricabis, supra quam similiter cum fursure calentem saccellum imponis, hoc
usus unguento: medulle ceruinæ libram unam, manne thuris uncias qua-
tuor, depli uncias tres, castorei uncias tres, opopanax uncias tres, resinæ
frixæ uncias 3. apoximæ uncias 3. resinæ terben tinæ uncias 2. ceræ librā
semis, olei laurini uncias 8. (sapi caprini libram) olei glaucini sextariū 1. ex
(olei cyprini) his sicca quæ fuerint tundis & cribras, cætera super carbones soluis, quibus
cretā admisces, & leuiter decoquis in uase nouo, uncturus cū necessitas po-
stulauerit, reponis ac seruas. Hac quoq; potione intrinsecus curabis: absyn-
tij unciam 1. aristologie uncias 3. beconicæ uncias 2. petrosilini uncia 1. et se-
mis, trixaginis uncia 1. thuris masculi uncias 3. castorei uncias 2. manne suc-
cari uncias 2. contundis piter et cernis, et ex aqua mulsā et oleo diffunde p
fauces, absq; dubitatione curabis. Alij auctores asserūt sanguinē de brachio-
lis auferendū, et aīal abstinentū ab hordeo, oleū, nitrū, marrubīū, sanguinē
de brachiolis æquis ponderibus tritū cum absynthio pontico & uino auste-
ro per os dandū, & cum biberit deābulet, & spongijs calidis foueatur, &
pressa manu diutius perfricetur. Si uentris permanserit tumor, pectus cau-
terijs inurendum est. Post quinque dies ternos digitos subijcis hac atq; illac
inurendum est iterum, obseruabis autem ne uenas forte comburas.

De implecticis. Caput .xxxix.

Implecticus autem quia similem sustinet passionem, perfricandus est unctione
superius memorata, & si necessitas postulauerit inurendus.

De phragmatico. Caput .xxx.

Si phragmaticum erit iumentū, his agnoscitur signis: febricitabit, oculos
introrsum reducet, aures tensas habebit & rigidas, terram pedibus
tundet, quod hac ratione curabis: Sanguinem detrahas de matrice,
adiunctoq; oleo & uino tepescies, totumq; iumentum contra pilos diligen-
tissime confricabis, loco tepido statues, & curasti.

De eo qui aquam timet. Caput .XXXI.

Aliquando iumenta aquas timent, quæ dicuntur, hydrophoba. Signa huius hæc sunt: uenas omnes habebit extensas, sudabit suffusus oculis, tremorem frendorem que patietur, illidet se parietibus; ex qua passione conuertere consuevit in rabiem. Cui hac ratione succurris: Sanguinem ei de femoribus detrahes, à cibarijs abstinebis, in loco sic clauso ut lumen uidere non possit constitues, magno silentio aquam in situla uel alueo ita apponis ut non audiat sonitum, manipulum rutæ deterito, et baccas lauri xv. olei rosati librā, aceti uncia 1. commisceto, caput et nares diligentissime perunges, et sanabitur.

De Spasmo. Caput .XXXII.

Spasmus certum est animalia sustinere. quæ necessitas his declaratur indicij: Subito concident, et articuli eorum extensi sunt, et toto corpore palpitant, aliquando etiam de ore spumam emittunt. Quibus escam dabis pusca nitroque, conuersam, cucumeris quoque, syluatici puluerem, et nitrum tritum per septem dies in potione dabis ut purget. Sanguinis quoque, marinæ te fluidinis dimidiam cotylam, aceti tantundem, laseris aliquantulum pariter mifces, et suffundis in nares. Vtile dicitur terga eorum oleo et aceto et nitro frequentissime confricari.

De Epilepsia. Caput .XXXIII.

Quadam ratione lunari animalia sicut homines frequenter corrumpunt, et intermoriuntur. Quorum ista sunt signa: iacentia contremiscunt, saliuæ per os defluunt, desperata pro morituris (frequenter) consurgunt, et pabula appetunt. Cartilaginem naribus eorum digito tentabis, quanto frigidior inuenieris, tanto plus casurum scias. Si minus frigida fuerit, rarius cadet. Cuius ista curatio est: De ceruice eius copiosum sanguinem tolles, post quintum diem de temporibus, loco calido tenebrosoque, constitues, totum corpus theriomaticis confricabis unguentis, cerebrum quoque eius et auriculas pice liquida cum oleo laurino admixto largius perunges, et mittes intrinsecus, caput etiam aluo et cerebellari communes, potione autem cathartica dabis eiusmodi: Radicis uncias 2. panacis radicis uncia 1. diagridij uncia 1. cum cucumeris syluestris uncia. quæ omnia bene trita commifces, cum mellis sextario decoques,

N 3

ex quo

ARTIS VETERINARIAE

ex quo cochleare plenum in aqua calida sextariū, et olei drachmas 3, mittis
 et per os defundis. Caput quoq; eius sepius curabis. Radicē dianariā, id est
 herbae artemisiae, in puluerē rediges, et p fistulā naribus insufflabis. Radicem
 quoq; laseris tunsum si naribus defuderis, eadē ratione proderit. Si aut passio
 perdurauerit, caput eius ures, ut apioso fieri consuevit.

De eo quiaquam reuomit. Caput .XXXIII.

Animalia sepe aquam reuoment quam biberant. Quae passio ē nimia
 perfrictione descendit, cū stomachus paralyticus ex frigore sustinuit.
 Sed hac ratione curantur. Sanguis de ceruice detrahatur, poriones
 theriomaticae propinantur, unctionibus calidissimis arui pectusq; confrican-
 tur, purgatur p nares caput, et si necessitas postulauerit, etiam sinapizantur.

De Sideratitio. Caput .XXXV.

Sideratitia iumenta dicuntur, cum uenas uacuas percusserit frigus, aut
 aestus, aut impleuerit cruditas, aut ieiuna bulimū fecerit. Redditur enim
 stupidum animal, et titubans ambulat. Quod mollibus cibarijs, leni-
 busq; potionibus curari oportebit, ita, laseris uncia 1, et heminā mulse, suc-
 cumq; ptisanæ miscebis. Et si ex frigore causa est, cum uino et oleo tepido da-
 bis. Si ex aestu, cum rosato praebebis. Si ex cruditate, abstinebis a cibo. Si de
 bulimo, ciceres offeres largiores.

De percussio à sole. Caput .XXXVI.

Sol quoq; canicularis ardentior, animalia pcutit in cerebro, quibus de
 temporibus sanguis emittitur, et similiratione curantur. His aut ostē-
 ditur signis, quia deiectum caput portare coguntur.

De Cruditate. Caput .XXXVII.

Cruditas iumentis generat aegritudinem, quae hac ratione dinoscitur:
 modo in unā partē, modo in aliā ambulantes inclinant. Quorū ista est
 medicina: Sanguis eis de ceruice detrahatur, a potu et cibarijs abstine-
 alis (cōpellēte) tur. Si aestas est, refrigeratorias accipiant poriones, nō parū natura cōpellitur.

De Bulimo. Caput .XXXVIII.

Bulimum animalia sustinent frequenter ex fame, frequenter ex lassitu-
 dine

dine. Cuius ista sunt signa: Anterius fugiunt, incertius effusus, tremebit. Quae hac ratione curata sunt, in primo omnium defricetur ex uino oleoque tepesfacto, cum et mudis mollem partem uino infundis, et cum eodem confricabis. Si ilon fecerit, per cornu digeres et reparabitur. Quod si permanserit bulimus, simile heminas cum sextario uini infundes, et per cornu digeres. Quod iter et a gerit incidit bulimus, ubi necessaria de iunt, terram faucibus infundes, aut offas facies, et per os digeres.

De Anhelitu. Caput .XXXIX.

Quod si ex anhelitu inflationes contigerint, cuius causae rationes reddi non possunt, puscam calidam cum spongia cerebro eius apponis et pectori, in aures eius oleum laurinum mittes, frigidissimo loco eum constitues, nares quoque titillabis ut frequentius sternutet, quo facto, statim exhilaratur.

De aestu. Caput .XL.

Si aestuauerit animal et defectionem patietur, brassicae folia cum apio conuundes, et cum uini sextario permiscebis, et per narē sinistram infundis. Si uero fortius aestuauerit, petrosilini, daucij, (silis) gallici, abrotani, spiraeae, nardi, sinoantis, aequis ponderibus tunditur, et cum aqua mulsā data, aestum releuant. Quod si his ita membra defecerint ut cōcidant, quibusdā placet abstineri eos a potu, et sitiētes in aqua frigida una hora stare, et continuo repari. Alij dixerūt hordeaceā farinā cum uino per cornu faucibus infundi. Plerique expti sunt triticeā farinā cum aqua frigida datā continuo profuisse. Vel cerie tria oua cruda cum pulegio et pusca, oleoque permixto, faucibus infundunt.

De Paralytico. Caput .XLI.

Paralytici ad similitudinem hominum iumenta patiuntur, quae his ostenditur signis: Ambulabit (pronus) in latere ad similitudinem cancri, ceruicē incuruabit ut solent habere quibus fractae sunt, rectos pedes non ponet (sic aegri parietibus se illidunt) cibum et potum non recusant. Hordeū aut ipsius uulū semper apparet. Hac ratione curabitur: Sanguis ei de temporibus parte contraria non qua contractus est tollitur, unctionibus theriacis perficitur, ceruicesque eius constringuntur usque eo, ut cretellis ex lignis impositis constricta ceruice prauitas dirigatur. Loco autem calido stabulatur sicut roborosus.

Cuiusque

ARTIS VETERINARIAE

cui ipsae potiones dantur. Si parum in totum ista medelari adiumenta profecerint, ceruices eorum uruntur, non qua contractus est, sed ex parte contraria de cauterio accipit palmas ab armo usque ad ceruicem, auricule et in tempore uruntur ad mensuram semissis. In alia autem parte temporis quasi stellam paruum cauterio facies, et in parte renum usque ad mediam spinam uirgulas dabis solemmniter, et curasti.

De intrinsecus rupto. Caput. XLII.

Iumenta nimio saltu, uel cursu aut ruina, cum aliquid superint, uulsant, quorum ista sunt signa: Stranguriam patientur, excreabunt etiam purulentum, et quoties uolutata fuerint non reuoluuntur, nec se excutunt. Si recens ruptura fuerit, sanguinem magis excreabit quam pus. Quae curantur glutinosi et leuibus cibus. Talem etiam accipiunt frequentissime potionem: Thuris masculi unciam .i. opij unciam .i. heliotropij unciam, quod intybum agrestem uocamus, rutae unciam .i. quae omnia diligenter trita cum uino austero quatuor mensuras adicies, et per dies singulos dabis ad cornu, donec quae intus rupta sunt glutinentur.

De Infania. Caput. XLIII.

Sed animal nonnunquam inuadit infania, ut praeseptum frangat, seseque morfu laceret, impetus etiam in homines faciat, auribus micat, oculis attentis et splendidis, et ex ore egerit spumam, quem caute ne medentem ledat, diligenterque costringito. Sanguinem ei de ceruice et de cruribus trahito, rursumque in tenebris contineto, donec appetat cibum. Cum coeperit ad patientiam reuocari, succum cicutae uno acetabulo, et aquae unae hemina admisces, et per os defundis. Post rutam conterito, et supra cerebrum ponito, caputque lanata pelle constringito et curato, et cum profecerit calide stabuletur. Talis quoque potio equis subuenit rabiosis: baccas lauri nouem, et alei purgati grana uiginti et unum, diligenter conteres, et cum uino ueteri candido per nares sinistram inicies.

De Pletura ex hordeo. Cap. XLIII.

Si animalia dum sudant hordeum comederint, uel ipsum hordeum nouum fuerit, quia uehementius calet, uel copiosius quam oportet ociosa pascuntur, absque dubio indigestio et pletura comitabitur. Quae passio his agnoscitur

Scitur signis: Sudabit, ligati erunt armi, ambulabit incertum: Sanguinem ei de ceruice detrahes, aceto oleoq; permixtis totum corpus diligentissime cōfricabis, leuibus ambulationibus exercendum est, & ab hordeo penitus abstinendum. Cui eiusmodi subuenit potio: brassicæ folia cōundis, succamq; exprimis, & myrrhæ puluerem, & parum liquaminis, & uinum uetus optimum misces, quod per triduum per os defundes, ita digestio & sanitas consequetur. Aliquantum præcantatione tentant afferre remedia, quæ uanitas ab aniculis solis diligenda est: cum animalia sicut homines non inanibus uerbis, sed certa medendi arte curentur.

Depassione pulmonis. Caput .XLV.

Pulmone ut integri præstant substantiam uitæ, ita uitiati periculum afferunt mortis, quorum dolor manifestis declaratur indicijs: stertet, tussiet grauiter, et excreabit purulentum. Si ægritudo longior fuerit, de prioribus claudicat pedibus, grauem foetorem naribus expellit, difficile se collocat, sed febriens præsepio incumbit, corruptum assellabit. Aliquando in corpore ipsius similia furunculis tubercula nascuntur. Quorum ægritudo difficilis est, sed hac potione curanda: thuris masculi uncias tres, hyssopi uncias 2, folij unciam 1, mannae croci unciam 1, murræ uncias 2, diligenter tundis et cribras, ex quo puluere unum cochlear cum tribus ouis & aqua temperabis et diffundis per os. Si cibum non appetat, pro aqua lac caprinum miscebis, & addito mellis cochleario propinabis. Succum quoq; ptisanæ cum oleo rosatio, & puluerem superius comprehensum cum ouis per os dabis ad cornu. Offas quoq; ex duobus sextarijs farinæ triticæ, & uno sextario erui pollinis facies, quibus admiscebis ex superscripto puluere quinq; cochlearia. Sed septenas offulas diebus singulis digeras, quas quotidie ad substantiam dabis, donec cibos tentet appetere. Cui omnem escam propter fastidium uiderem oportet offerri, et contrario, lenticulam cum tritico uel hordeo torrefacto, cum palea dabis, ut quicquid ex diuersitate ciborum uoluerit eligat. Lac tamen recens cotidie ei conuenit dare. Deambulet plurimum, ubi coeperit conualescere ad exercitium reuocandum est. Lac si defuerit, aquam in qua eruum prius lotum die ac nocte permanserit dabis in potu. In causa pulmonum de ceruice uel de palato his sanguis aufertur, quibus (nec) fastidium euenit, sed fortiora sunt corpora. Cineres quoq; ulmi loti & infusi aqua cum uino ueteri optimo

○ odorato

ARTIS VETERINARIAE

odorato heminis singulas misces et dabis. Quod si uehementius uexatū a
gritudine, trāsiuit in morbū: Radicis lētisci drachmā, thuris uncias 2. murræ
drachmā, succari semiunciam, cōtere diligēter, et cū uino suffunde. Sūt et ista
remidia: Vua alba in os equi frequēter exprimatur, semen radice datur in ui
no, amygdalæ frixæ cū aqua offeruntur. Sed est alia efficacior potio: Carda
momi uncias 2. cassiæ unciam, storacis unciam 1. quæ omnia si ualidior et sine se
bre erit cum uino, si febris cum succo pisanæ per os dabis.

De orthopnoico. i. plagio rigido. Cap. .XLVI.

Ortholisticum iumentū his agnoscitur signis: etiamsi trahatur am
bulare detrectat, anhelat grauius, frequēter suspirat, rūchos ducit,
ilia suspendit, dū manducat tussit. Ex quo uitio difficile liberabitur,
licet in longū protrahat uitā. Pulmo enim eorū contrahēdo se cōburit, unde
et macies cū morte insequi consuevit. In recenti tamen hanc curā festināter
adhibebis: Sanguinē de pectore detrahes, et mero oleoq; pmixtū atq; cale
factū punges. Lixiuū quoq; cineris diligētissime cretū, cum oleo optimo tem
perabis, et per nares diebus quinque cōtinuis eidē digeres. Potionē quoq; da
bis postmodū: Sinapis alexandrinæ frixi, et sulphuris uiui, et murræ carda
alis (attico) momi species, æquis ponderibus contundis et cernis, et cū melle (optimo) de
coquis. Ex quo medicamēto ad magnitudinem nucis cū uino nigro calido di
lues, et quotidie per os potionabis. Alij uero myrrhæ uncias 2. sulphuris un
ciam 1. nitri semiunciam, picis liq̄dæ pusillū deterūt, additoq; melle et uino uetere
odorato, candido, p̄ nares sæpius infundūt. Curabis autē ne algeat, tempabis
exercitatiōibus ut sudet: et nō solū in potiōe, sed etiā in fœno nitrū cū melli
crato aspersum semp accipiat.

De Epistotono. Caput .XLVII.

Epistotoni quoq; similis passio declaratur. Orthotonicus qui totus est ri
gidus, Epistotonus cui in posterioribus partibus morbus insederit. Cu
ius ista sunt signa: Aures (rigidas) habebit, collū extēsum, oculos mino
res, tensa pellis in facie, labia grauiā, ut oscitare et apire uix possit, cibū po
tūq; fastidiet, cauda rigida, gressus incertus, mēbra distēsa, difficile progredi
tur, et frequēter in posteriore pte cōcidit, unde Epistotonus noīatur. Qd genus
passionis hyeme curare difficile est, et state aut si diligentior fueris obtinebis.

Que

Quæ passio p[er] æstatē his nascitur causis, si iumentū ardētissio fuerit sole percussū, uel si in itinere priore claudicās pede, coactū fuerit ambulare uel currere, & uehementius sudauerit, et ex sudore uel armū laeserit, uel supra ipsum iacuerit ut armus indormiat. Hyeme autē cū de itinere uel de exercitatione uenerit, et cū sudore steterit sub diuo in frigore, aut in loco (recenti) uel humecto aut marmorato, aut tessellato, uel si frigore maxillæ obdormierint, tūc ista ægritudo cōtrahitur. Cui hac ratione tentabis succurrere: Adipis porcinae ueteris lib. 2. r[esin]æ terbeninae selib. piperis triti drachmā, ceræ librā, olei ueteris sextarios 2. p[er] decoques, et calidissime totū aīal perūges. Multi cruum decoquūt, calentēq; aquā capiti ipsius languētis imponūt. Alij in stercore ipsorum calido obruūt egrotātes, ut lāguorexudet. Plēriq; colligatis iumentis cōmodū credūt renes sole feruenti bene cooperiri. Hæc quoq; potio traditur salutaris: Piperis triti grana xx. cedri pōdus denarij, nitri uncia 1. mixtura laeseris tyrrhenici globulū ad magnitudinē fabæ, trita atq; permixta, addita liquaminis floris hemina, & uini ueteris summi sextariū bis in die per os digeretur. Exptū dicitur, sanguinē bubulinū calidū et fumantē, sed moderate p[er] cornu faucibus infundis. Quod si forte defuerit, thuris cribrati & salis triti ternas uncias cū uino optimo prodesse dixerūt. Calidis medicamentis aīal expedit dum sanetur perungi. Adipis quoq; porcinae recentis coctæ quantū existimaueris cum oleo optimo & uino summo & melle commisces, & ad carbonem semper decoques, ac per nares infundes. Malagma quoq; de calidis speciebus in carbonibus cum oleo cyprino uel communi, sed ueteri, abluatur, & perungitur. Post curam operitur sagis, & in sole calido exercetur a sessore, & repedens dum sudet. Post sabanis ualidioribus abstergetur, & denuo unctum operitur, pice quoq; liquida admixto oleo perungendum, nō tamen nimia pix sit, ne corium laedat. Nōnulliā ualidioribus de ceruice sanguinē detrahūt. Plēriq; in balneū ducunt, calidissimis potionibus curāt, id est, lasare & cymino, aniso, oleo, baccis lauri, ex quibus quotidie aliquid cū uino ministrant. Vnctionibus quoq; istis utuntur: Ceræ lib. resinæ uncias 4. opopanaecis unc. 2. medullæ ceruinæ uncias 3. olei storacini uncias 3. olei laurini unc. 4. quæ oīa decoquūt, et in sole aut in loco calido perungūt. Alia quoq; unguēti compositio talis est: Baccarū lauri sextariū 1. cymini sextarios 2. sulphuris uiui unc. 3. resinæ unc. 1. galbani unc. 3. olei sextar. 2. q̄ oīa decoques et ueteris.

ARTIS VETERINARIAE

Delethargico. Caput .XLVIII.

Lethargici quoq; iumentis ista sunt signa: Iacebit semper & dormiet, neq; cibum appetit neq; potum, cum excitatum fuerit continuo aggrauatur, & se proijcit, & macescit, & quancunq; ei dederis potionem tanquam dormiens uix suscipit: quem hac ratione curabis: Substernito instabulo ubi stat, ut bibat ibi, cui caput fomentabis ex calida pulegio decocta, postmodū perūges oleo cum adarte trito, ita ut caput eius et aures infundas, ea usurus potione: camomillam illyricam, (idem nos trace) & herbam artemisiam in aqua decoquis, ex qua quotidie ei binas cotylas propinabis. Cui & pedes priores frequenter fomentabis calida. Solet enim hæc passio adstrictius ad rectum pedem contingere. Est quidem periculosa passio atq; curatio: cuius ista sunt signa: Oculi eius lachrymabunt quasi lippiant, in præsepio dormitās incumbit, à posterioribus ambulans nutat, & totum grauuatur. Cui sanguinem detrahes de pede priori dextro, & de femore sinistro, ex quo eum perunges. Herbam artemisiam contundes, & cribratam dabis cum lixiui sextario, & olei cyathis duobus, per triduum. quarta die intermitteres. Quod si cibaria non appetit, (bolū ex melle) & aqua tepida comedat, & aquam bibat. Si minus profecerit, lini semen cum aqua in olla decoques, & heminas singulas per dies singulos dabis ad cornu, addito melle quātum sufficiat. Quæ potio etiā febricitantibus prodest. Lethargicū animal frequenti exercitatione prohibendum constat à somno. Assidua quoq; iniungenda est deambulatio si anteriores pedes eius miseris in fomentum. Nam suffures sale et aceto permisces, & calentes ungulis imponis. farinam quoq; triticeam cum tritis salibus & pusca sextario uno, faucibus infundes, herbam artemisiam tunsam cum oleo & modico lixiuio dabis ad cornu, abstinebis ab hordeo, fabæ solidæ sextarium porrigis ut uigilet, donec duriores edomet cibos. De ceruice sanguinem ei detrahes. Depletum hac ratione curabis: A frontis uncias tres, gallæ syriaticæ uncias duas, spicæ nardi uncias 2. radicis capparis uncias duas, tunsæ & cribratæ permisces, et terna cochlearia in sextario aquæ tepidæ dabis in potu. Nunquam frigidam nec nimium calidam, sed tepidam ad bibendum semper accipiat. Assidue flagello excitandum aut uoce, ut uitium timore deponat.

als(ceruū melli
tum)

De morbo

VEGETII LIBER III.

Demorbo Regio. Caput .XLIX.

SI quod iumentum morbum regium habuerit, his agnoscitur signis: uirique oculi uirides sunt, & ceruicem inclinatam habebit, dextra parte & pede dextro (etiā sinistro) uidebitur claudicare. Cuius curatio est ista: loco tenebroso, ubi lumen uidere non possit, clauditur, et operitur sagitta ita, ne oculi eius aperiātur in die, oleo et uino tepido ungetur atque fricabitur, lapides molares non minus pondera quinq; in igne imponuntur, animalis caput copulatur ad pedes, cum bene cāduerint, sub eius naribus apponuntur, persusi oleo suffumigatur os, nares, & oculi, ut morbi uirus exudet. Quod per septem dies cōtinue est faciendum. Tali etiam ratione succurrimus: sanguine caprimo et lacte ouillo, anagallico, costo, oleoque pariter admixto portio conficitur, quæ per dies duodecim datur.

De bili, idest, coleribus. Caput .L.

Sed interdum biles, quæ colere appellantur uulgo, solent iumenta uexare. Quæ passio his declaratur indicij: cōmouetur ac uolutatur ut strophosus. Sanguine de ceruice emittis: Daturus eiusmodi continuo portio nem: herbe trix agnis nigre uncia semis, manne succari uncia unam, nitri uncias duas, alii ei uncias 2. uini optimi sextarium unum, conteres, ex aqua mulsa heminam unam per sinistram narem infundes.

De bili arida. Caput .LI.

Quod si aridam bilem habuerit, myrtum agrestem cum uino contritam per narem dextram deffundis, pro hordeo far triticeū dabis. Potionem ipsam temperabis ex aqua.

Decoli passione. Caput .LII.

Coli passio grauissimos cruciatus iumentis cōsueuit inferre, ita ut cardiaci aut strophosi esse credātur, sed his agnoscitur signis: Cū stat repente cōcidit ut arreptū putes, si satis suffensum fuerit dolor subsequitur, & iacet nonnunquā: cum frigida aqua acceperit tremit, sudat, anhelat. Cui hac ratione succurritur. Anisi pontici uncia 1. petrosilini uncia 1. feniculi seminis unciam, piperis nigri uncias 2. marrubij uncia 1. abrotani unciam 1. anethi uncias 3. libistici 2. 4. centauree minoris et maioris uncias 2. (cametris semiunciam) eupatoris 2. 4. gingiberis uncia semis, pulegij semiunciam

ARTIS VETERINARIAE

ciā, rutæ unciā, apij unciā semis, pariter cōiūdes et cernes. tūc mellis optimi pōdera duo cocta et despumata cū oībus mīscēs, ex quo medicamento ad magnitudinē nucis auellanae cū aquæ tepida sextario dilues, et per os infundes, *als(piperis)* certissima medicina est. Qd si dolor pseuerauerit, feniculi seminis cochlearia v. bene trita cū uino syncero sed cibario sextariū dabis. Præterea (panis) aliquantulū et pellicula de uentre pulli siccata in furno et trita cū uino dabis.

Deuomica. Caput .LIII.

Vomica plerūq; animalibus nascitur intrinsecus. Cuius passionis signa sunt ista: cū accubuerit difficile surgit, os ei grauitèr olebit, in cubet in eo loco à quo uexabitur, tussiet, et purulētū excreabit interdū. thuris uncias 2. aristologie uncias 2. in uno cū uino tepēfacto per nares digerēs. Item sulphuris uiui uncias 2. aristologie unciā semis similiter dabis, cibo autē maxime sustētandū est ut habeat corporis nutrimentū, et cū rupit uomicam cauterijs circa pectus aduris, ut facilius prouocatus humor emanet.

Decoriagine. Caput LIIII.

Passio quā græci ecedermiā uocant, latini coriaginē appellant. Cuius ista sunt signa; macescit, et sine febre nō erit, coriū illius adhærebit costis, spina sit durior, in dorso eius nōnunq; furunculi exire cōsueuerūt, magis etiā quā adsueuerat appetit cibos. Cuius ista curatio est; thymū & sales cum uino rubro cōteris, & tubera, si qua in eo sunt, cōfricas. Parabis etiā aliā unctionē: picē, cerā, resinā cabialē, & thuris pollinē ex oleo ueteri temperabis ac decoques, totū animal cōfricando diutissime perūges. Sed parum est unctione corio mederi, nisi potionibus & intrinseca curentur; piperis albi triginta grana, myrrhæ semiunciā, uini odorati ueteris cotylā, olei uiridis cyathū unū admiscebis & per os digerēs. Itē fasciculos rutæ uiridis atq; purgatæ opopanacis & cotylā uini & olei uiridis cyathum admīscēs et dabis in potu. Quod uitium ex perfrictionis iniuria, aut ex coactione alicuius necessitatis descendit. Aliquanti suis nō uetula sed nouella sanguinē uino permixto ad cornu faucibus digerunt, ignorantes si plus sanguinis fuerit cōtinuo animal interire. Cautius est hac magis potione curare: cepas germanas et semen rutæ pariter admīscēs, & deteris, ex quo uncias tres, cum uini cotyla per dies singulos dabis, usurus curationibus quæ conueniunt roborosis.

De stomacho

Destomachico. Caput LV.

Syntaxin animalia patiuntur & homines: quæ ualitudo his declaratur indicijis: cotidie tenuantur, et macie ossa eminet, multum manducata esuriunt semper, quicquid inuenerit tentat fame cogere corrodere, durum sterces emittunt, trahunt longam ac miserabile uitam, ut nec surgere ualeant. Sed iacētia fatigata, multumque manducata fame moriuntur. Omnis enim esca quam sumptulerint ad sterces, & omnis potus conuertitur in urinam, nullus ex his succus, nullum alimentum peruenit ad medullas. Propterea quod stomachus eorum nimio rigore perstrictus, nec coquere poterit, nec epati aliquid propinare, in quo tota uirtus ad nutriendum corpus per dispensationem ciborum sanguis preparatur. Tabescit semper, iecurque eius minuitur ad similitudinem arboris, quæ radicibus ex maiori parte præcis, cum à paruulis aliquandiu sustentata portauerit frondes, celeriter exarescit. Quorum manifesta periculo hac ratione tentatur occurrere. Inter principia facies unctionem, ceræ libras duas, resinæ terbeninæ libram, medullæ ceruinæ libram, axungie ueteris sine sale libram, propulegij selibram, irisillyricæ libram, samfuci libram, olei lauri quantum satis fuerit, decoques carbonibus lentis, & ad ceroti molliciem perlocabis, cui adhuc tepenti mices puluerem irisillyricæ & cretæ cimoleæ, donec infrigescat agitabis. Ex quo medicamento totum iumentum perunges, & multorum manibus confricabis, donec calefiat & sudet. Quod interposito triduo conuenit fieri, ita ut coopertum animal sit, & condie paulatim exerceatur, ut digerat. Cui hæc preparabitur potio: abrotani uncias 4. santoni ci uncias 4. trixaginis uncias 4. campepitos uncias 4. gentianæ uncias duas, murrhæ uncias 2. opopanacis uncias 2. eiusdem radicis, succari semiunciam, rutæ aliquatulum, omnia bene tundis & cribras, ex quibus duo cochlearia in uino ueteri decocta cum succo ptisanæ in qua (atro) decoctum est, admiscebis, adiunges etiā erui pollinis cochlearia duo, quæ cum per nouem dies continuos dederis, intermittis aliquandiu ut uires colligat, et resumat, et per singulos (periodos) alia hebdomadas alternis curabis. Nec cessabis donec sanitas redeat. Diebus autem uacuis offas ex farina triticea in lacte conspersa ad substantiam digeris, furfures quoque triticeos & paleas dabis, hordeum non dederis nisi fortassis infusum, denegabis etiam herbam uiridem donec reparare coeperit corpus.

De icterico

ARTIS VETERINARIAE

De Ictérico. Caput .LVI.

Icterici ista sunt signa: Oculi uirides, de quibus profluet lippitudo, ad similitudinem fabae indurescit corium, fit horridum pilis, insequitur fatigatio, ambulans genibus claudicabit. His sanabitur medelis: Panacis syriatici et apij seminis singulas libras contundito atq; cribrato, et cum mellis attici libra misceto, tunc aquae, in qua lupini crudi fuerint decocti, sextario, ex medicamento superius descripto, quatuor cochlearia miscebis, et in potione dabis per dies v. Si tardius adiuuat, uini sextarios 3. in pultario nouo, canini stercoreis albi uncias tres admisceto, et ponito sub diuo, ex qua potione quinque diebus per os digeres. Præterea aquam in qua ciceres decocti fuerint, et stercoreus caninum simili ratione præbebis.

De Stropho. Caput .LVII.

Strophus diuersæ causæ, et diuersæ sunt curæ. cuius ista sunt signa: Volutatur, patitur torsiones, ilia sibi respicit, stercus durum assellat, terram pedibus tundit dolore cogente, intermissis horis refrigeratione sentit et requiem. Hac potione curandū est: acori, anisi, opopanacis singulas libras pariter contundis et cernis, ex quo puluere duo cochlearia in uini ueteris sextario et olei pondo semis admisces, et tepidum per os dabis triduo. Si strophosus fuerit et non facit uentrem, caudā inter coxas suas mittet, et ad uentrem suum conuersus attendet. cui puluerem de semine rutæ syluaticæ cū uino per os dabis. Præterea cepas decem ueteres, ficus sicca 8. nitri scrupulos 5. stercoris colubini scrupulos 4. ex quibus addita urina collyria facies, et bina uel terna in anum immittes. Si uero fortius uenter induruit, conuenit adhibere clysterium, sed prius uentrem aqua calida persoueabis. Tunc succum (cantabricum) in quo fuerint bletæ maluæq; decoctæ, cum nitro et hermina olei, et columbini stercoris quatuor scrupulis, prorum constitues, et per anum inijcies iumento, ita ut post clysterem inambulet aliquantulū. Alij fimum leporis cum nouem cochlearibus mellis, et quindecim granis piperis addito caulium succo per os salubriter defundunt.

De dolore iecoris. Caput .LVIII.

Iecoris dolor solet infestare iumenta, cuius ista deprehenduntur indicia: Cibi fastidium, potus appetentia, uentris inflatio, macies. Cui primo cremorem ptia-

VEGETII LIBER II.

ris ptisanæ sextariū 1. cū olei rosatiij tribus cyathis per os digeres. Si passio permanet, alia potione curabitur. Apij seminis uncias 3. hyssopi uncias tres, abrotani uncia 1. olei uiridis quantum sufficit, uel succi paulominus. Si uiridē abnegat tempus, ex uino optimo ad tertias decoques, per aliquot dies potionē dabis. Similis quoq; huius passionis est ratio. Sine febre enim animal nō erit, nec facile cibū conficiet, testiculus dexter tumebit et indurescet, cui ista subuenit medicina: fœnigræci cyathos quatuor mittis in aquæ fontanæ sextarios quatuor (.i. grana triginta) & decoques ad terciā partē. hemina per os data potione curabis. Nōnulli turis drachmas 2. tritas, cum uino quantum sufficit miscent, & inde totum corpus multorum perfricatur manibus, saccis cooperiunt ut sudet.

De inflatione uentris. Caput .LIX.

Inflatio uentris interdū iumenta (sine dolore) conturbat. Cuius passionis ista sunt signa: testes eorū sudabunt, alternis pedibus terrā tundunt, subito inde alterna parte se cōuertūt, caput ad ilia sua ponūt tanquā qui locū doloris ostendāt, gemitus interdū & tremor totius corporis insequitur. Hunc paulatim deambulare facies, manum unctam in anum mittes, & stercus extrahes. deinde sale & melle mistis in anum infundes, ut assellandi augeat uoluntatem. Si hyems fuerit, oleo & pice liquida lumbos & auriculas illius saturabis, hanc daturus potionem: Laurum uiridem uel baccas ipsius, piper & cuminum, petrosilini & feniculi semen, semen agrij & nitri, quæ pariter admixta, tusa & cribrata cum uino, & oleo tepido, & calidæ aquæ paruula portione potionabis, & deambulare compellis moderate, donec dolor cesset.

De intestini uexatione. Caput .LX.

Intestini quoq; uexatio, quod colon uocatur, & inflationes et dolores cōsuevit inferre. Quæ his agnoscitur signis. Cum ambulare cœperit, prioribus pedibus transuariat & dolores subglutit, & crebras deambulationes & calores stabuli, si diligenter etiam operiatur diligere consuevit. Cui per nares suffundes laser & cyriacum in uino tepido solutum.

De tussi. Caput .LXI.

Frequenter omni genere deforme uitium, eo q; maxime aīali ū parti accidit, tussis est

ARTIS VETERINARIAE

dit, tuſſis eſt, quæ interdum ſponte deſinit, interdum medicamentorum rōne curatur, interdū inſanabilis penitus inuenitur. Difficultas aut̃ curationis emergit, quia cauſe ex quibus tuſſis euenerit, à medētibz nec diſcernūtur, nec intelliguntur interdum. Quam paſſionē uniuerſis authoribus euolutis, quanto crebrius accidit, tanto ſtudioſius credimus exponendam.

De tuſſi quæ uenit ſi quid faucibus hæſerit. Ca. LXII.

EXaſperatio, aut iniuria faucium grauiſſimam commouet tuſſim, quoties aut puluis, aut ariſta, aut os, aut ſurculus, aut lapillus, aut aliquid inhæſerit gutturi. Quæ res adeo periculosa eſt, ut niſi celeriter ſubueniatur, aīalibus per impatiētiā doloris inſaniā generet. In ſole igitur diligēter inſpicio, ſi quid hæſerit euellito. Ex tepida etiā, addito niri puluere, inſuſa ſpongia tergo. Deinde oleo roſatio tepido cū lana obturato locū qui indignationem ſuſtinet. Poſt diē teritiū lanam eiſcies, eadē ex aqua calida ſoue bis & tale medicamentum imponis: ſuccari 3 4. aluminis colati 1. ex tepido uino inſundis, & ſic exaſperata ſanabis.

De tuſſi ex perfrictione. Caput .LXIII.

EX perfrictione quoq; naſcitur tuſſis. Cuius iſta ſunt ſigna: cum tuſſierit, caput deorſum mittit uſq; ad terram, & cū biberit, aqua ei per nares currit. Quam hac ratione curabis: Machinam ori inſeres, manū planam iniſcies, cōperies in parte ſuperiore quaſi ueſiculā, quam unguibus rumpis. Deinde tres pillulas bene cōcuſa axungia molliſſimas ſacies, quos in ſubtiliſſimo lomento, hoc eſt, farina ſabacea, conuolues, & per os digeres. al's (una auina uel brutillo) Deinde per tridū (uenaculo) & ſale perfricabis, & paſtillos cum ſpeciebus calidis & uino in potionibus dabis.

De tuſſi à colibus. Caput .LXIIII.

Tuſſis à colibus ſi fuerit, his ſignis agnoſcitur: coles iniuriæ pleni ſunt ac tūnebunt, dum bibunt continuo ruminant. Ouum in aceto acerrimo mutis, reſolutaq; teſta, ita ut integra membrana permaneat, pice liquida perunges, & faucibus digeres. Poſt alumen, axungiam, ſalem in uino cōteres, offas ſacies, & ex melle deiſcies, ita ut aqua calida, & ſi facultas ſuppet, cum euſco decocta aſidue ſomentare non deſinas. Hanc quoq; potionē adijcies

五

136

178

pi=

ARTIS VETERINARIAE

tusa & cribrata per os ad cornu per triduum dabis. Nonnulli uero duobus sextarijs, coditi fabae fraxe hemina ante triduum fundunt, post deterunt diligenter, & aequatis partibus per triduum digerunt. Alijs placet farinae fabaceae sextarium unum, tribus sextarijs, uini ueteris infundere, additaq; olei optimi libra pariter deterere, ac dare per cornu. Si tussis ex ruptura uel uulsiōe prouenerit, anagallicum primo tundes, post herbam paritariam pro duabus partibus teneram admisces, adiunctaq; axungia ueteri conteres diligenter, & pastillos (experta) stillos facies, quos impari numero & imparibus diebus cum resolutobutyro ac melle diffundes. Ad leuem tussim uiatoria sunt (expeditaq;) remedia, porros decoquere, & cum herba paretaria bene tonsa miscere, factisq; pastillis in ouo resolutobutyro oleo roseo, necnon & passo & melle conuoluere per triduum deijcere, succum ipsius iuris in quo decocti sunt porri, in super dare per cornu. Item laseris opii syrenici ad magnitudinem fabae, cum uino ueteri deteres et per cornu dabis. Tussiet grauedini capitis medebitur oleum roseum uel certe simplex & uiride cum aqua calida per narē dextrum per triduum diffusum.

De uulsis. Caput .LXVI.

Vulsis glutinare creditur, si draganti uncias 2. pridie infundas in calidam, foeni quoq; greci hemina, lini seminis hemina, separatim infundas, die postero in cacabo decoquas & pariter teras, post medullae ceruinæ uncias 2. sepi hircini libram, radice tracontiae unciam 1. gentianæ unciam 1. centaureæ unciam 1. sepi taurini unciam 1. cotundes, & illis quae prius parata sunt addas: quae omnia in mortarium mittes, & diutissime coteres. Ad ultimum passi sextarios tres & aquam in qua foenigrecum uel semen lini fuerat infusum adijcies & decoques, ac per triduum ad cornu dabis. Grauius tussientes & uulsi hac potione recreantur: De masculo pinguis porcinus acro decoquitur, donec omnis caro soluat, abiectisq; ossibus uniuersis cum iure quo defebuerat & tribus sextarijs (passi) succidi: Deinde rursus in cacabum mittis glutis taurini semiunciam, aceti acerrimi hemina dimidia coniungitur et feruet ut quilon fiat, traganti uncias 3. lini seminis et foenigreci uncias singula decoquuntur extrinsecus et teruntur: adiunges etiam medullae ceruinæ et sepi hircini uncias 3. quae ad ultimum cum omnia pariter calefacta fuerint & colata, facies potionem, ex qua per cornu dabis animalibus diebus septem, aut nouem curaturus, aut tepesactam digeras ut inspissentur, adiecto passo & aquae illius copia in qua

qua cocta sunt semina. Præterea aliquāti caput agninum tam diu decoquūt, donec omnis cōpago soluatur, abiectisq; ossibus terunt, adiectoq; ad ius ipsius melle, diebus septē ad cornu digerunt. Quod si tussis ex faucibus ueniat, myrrhæ uncias 3. cardamomi uncia 1. nuclei sextariū, uux passæ sextariū, deteres diligenter, additoq; melle agitando lentis carbonibus decoques, cum intepuerit, pastillos ad nucis magnitudinem facies, quos ternos cum butyro diebus quinq; uel septem digeres. Item si ex faucibus causa est, occisum pullum palpitantem aperies, & tollis eius uentriculum, quē cum suo stercore calentem & integrum in melle conuolues, & per cānalē digeres. certissimū ac uerum remedium est. Si exasperatio gutteris mouerit tussim, myrrhæ uncias 2. piperris uncias 2. seminis lini frixi & contusi sextarium, cardamomi semiunciam, uux passæ sextariū, nuclei sextariū, mellis pondo duo, diligenter trita cōmiscas ac decoquis, pastillos ad nucis magnitudinē facies, ternos in die digeres.

De tussi quæ generat̃ ex humoris acerbitate. Ca. LXVII.

TUSSI quæ ex acerbitate humorum prouenit, tali ratione succurritur: In primis purgandum est corpus tussientis. Cucumerem itaq; syluaticum uel radices eius cum nitro Alexandrino conteres, & diunctoq; uino uetere per os dabis ad cornu. Quæ potio cum laxauerit uentrem, post diē tertium squillæ ualidioris 3 quatuor contundes, & optimi laseris quantum fabæ patitur magnitudo commiscas, uiniq; odorati sextarium, & olei ueteris librā addis, & cum diligenter omnia cribraueris, triduo per os desundes ad cornu. Item alia. Istis quoq; suffumētis nō minus quā potioibus adiuuabis: Sandarici uncias 3. asphalti uncias 3. alij & ceparum uncias 3. quæ cum pariter triueris, in tres partes equaliter diuides, & per triduum cooperto ori uel capiti subiectis carbonibus suffumiges, ut odor impleat nares. cuius tamē oculos prius ligabis ne medicamenti acerbitate ledantur. Herba quoq; marrubij fasciculum quā magnum uolueris deteres, et cum ouo & uino succido admiscas, addita adipe ceruina, uel si defuerit, uerbenaceam cum cera resoluis, & cum tepida ad cornu digeris. Grauiſsimæ subuenit tussi si pillulas cypressi decoquas, & purges diligenter, addita axungia, & argallico, & folijs tenerioribus herbae paritariae, cōtundas in pila, et pastillos ad nucis magnitudinē facias, quos quotidie impares cum melle & oleo et uino passo, uis intinctos deijcias. Si placet pro pillulis etiam folia cypressi cōtusa miscere cum omni-

P 3

bus supra

ARTIS VETERINARIAE

bus superscriptis poteris, picis liqda facere potionē, et dare p cornu. Ad oēs
tusses talē dedere pleriq; potionē; draganti, myrrhæ, spicæ nardi atq; uncia 1.
decriuere sollerter, et cū duobus sextarijs passi per triduum diffudere.

Ad tussim siccam, uel suspirium. Ca. LXVIII.

Ad arteriam exasperatam, et ad spasmodum: hyssopi librā, scenigræci se-
librā, seminis lini, tracanti, anagallici, rutæ uiridis singulas selibras,
salis heminam dimidiam conteres, et usq; ad tertiam decoques cum
passo, tussienti per triduum, uulso per nouem dies dabis. Alij petroselinum mace-
donici unciam 1. semis, dauci unciam 1, myrrhæ, spicæ nardi, costi, tracanti,
singulas uncias, prius in mulla tepida diffusas, acori, pipis, succari atq; uncia 1.
guttæ armeniæ uncias 2. cassiæ uncia 1. pariter deterunt, pastillos ex mul-
sa faciunt, post cū passo deiciunt tediāti. Ad tussim ueterē, et ad suspiriū, uel
anhelitū, et ad synanchen, si mox dederis storacis rubæ uncias 3. murrhæ
trogloditis uncias 2. opopanax unc. 2. irisillyricæ uncias 2. galbani unc. 2.
resinæ terbentinæ uncias 3. herbæ simoniacæ uncia 1. pariter commisces et
deteris, pastillos facies cū melle. Præterea axungie librā semis, caricas quatuor
decim (pineam) combustā, et in puluerem redactā, liquaminis optimi hemi-
nam, mellis librā cum cauliculis excoctis, offas faciūt et cum passo digerūt.
Aliquanti hederæ folia, itē populi albi folia, æquo pondere deterūt, et cū uino
albo per nares defundunt. Alij rutæ folia cū melle deterūt, et cū uino optimo
per nares defundūt. Alia. Cucumeris syluatici folia sceno miscēt, radicēq; ipsius
contundūt, et cū lini semine et hordeo cōmixta offerunt. Experimento pro-
batū est tussim suspiriūq; sanare. Alia. Sulphur uiuū et rosmarinū cū melle
et uino ueteri per sinistram narē digeris. Aliquanti panacis radicē detritā
cū uini optimi hemina, et tribus cyathis olei, per cauernas naris sinistra in-
fundunt. Præterea rosmarini 3. myrrhæ scrupulos 2. cū uini ueteris sexta-
rio, olei hemina, per nares triduo defundūt, ita ut in die detur hemina. Anetū
acetabulum, irisillyricæ acetabulū, rutæ scrupulū 1. olei heminā dimidiā per
os digerūt. Suspirium quoq; ac tussim releuat, si radicis mori scrup. 1. herbæ
heliotropij uncias 3. diligenter cōteras, et cū hemina uini candidi per os de-
fundas. Recens quoq; tussis expimēto curationis sedatur. Lentis sextariū se-
mis emolis, farināq; mollissimā facies, ex qua singulas heminas cum singulis
heminis aquæ per os per triduum digeris. Vetus aut tussis aboleri creditur, si
cyathis

cyathos tres ex succo porri cum hemina olei pluribus diebus per fauces de-
fundis. Tussientes ac uulsi hac potione curantur: panacis radice uncias 2. sul-
phuris uiui unciam 1. thuris masculi uncias 2. myrrhae trigloditis unciam 1. com-
mixta in puluerem rediges, ex quo duo cochlearia cum duobus ouis, addita ui-
ni ueteris hemina, diebus quinque uel septem per os dabis. Expertum dicitur, ulmi
cinerem leuissimum. i. fauilla aqua tepida miscere, & olei boni aquam mensuram
addere, iunctisque tribus ouis, diebus quot uolueris dare per fauces.

Ad uomicam & tussim. Caput .LXIX.

Validissima contra tussim & uomicas compositio est: succi marrubij
expressi heminam, caricis siccas xxv. mellis attici uel cymini sexta-
rium semis, in olla noua ad medium decoques, post myrrhae trigloditis
uncias 2. dauci unciam 1. castiae fistulae unciam semis, cinnami semunc. thuris mas-
culi unciam, aristologiae uncias 2. opopanax unciam, irisillyricae unciam semis, ra-
dicis panacis unciam, uniuersa coterito atque cribrato, & supra medicamentum in
quo mel et ficus coxeris mitto, et studiose agitando feruere facio paulatim car-
bonibus lentis, post in pixide plumbae uel lignae condito, ex qua bina cochlea-
ria cum hemina uini per os quotidie digeres. Vulsis uel tussientibus prodest singu-
los sextarios lentis, foenigræci, & lini seminis frigere separatim et puluerem
facere, et de singulis speciebus singula cochlearia cum succo anagallici, et succo
plantaginis quantum uolueris addito uino per os dare.

Diuersae potiones uulforum & tussientium. Cap. LXX.

Vt diuersae causae sunt, ita et difficiles curae. Quapropter studiose quae
expimentis nostris uel aliorum probata cognouimus intinamus. Ad unum
itaque aial talis potio praeparatur: fabae frictae sextarium sine sale cum aqua
decoqs quae admodum hominibus consuevit apponi. praeterea foenigræci sextarium
separatim mittis in cacabum, et cum feruere coepit primam aquam fundes, post addis
aquae sextar. v. caricis xx. ligritiae unc. 2. tantum ferueat donec 4. sextariis re-
maneant, tunc fabam istam coctam, et foenigræcum, cum caricis uel ligritia in mortario
diligenter deteris, addis insuper butyri. sepi hircini ass. unc. 2. ad calorem diligenter
resolutas. quae cum omnia miscueris, addito iure in quo foenigræci decoxeris tepescit
per cornu plus quam singulas heminas diebus singulis faucibus digeres. quod si spissior uel
deteris potione, tantum passi addis ut possit per cornu exire. Barbarorum usus ad-
uersus tussim inue-

ARTIS VETERINARIAE

inuenit salutare remedium. Radicē herbæ, cui nomē est enula, quā cāpanam pleriq; appellant, colliges, in umbra siccabis, postea deteres, in puluerem rediges, ex quo terna maiora cochlearia in singulos sextarios uini ueteris pridie infundis, & cum bene agitaueris claudes, ne odor herbæ salutaris exhalet, per os triduo, uel quot uolueris diebus digeres. Item alia. Lentis alexandrinæ, fœnigræci, lini seminis heminas singulas decoquis, addisq; ei tragantū unciam semis, pridie in tepida infundis, & anagallici uncias 3. diligentissime resolutas, quæ cum omnia in mortario triueris, in cacabo nouo cū tribus aquæ sextarijs decoqs, exinde tertiā partē cum sextario passi tepidū per os dabis triduo. continuo sanare creditur uulsos. Si iumentum ex uulneribus faucium tussis urgebit, irisillyricæ unciam 1. piperis nigri semiunciam, succari 3. 1. myrrhæ troglitis semiunciam, thuris pollinis semiunciam, traganti prius infusi & triti unciam 1. oua quinq; cum passi sextario cōmiscēs, & triduo per fauces digeris ad cornu. Post mel, butyrum, axungia, salem & piculam cōmiscēs, offas facies, & in passo intinctas digeras. Si ab internis tussierit, succi pīsanæ heminā, defuti cyathū miscēs, & per tridū dabis. Si grauius tussierit animal, sabæ frixæ & coctæ sextariū, seui hircini uncias 3. allij capita tria pariter decoquis, & in mortario deteris, & cum passo dabis. Curat aut uulsos & ruptos, fœnigræci sextariū 1. cum xx. caricis, fasciculo apij, & fasciculo rute in aqua ad mediū decoquis, ita ut postmodum traganti resoluti uncias tres, & anagallici contusi uncias 3. allij tres addātur, & oīa cōterantur, offulisq; ad nucis magnitudinē factis, terna, quæ, septena p tridū digerūtur

De Scabie. Caput .LXXI.

Scabies iumentis deformē passionē, et interdum periculum generat. Cōtagiosa namq; est, et transit in plures. Cui nascenti medicamentis nō oportet occurrere, ne præclusa cute in uisceribus residens cōuertatur in morbum. Sed ut eruperit foras, primo purgatio uentris adhibetur, si puluerē ex radice cucumeris syluatici cum uino faucibus aīalis infundis, uel certe si radicem cōcisam copiose cum hordeo subministras. Quod cum ex ratione processerit, interposito triduo, aliquātulum sanguinis, si caput et collum scabies infestat, de ceruice detrahes. Si uero scapuli uel armi aut pectus in causa est, de brachiolis sanguis emittitur. Cum spinā, uel lumbos, aut coxas pabulis & fluans contagio peruaserit, de femorū uenis sanguis emittitur, Asphaltum, sulphur

Sulphur uiuū, picem liquidam in butyrum æquis pōderibus pariter deteris, & in sole diutissime cōfricans totū iumentū corpus perungis, aceti acris sextariū, piculæ uncias 4. cedrinæ unc. 4. pariter decoquis, scabiosum aīal ex lotio humano et calida permixta diligentissime perfricaturus, tunc penicillo in fuste ligato medicamentū inducis in sole, asphaltū et sulphur æqualiter conteris addita adipe porcina, & olei ueteris tantundē, quæ cū decoxeris, perunges in sole. Adipis librā, sulphuris uiui uncias 2. bituminis uncīā 1. olei selibrā, picis liquidæ cyathos 2. omnia conteris & decoquis, & perungis sicut supra scriptum est. Lotij ueteris humani fecis 3. stercoreis ouilli selibrā, olei heminam, sulphuris uiui uncias 3. picis liquidæ cyathos 3. oīa contere & decoque & in sole calido animal semel in die perunge. Bituminis pondo duo, sulphuris uiui selibrā, ceræ librā, mānæ thuris selibrā cōmises in oleo in quo prius fasciculus aricis decoctus est, & perungis in sole. Alia si minus habeat integras uires, Ranas in aqua decoquis, unctamq; earū colligis, & cum polline lenticulæ, adipe et oleo permises, & pfecto perungis. Itē alia. cucumeris syluatici radices lauas & tundis in cacabo nouo cum oleo quātum sufficit decoquis et uteris. Sulphur quoq; cū uino decoctū similiter iuuat. Si uetustate scabies occalluit, prius obradenda ferro uel testis ad uiuū est, insuper humano lotio cū aqua marina uel salsa mixto cōfricandum est, post sulphuris, bituminis, picis liquidæ, axungie ueteris, sepi caprini, ceræ, aluminis spissi singulas libras contūdis, mises, & decoquis, & sic aīal perungis in sole. Folia de rodedafnes cum oleo uetere decoques, addita pice liquida, & aceto, et cera, certum est de experimento remedium. Memineris tamen in omni unctione, contra pilum iumentum in sole diutissime cōfricandum.

Si animal fœno malo lædatur. Caput .LXXII.

Viciatum aliquoties uel modicum fœnū ad similitudinem ueneni aīalibus nocet, quorum ista sunt signa: Oculos habebunt uagos & semper micantes, ipse gradus eorū erit incertus. His de matrice auferendus est sanguis, de brachiolis flebotomandi sunt, & potionandi ita. Caricis in uino odorato decoctis, rursum detritis, abstinendi ab horæo & fœno. dandæ etiam duritiæ potiones.

Si hordeo malo lædatur. Caput .LXXIII.

Simili obseruatione curatur, quæ nimio hordeo aut malo læduntur. Sed

Q

hæc etiam

ARTIS VETERINARIAE

hæc etiam in aqua frigida aduersus torrentem diutissime detinentur. Vtriq;
remedium est, pelliculam de uentre pulli siccata fumo deterere, additisq; octo
scrupulis piperis, & quatuor cochlearibus mellis, & uncia pollinis ex thu
re, cum sextario uini ueteris tepesfacto per os dare.

Ad Fascinum. Caput .LXXIIII.

Fascinatum animal triste est, grauatur incesu, macescit, & nisi subuene
ris incidet in morbum. Bituminis igitur & sulphuris parū cū granis
lauri ex aqua defundis p nares. Præterea coriandrū uel semē ipsius cū
sulphure & teda carbonibus circūferes, ex aqua feruenti animal consperges
suffumigabis. Vniuersis quadrupedibus remediū præstat ista suffumigatio, cu
rat atq; morbis resistit.

Remedium contra omnes morbos. Ca. LXXV.

Aduersus uniuersas infirmitates & morbos equorū uel boū, ubi pri
mū cœperint egrotare potio ista succurrit: Radix scyllæ, radices po
puli, quæ græce appellatur rhamnos (nā est fuscior & nubellula) &
sales cōmunes quātū sufficit mittes in aquā, eāq; aīalibus usq; ad sanitatē da
bis in potu. Quod si desperatas uoletudines præoccupare uolueris, ne unq; ac
cidāt aīalibus tuis, incipiēte uere hāc illis præparabis potionem, & per xiiij
dies continuos dabis in potu.

Si aīal lædatur cū accipit potionē. Cap. LXXVI.

Osten tendū autē est potiōes ipsas oportere curatione defundi. Siq; dem
As(salut) frequēter euenit, ut dū aīalia potionātur tussiant (sudēt) grauiter, et
tō emorē musculorū oīm patiantur, sollientes, & submisso capite se
sustinere uix possunt. Qd̄ accidit si quando per imperitiā artis dantis, potio
in arterias & spirituales partes pulmonis resilierit. unde fit & piculū præ
sens. Quare obseruandū est ne tussienti iumēto et pendenti adijcias potionē,
sed statim eā soluas, paululūq; deambulet, & magis ei alia potione subuenias;
aqua tepide oleū rosatū cōmises & agitas, & per os sæpius dabis. Pusca
quoq; puleiata nares eius fouebis, & emendabitur culpa. Obseruandū quoq;
est, ut subtrac̄to hordeo, & negato potu digerit animal potiones.

Si aīal mordeatur à uenenatis bestiis, Ca. LXXVII.

Plerunq;

Plerumq; à nociuis aīalibus. i. à colubris, scorpīs, sphalangīs, & mu-
ribus cācis aīalia feriuntur, & in periculū ueniunt. Cuius ista sunt sig-
na: fastidium ciborū, pedes trahuntur, & cū producantur succūbunt
ad singulos gressus, per nares defluet sanies, grauedo nascitur capitis, ita ut
deiciatur ad terrā, ad surgendum uel incedendū deficiūt corporis uires. Ge-
neraliter curatio ista succurrit: Locus qui percussus est ante oīa fumigandus
est succensis testis ouorū gallinæ, quæ prius infundes in aceto, addito etiā cor-
nu ceruino uel galbano. Post fōmentū loca ipsa scarificabis, & sanguinē ex
his emittis, Vel certe candenti ferro comburis loca uenenata quæ pistis attin-
git. Obseruare autē debes, ne aut supra articulos aut neruosis in locis in qua-
cumq; passione unquam cauterium imponas. Aduſtis enim neruis uel articu-
lis, perpetua debilitas consequetur. Sed dilige iter considera, ut aut superius
aut inferius pusillum quā nerui aut articuli sunt, cū neceſſitas fuerit, appo-
nas cauteria. Animal autē quod uenenata bestiola tetigerit expedit ut sudet et
calidis coopertorijs inuolutū deambulet, & farinā hordeaceā in cibo sumat,
additis frondibus fraxineis & uitibus albis. (credo) in plaga autē mel atticum
uel cyminū in uino ueteri mixtum calefactū oportet imponi. Nonnulli stercus
suillum recens & mel atticū cum uino miscent, et calefactum quasi cataplas-
ma inducunt, addentes urinam humanam.

Si bustrepem aīal comederit in ſceno. Ca. LXXVIII.

Equus si bustrepē comederit in ſceno uel in pabulo, hæc signa statim ſe-
quuntur: Venter ei inflatur, à cibis reſilit, & ſtercora minutatim et fre-
quenter reddit: qui statim sternendus est, et cogendus ad cursum. Post ei
uena tangenda est de palato leuiter, ut sanguinē suū defluenē transglutiat,
aſidue deambulet, triticum cum passo infuſum & porros adferes ad ciban-
dum. Vinum autem tepetactum cum uua passa diligenter contritum ad cor-
nu dabis eidem in potu.

Si uīpera animal percusserit. Cap. LXXIX.

Vīpera si momorderit tumentum, ex morſu eius pus conueit exire.
Nam si prægnaſ erit, totum rūpietur corpus. Ad morſum tamen ui-
peræ, uel sphalāgij, aut muris aranei, cōe remediū eſt, terrā formica-
rum cū uino miſcere et dare per ſāuces: Vel certe de ipsa terra frequēſſime

ARTIS VETERINARIAE

uulnā cōfricare. Ad quas causas etiā terra talparū crediur posse prodesse. Quod si in itinere aut in locis ubi desit copia fumetorū necessitas ipsa contin-
git, piperis grana .xxx. cum sextario uini ueteris tep. factō faucibus digeres,
et herbam thymū tritam cum uino si dederis prodesse creditur. Morsus ui-
peræ uel cuiuscunq; serpētis ostenditur, si humor putidus de plaga incipit cur-
rere. Præsens remedium est, si hedum uel gallum uel agnum in recenti occide-
ris, et calentes pulmones eius cum sanguine, uel corde, uel iecore uulnē ap-
posueris, diligenterq; constrinxeris ut omne uirus educat. daturus continuo
portionem: acori pontici semiunciam tritā cum uini ueteris sextario, salis tritā
hemina pariter mīscēs, et tep. factum faucibus digeres. Si perseverat tumor,
uitem albam syluestrem copiose comburito, et ex cineribus eius lixiuū facito,
et in portionem triduo ad unum sextariū dato. Cinerem quoq; ipsum cū ace-
to in modū cataplasmati uulnē imposito. Si nihil profecerit, cauterijs uri-
to, uel solenniter curato. Farinam quoq; hordeaceam cū uino et sale, oleoq;
decoctam in cicatricem oportet imponi.

Si araneum comederit. Caput .LXXX.

Iumentum si in pabulo araneum comederit, hæc erunt signa: Totum cor-
pus tumebit, sed circa auriculas, et oculos, et nares inflatio cū indigna-
tione maior apparet, cui hac ratioe subuenis: De palato sanguinem tollas,
cumq; exceptū cū sextario aceti et hemina salis mīscēbis, et circa plagā uel
loca iumentia punges, diligenterq; operies ut sudet. hac rōne sanabitur.

Si sphalangius percusserit. Caput .LXXXI.

Si sphalangius iumentum percusserit, his apparebit indicij: Stat ei ue-
retrum præ dolore, et uidebis uelle mingere, cui ista ratioe subuenies:
piperis unciam i. piretri unciam, uuae syluaticæ unciam, terito, et cum
uino ueteri per fauces dato.

De mure araneo. Caput .LXXXII.

Mus araneus pestis uenenata, et tam equis quàm bobus noxia, atq;
ideo cum captus fuerit mersus necabitur in oleo, ibiq; in putredinē
uertitur, ex quo medicamento cum animal mordetur, plaga liniatur,
et curatur animal. Vel si inuentus non fuerit, cyminum tritū cum pice li-
quida.

quida axungiaq; miscetur, ad spissitudinē malagmatis coquitur, impositūq;
 à periculo liberat & sanat. Quod si in suppurationē fuerit plaga conuersa,
 lamina ferrea candenti aperiēda est, & quicquid uitiosum est inurendū, atq;
 ita pice liquida uel oleo curādum. Ne autē mus araneus aīal mordeat, ipsum
 animal uiuū de creta circumdabitur, quæ cum indurauerit, suspēditur in col
 lum, & non contingetur à morſu ceriſſimum est. Aduersus morſum com
 probatur, allium tritum cum nitro, & si nitrū defuerit, cum sale et cymino
 permiscere, atq; ex eo puluere loca, quæ morſu contacta sunt, cōfricare. Qd
 si eruperint uulnera uenenata, hordeum combustū in puluerem rediges, &
 diluto aceto uulneri inſpergis, & hac ratione sola curabis. daturus potionē,
 pollinem tritici, hordeū, cedriam, & uini sextariū per fauces digeres. Quod
 si prægnaus mus araneus fuerit qui percusserit, his agnoscitur signis: Pustu
 le per totum corpus exeunt, sed simili, ut supra scriptū est, ratione curabitur.

Ad ictum scorpionis. Caput. LXXXIII.

SCorpius si iumentum percusserit, his agnoscitur signis: Genua cotra
 huntur, claudicat, non manducat, de naribus fluent pituitæ uirides, ut
 accumbit uix resurget. Simili ratione curatur sicut serpētis ac uiperæ
 morſus: ster cus tamen aſinū uelocius in plagam oportet imponi.

De morſu canis rabidi. Cap. LXXXIII.

CAnis rabiosi morſus & iumentis, & hominibus exitium inferre con
 ſueuit, uſq; eo ut ipsi qui contacti fuerint hydrophobos faciat, & con
 uertat in rabiem: qui hac ratione curatur: Locus qui morſus est, fer
 reis, uel quod utilius est, cuprinis cauterijs urito, in loco tenebroso eum cōſti
 tuito. Sic etiam eum adligabis in tenebris ne quicquam uideat. Quod si canē
 ipsum occidere poteris, iecur eius decoctum dabis ad manducandum, uel de
 tritum ſaucibus digeres. Fœni quoq; flores combures, & cum axūgia ueteri
 deteres, & ad morſum appones, ſalutare remedium est. Sed ſpecialiter pro
 deſt, si radicē cynorhodon, id est, herbæ quæ appellatur roſa canina effode
 ris, & lotam prius atq; cōtuſam diligenter, ſiue homini ſiue animali, quod ra
 biosus canis momorderit, in plaga appoſueris, contritamq; cum uino ueteri
 propinaueris quotidie ad bibēdum. Hac enim ſola ratione nec hydrophobus
 fiet, & imminens crimen euadet. Canis rabidi morſibus ſubuenit, ſi tres ani

Q 3 tri, iudaici

ARTIS VETERIN. VEGETII. LIBER III.

tri, iudaici bituminis scrupulum unū tritum cum hemina uini ueteris tepentis triduo per os digerat. Samsuci quoque grana uel succū de folijs aut de cortice exprimes, et cum uino ueteri dabis in potu. Sed tunc efficax est hæc portio, si de eo samsuco dederis, quæ nō in terra, sed in alia arbore fuerit innata.

Si sterco gallinæ animal comederit. Ca. LXXXV.

Si finum gallinarum animal in hordeo comederit, uel feno sumpserit, quasi à uenenatis bestijs percussum cruciatur continuo, inter norum dolor et inflatio subsequitur, ad similitudinem quoque strophii et uolutio ac tuſis asperissima. Aduersus quā necessitatem, apij seminis deteris uncias 2. et cum uini ueteris sextario, et hemina mellis temperas, et per os defundis, et tam diu deambulare cōpelles, donec potio uentrem moueat. Quod si nimius dolor etiam obrobatio fuerit subsecuta, baccarū lauri librā, nitri seli bram, aceti sextarios duos, olei sextariū, diligenter trita permisces, et ad fōcum calefacies, et in loco calido per triduum unges, et contra pilum diligenter fricabis, certissimū daturus ex sudore remedium. Aduersus huiusmodi casum physicum remedium experimenta docuerunt; Pullum si occideris uel gallinam, uentremque eius crudum et adhuc calentem cum stercore suo equo uel mulo inuolutum melle digerere per fauces, optimum creditur. Tres pillulas gipsi cum uino ueteri deterere, et tepidum per os dare, eadem optime sanare firmatur. Lixiuum quoque de arbore ulmi, uel cuiuscūque generis ligni cinerem, dummo do bene cretum, cum olco miscere, ac liquidum et tepidū defundere per fauces, physicum et salutare laudatur.

FINIS LIBRI TERTII.

VEGETII RENA

TI ASTIS VETERINARIAE LI.
BER QVARTVS.

DE NUMERO ET POSITIONE
ossium. Caput primum.



IVMENTVM IGITVR HABET
in capite ossa duo, à fronte usq; ad nares alia duo, ma-
xillaria inferiora duo, dentes quadraginta. i. molares
xxiiij. caninos ij. rapaces xij. In ceruice autem sunt
spondili vij. spatula renū sunt octo. à renibus usq; ad
anum septem, muscarium habet commissuras duode-
cim. In armis prioribus sunt regulae duae. Ab armis
usque ad brachiola duo. A brachiolis usq; ad genua duo. In genibus parasta-
ticae duae, à tibia usque ad articulos duo, bases quae appellantur numero duae,
usq; ad pumices ungulae ossa minuta sedecim, in pectore unum, Costae tamen
in interioribus triginta sex. Item à posterioribus à (cumulari) usq; ad mola-
ria duo, à molaribus usque ad uertebrae duo, costales duo. Ab acrocolesio
usque ad gambam duo, à gamba usq; ad cirros tibiales duo, minuta usque ad
ungulas sedecim. Et sunt ossa omnia centum septuaginta.

als (columellari)

De numero & qualitate membrorum. Ca. II.

Nunc mensuras numerūq; membrorum oportet exponi. In palato gra-
dus sunt xij, longitudo linguae habet pedem semis, labrū superius ha-
bet uncias sex, inferius uncias quinq; maxilla singulae uncias denas,
à cirro frontis ad nares habet pedē, auriculae singulae continent uncias senas.
In oculis aut singulis unciae quaternae. à cirro ubi desinit ceruix usq; ad mer-
curium continetur calculi octo, Spina continet subter spatulas triginta duas, à
commissura renū (quod cumulare dicitur) usq; ad imū muscarii commissurae
sunt xij. Sagulae longitudo uncias xij. ab armis usq; ad brachiola uncias vi. à
brachiolis

ARTIS VETERINARIAE

brachiolis usq; ad genua longitudo cōtinet pedem. Ab articulis usq; ad ungulas uncias 4. In longitudinem uel prolixitatem pedes sex. Hæc eumetria equi conuenit staturæ honestæ ac mediæ. Ceterum non dubitatur in buricis minorâ istâ, & in primæ formæ equis esse maiora.

De numero & qualitate neruorum. Cap. III.

Neruorum quoq; numerus, qualitas, ac mensura pandenda est. A' medijs naribus per caput, ceruicem, ac mediam spinam, usq; ad imum muscarium descendit filum duplex, quod continet pedes duodecim. Duo nerui in ceruice palmarij continent pedes quatuor. Ab armis usq; ad geniculū nerui duo. à geniculo usq; ad basim uerui quatuor. In prioribus sunt nerui decem, in posterioribus decē. A' renibus usque ad testes nerui quatuor. fiunt in se omnes nerui trigintaquatuor.

De qualitate uenarum. Caput .IIII.

Consequenter uenarum quoq; indicandus est numerus. In palato uenæ sunt duæ, suboculares duæ, in pectore duæ, de brachiolis duæ, de subcirris quatuor, de talis duæ, de coronis quatuor, de seminibus quatuor, de femoribus uero duæ, de subgambis duæ, de muscario una, uenæ maxtricis in ceruicibus duæ. fiunt pariter uenæ xxix.

De indicijis & ætate equorum. Cap. v.

Aetatem iumentorum ex dentibus alijsq; signis oportet agnosci, ne uelamentis imperitiæ subeamus incōmodum, uel curantes ægrotantis ignoremus ætatem. Quia sicut hominibis, ita & equis, aliud conuenit, cum iumenta sunt feruida, aliud cum senectute iam frigida. Manifestum est autem notas corporis cum ætate mutari. Pullis enim bimis & sex mensium medij dentes superiores cadunt, quos lactantes uocant. Cum aut quartū annum agere cœperint, deciditibus his qui canini appellātur, alios supponēt. Deinde intra sextum annū molares cadunt. Sexto anno quos primo mutauit exæquat. Septimo omnes expleantur æqualiter, & ex eo cauatos habere incipiunt dētes, nec postea quot annorum sint scire ad fidē nullus potest, nisi signis alijs, quæ usus edocuit. Decimo namq; anno tempora cauari incipiūt, & supercilia nonnunquā canescere. Duodecimo anno nigredo in medietate dentium

dentium apparet. Plurique adserunt, domitis et freno assuetis animalibus rugas, quæ in labris sunt superioribus computandas, ita ut ab angulo ubi cœperit morsus incipientes, usque ad extremum labrum perueniamus. quia annorum numerum, rugarum ostendit. Postremo, rugarum multitudine, tristitia frontis, deiectione ceruicis, pigricia totius corporis, stupore oculorum, palpebrarumque caluicie senectus ipsa se prodit.

De signis quibus cognoscitur patria. Cap. VI.

IN permutandis equis uel detrahendis, maximam fraudem patriæ solet afferre mendacium. Volentes enim charius uendere, generosissimos fingunt. Quæ res compulit nos, qui per tam diuersas et longinquas peregrinationes equorum genera uniuersa cognoscimus, et in nostris stabulis sæpe nutrimus, uniuscuiusque nationis explicare signa uel merita. Nam ut uiltiora ministeria taceamus, equestribus usibus uel maxime necessarios constat præliis circis, uel ad bellum hunniscorum longe primo docetur utilitas patientiæ, laboris, frigoris, famis. Toringos deinde et Burgundiones iniuriæ tolerantēs. Tercio loco Frigiscos, non minus uelocitate quam continuatione cursus inuictos. Postea Epirotas, Samaricos, ac Dalmatas, licet contumaces ad frenata uiles, armis ac bellis assueuerant cruribus. Capadocum gloriosa nobilitas Hispanorum par uel proxima in circo creditur palma. Nec inferiores propè Sicilia exhibet circo, quamuis Aphrica hispani sanguinis uelocissimos præstare consuevit ad usum sellæ. Persis prouincijs omnibus præstat equos patrimonio censibus æstimatos, tam ad uehendum molles et pios incessibus, nobilitate pretiosos, sequuntur Armeni atque Saphareni, in qua nec Epirotas Siculosque despexeris, si mores ac pulchritudo non deferat. Hunniscis grande et audacium caput, extantes oculi, angustæ nares, latæ maxillæ, robusta ceruix et rigida, iuba ultra genua pendentes, maiores costæ, incurua spina, cauda syluosa, ualidissima tibia, parue bases, plenæ ac diffusæ ungulæ, ilia cauata, totumque corpus angulosum, nulla in clunibus aruina, nulli in musculis thori in longitudine magis quam in altitudine statura, propensior uenter exhaustus, ossa grandia, macies grata, et quibus pulchritudinem præstet ipsa deformitas, animus moderatus et prudens, et uulnerum patiens. Persis et statura, et positione à cæteris equorum generibus non plurimum differt, sed solius ambulationis

R turæ quadam

ARTIS VETERINARIAE

tura quadam gratia discernuntur à cæteris, gradus est minutus et creber, et qui sedentem delectet et erigat, nec arte doceatur, sed natura ueluti iure præstetur. Inter colatorios enim, et eos quos totonarios uulgus appellat, ambulatura eorum media est, et cum neutri sint similes, habere aliquid creduntur ab utrisque commune sicut probatum est. In breui amplius gratia, in prolixo itinere seuior patientia, animus superbus, et nisi labore subiugatus, assidue aduersum equitem contumax mens, tumens, prudens, et quod mirum est, in tanto seruire cautiissime decoris est obseruantior, incuruata in arcum ceruix, ut recumbere uideatur in pectore.

De temporibus uitæ. Cap. VII.

Aetas longæua Persis, Hunnicis, Epirotis, ac Siculis: breuior Hispanis ac Numidis. Frequens opinio est Barbaricis nulla adhibenda medicamina, quod usque adeo naturæ beneficio ægroti cōualescant, ut eis nocitura sit cura. Sed falsa erat ista persuasio. Nam quanto fortiora membra sunt, tanto diutius uiuunt, si ex aëre uenientibus medela non desit. Spadonibus tamen inter authores constitit sanguinem de matrice nunquam, nisi forte ex nimia et extrema necessitate, tollendum: propterea quod caloris maximam partem cum testibus amiserunt. De palato tamen si non impediatur negligentia, omnibus prope mensibus tam spadonibus, quam testiculatis, minuendus est sanguis. Admissarii uero si cohibeantur à uenere, ubi dematriculati fuerint, cecari sepe dicuntur. Quamuis eo anno quo admissum faciunt, non sit eis uena laxanda, ne generationi intentum corpus cura gemine necessitatis exhauriat. Studiosis equorum, quæ cura stabuli, qui alimentorum cultus, quæ obseruationis sollicitudo præstata sit, primus ac secundus indicat liber. Nunc decursis omnibus his, quæ huius artis doctrina possidet, ad compositiones necessariorum porionum medicamentorumque descendimus, in quibus et explorata congestimus, et ea quæ non tam ad utilitatem curandi, quam ob caritatem emendi Mulomedicorum cupiditas inflauerat submoimus. Constat namque non tam multis neque pretiosis speciebus, sed paucis, et ad causam de qua agitur accommodis posse sanari. Primum igitur ut pingua sint iumenta tam in currilibus quam in sellaribus decet, deinde ut sana permaneant, post ut ægroti curentur, confectiones (ut dictum est) medicaminum proferemus electas

electas ex authoribus multis, de experimentis manifestissimis approbatas.

Potio ad reficienda animalia. Ca. VIII.

TRaditur Chiron ad reficienda iumenta uel curanda, hanc adidisse po-
tionem, qua internos extergeat morbos, qua tuſſim reprimat, uulſos
ac tuſſicos curet: Ptisana sextarium, lini ſeminis heminam, croci unciam
unam, inteſtinum porcinum recens, quod longanionem uocant, prius diligen-
ter lotum, uel acronem; quæ ſi in præſentia forte non ſuppent, hedinum ca-
put cum pedibus & inteſtinis ac uentre, & diligenter quaſi ad hominum uſ-
us curatum, in cacabum mittis, addes ſuperioribus hyſſopi faſces duos, co-
chleas germanas purgatas quindecim, bulbos quindecim, ficus duplices uigin-
ti, rutæ faſciculum unum, baccarum lauri sextarium unum tritum, daſtylos
uiginti, alij purgati capita tria, ſepi caprini uncias ſex, pulegij ſicci faſcicu-
lum. Quæ omnia trita decoquis in aqua ciſternina uel cœleſti, donec liqueſa-
cta carne defluant offa: ſed aquam ſæpius adicies ne medicamentum uſtura
conſtringat. Sed cum ſpiſſum uideris, colabis, abiectisq; excrementis & oſſi-
bus, tracenti uncias tres pridie calida inſuſas ut inturgeſcat & ſolui poſſit,
adicies, paſſi ſextarios tres, oua cruda ſex, olei roſati oua plena ſex, butyri
reſoluti uncias tres, anagalli uncias tres, amili uncias tres, pulueris quadri-
garij uncias tres, lomenti fabæ. i. farinæ sextarium: hæc omnia ita tempera-
bis, ut per cornu defluant, & ſextarios ſingulos ieiunis animalibus per tri-
duum dabis. Et ſi uolueris ſeptem diebus interpoſitis repetis & das à capite
portionē. Iumenta à morbis uindicat & cuſtodit: Gentiana, ariſtologiæ ro-
tundæ, myrrhæ trogloditis, raſuræ eboris, & baccarum lauri æquis ponde-
ribus puluis immixtus, ex quo grade cochleare plenum ſumis, Adde hyſſo-
pi triti ſcrupulos quatuor, mellis uel paſſi uncias tres, uini sextarium, gſni re-
ſoluti paſtillum unum, poſt curſum ſiue poſt laborem conditi bene (piperati) ^{alis (preparati)}
heminam adicies, æſtate roris uel abſynthij tantundem, & per os dabis ad
cornu. Si æſtu animal fatigatur, puſcam cū pulegio trito miſces, naresque
& faciem conſoueſcis, oua quoque trita cum hemina uini ueteris optimi fau-
cibus inſundis, ut per oui refrigerium uini uirtus accreſcat. Maciæ languo-
remq; depellit, ſi ſemiuncia ſulphuris cū myrrhæ ſcrupulis 4. in puluerē reſo-
lutis ouū crudū et uini ueteris ſextarius addatur, frequenterq; p fauces detur.

R

2

Diapentoz

ARTIS VETERINARIAE

Diapenton est (ut supra retulimus) necessariū pluribus causis ac morbis, & semper diligenti cōfectione seruandum: Gentianæ, aristologiæ rotundæ, myrrhæ, rasuræ eboris, & baccarum lauri, de recentibus speciebus in unū redactis minutissimus puluis, ex hoc febrientibus plenum cochleare cū tribus uncijis mellis, & aquæ tepidæ sextario, in qua radices iunci, & apiū sufficiēs decoctum fuerit, per os dabis, ita ut triduo similiter cura procedat. Idem puluis si ultra cochleariū cū sextario uini ueteris, & olei uiridis hemina detur, animal à quibuslibet uenenis, uel serpentū, aut bestiolarū morsibus liberat. Cui si piperis atq; pulegij, necnon etiā cimini pulueris aliud cochleare addideris, & cū uini ueteris sextario dederis, omne frigus expellit.

Ad tussim & uulsos. Caput .IX.

Tussim quoq; insanabilem curat cū hemina passi, & tribus uncijis olei & ouo crudo, si per tridū defundis faucibus, addito fabæ poline, & fœnigræco binis cochlearibus. Præterea ualde tussientibus prodest fabæ frixæ sextarius sine sale coctus, sepi caprini uncia 3. alij purgati capita 3. decocta cum succo ptisanæ, data per tridū. Quo medicamento ualidius creditur: ficus sicæ pondera 2. fœnigræci sextariū, tracenti uncia, pridie in calida infusa, anagallici uncia, rutæ uiridis fasciculū, apij fasciculos tres, pariter in aqua diutissime decoques, & faucibus per tridū defundes. Curare etiā uulsos creditur, si septē uncias cineris mūdissimi colligas, addasq; olei uncias tres, bulbos tritos vij. anagallici uncia, butyri uncia, sepi caprini uncia, mellis uncias 3. plantaginis uiridis tritæ uncias 3. passi heminā, ptisanæ uel lini seminis heminā: quæ ita temperata ut per cornu defluant, per tridū, uel ut necessitas cogit per plures dies, ieiunis singulos sextarios dabis. Desperatam tussim sæpe curauit potio uilis ac facilis: pulueris ex faba uncias sex, pulueris ex fœnigræco uncias sex, enule tunsæ sicæ pulueris uncias 6. pulueris anagallici tūsi uncias 3. butyri uncias 6. quæ omnia cū tribus boni uini sextarijs additoq; passi sextario uno semis, pariter agutabis, & uni equo ieiuno ante lucem bina cornua per os dabis, donec omnē ebibat potionē. Curā quoq; nō parū profuisse experimenta docuerūt, hac ratione compositā: fabæ frixæ sextariū sine sale decoques, addesq; sepi hircini resoluti uncias 3. butyri uncias v. in mortario deteres uniuersa, Præterea fœnigræci sextariū bene purgatū seruere

feruere facies, primamq; aquā inter initia feruores effundes, addesq; aquae sextarios v. pinguisimas caricæ xx. & liquiritiæ uncias 4. pariter decoquas donec aqua ad tres sextarios redigatur, in mortario deteris foenigracū, ligritiam & caricæ, mīscēs; cū faba, supfundis etiam calidā in qua caricæ cū cæteris coctæ sunt; cōparatisq; oībus si liquor spissior fuerit, tantū passi addis ut per cornu facile possit exire. diebus plurimis ex eo per os singulos sextarios tuſſientibus dabis.

Ad coſſos, uermes, uel tineas. Ca. X.

Coſſos, uermes, uel tineas, cæteraq; animalia uentris extinguit, si hemina cineris ex oliuæ ligno arido collecti, cū hemina olei uiridis p tri diū dabis ad cornu. Alia quoq; confectio, sed quæ sepe mortiferā liberat passionē: pulueris ſantonici, itemq; absynthij pontici, necnō lupini crudi, & herbæ centaureæ, & erui pollinis, et seminis raphani binas uncias mit tis, addisq; cornu ceruini uncia, sinopidis pontici pastillos tres, opopanacis ſemiuñciā, uini tenetani uel alterius austeri sextarios 2. olei uiridis sextariū, quæ tepēfacta ita aīali defundis, ut per os cornu accipiat, in cliuo constitutū, quatenus succus facilius ad interiora pueniat. Postero die idem aīal prouum constituatur in cliuo, & per clysterē illius tepidæ potionis sextarius ingera tur, quatenus alternis diebus ex utraq; parte iniecta potio, coagulare qđ ap pellatur, possit infundere, in quo illæ noxiæ bestiolæ ozuntur, & pertuso uē triculo ex cruciata doloribus aīalia pereunt. Est et tertia confectio nō minus ualida: Radicis capparis siculi, uel baccas cū folijs ad unā librā deteris pa riterq; cōmīscēs, addisq; aceti sextarios 2. Quod medicamentū interdū per os (sicut superius dictum est) interdum per intestinū in ijcis animali, ut inter nos hostes potionis austeritate consumas.

Aduersum omnia genera morborum. Ca. XI.

Aduersum oīa genera morborū salutaris confectio præparāda est, ut inter ipsa initia ex cōditis possit occurrī. (Causa) enim medicinæ quæ rendā est: Myrrhæ librā, thuris masculi librā, mali punici corij tun si lib. pipis uncias 3. croci uncias 3. acatiæ rufæ ſelibrā (cathimiæ) butirois ſe alis (casmicæ) librā, resinæ uſtæ ſelibrā, absynthij pontici ſelibrā, pulueris ſerpilli ſelibrā, betonicæ ſelibrā, centaureæ ſelibram, ſagapini ſelib. ſaxifragæ ſelib. peucedæ R 3 ni ſelib.

ARTIS VETERINARIAE

in selib. quæ omnia bene tinsa & cribrata in mellis optimi 3. sextarijs misceas, et ad carbonem leuiter paululū coquis, post in uase stagnæo uel uitreo condita seruas, ex qua confectione morbidis si februnt ad diē singula cochlearia maiora cumulatā cum hemina aquæ tepidæ & olei floris tribus uncijis dabis. Quod si absq; febre sunt morbidī, uel conualescere etiam coeperint, cum uino & oleo plurimis diebus dabis, donec animal liberetur. quam ualidissimam & approbatam noueris potionem.

Confectio suffimentorum salutaris. Cap. XII.

Suffimentorum compositio fascinum pellit, lustrat animal, fugat demones, submouet morbos. Odor namq; fumi ac spiritus per os ac nares ingrediens, penetrat ad ulcerum omnes recessus, ac curat sæpius loca quæ potiones non potuerunt curare. Etiam in hominibus suffimentorum uapor præcipue sequitur. Deniq; desperatos & periculosissimos morbos, aut sicut Mulomedici adserunt, non ex pabulo aut aquarum uitio, sed aeris corruptione descendentes. Et ideo facilius languorem quem pestilens morbus ingessit, suffimenti salubris huius curat adflatus. Ac talis compositio suffimentorum: Sulphuris uiui librā, bituminis iudaici librā, opopanacis uncia, galbani selibrā, castorei selibrā, (ciceris) crudi selibrā, albitis selibrā, salis armoniaci unc. 3. rasuræ cornu ceruini unc. 3. sinopidis unc. 3. gagatis scæi unc. 3. lapidis gagatis unc. 3. lapidis ematitis unc. 1. lapidis sideritis unc. 1. lapidis argeritis unc. 1. caballiones marinos 7. stellas marinas 4. pallas marinas 7. caudas marinas 7. ungues marinos 7. uuae marinae unc. 3. modulle tedæ pineæ pōdera 3. cedriæ pond. 3. picis liquidæ pond. 3. ossa sepiæ 7. hæc siccata piter dēteritū atq; miscētur, ex qbus unū cochleare, cū opus fuerit, uiuis carbōibus aspergis, et coopto capite, ut fumū p os naresq; suscipiat aīal suffis. Qd suffimentū præter curam iumentorum, sanat incurrentes hoīm passionēs, grādinemq; depellit, demones abigit & laruas.

Compositio pulueris quadrigarij. Ca. XIII.

Quadrigariū puluerē uocāt, q ex diuerso pigmentorū genere mixtus et p se adiuuat aīaliā, et alijs potionibus pro modo uel curatiōe miscetur. Huius Chiron talē cōpositiōnē saluberrimā credit: Tracanti pōdera 3. aloës unc. 6. myrrhæ unc. 6. et 3. 1. costi unc. 1. et 3. 1. armoniaci un. 1. & scrup

31. castiæ unc. 1. 3. genianæ lib. 1. aristologia lib. cētauræ lib. betonicæ
 lib. saxifragæ librā, samfuci lib. opij lib. abrotani lib. eupatorii unc. 6. carda
 momi unc. 6. folij unc. 3. spicæ nardi unc. 3. spicæ celticæ unc. 6. asari lib. dauci
 unc. 3. castorij unc. 6. opopanax unc. 6. galbani unc. 6. strutij unc. 6. panacis
 radicis unc. 6. ligritiæ unc. 6. absynthij fascēs 3. succi herbæ peristeri siccæ et
 cribratæ unc. 5. hæc oīa pariter cōteres, et diligentissime in uase uireo uel sta
 gneo seruabis. Pelagonius uero quadrigarij pulueris eiusmodi cōposuit cō
 fectiōē: Cinnamomi, spicæ syriacæ, spicæ indicæ, croci siculi, myrrhæ troglo
 ditis, scieni, pipis nigri, piperis longi, mannæ croci, betonicæ, catiæ nigre, tri
 xaginis, folij, nardi lentici. i. cepe indicis, nardi, storacis, acori pontici, thuris
 masculi, irisillyricæ, thymi cretici, pipis albi, calami aromatici, asari pōtici,
 petroselinum, mannæ croci, mali terreni, genianæ, rosæ aridæ, castiæ fistulæ, enu
 la; oīa æquis ponderibus pro modo aīaliū misces, conteris, cribras, in pixide
 uel uitreo dolio cōdis, et cū opus fuerit, singula cochlearia, uel amplius, si ui
 res patiūtur iumentis singulis dabis, addito uino et oleo. Interdū alijs potiōi
 bus misces, si ratio artis uel cura mādauerit. Absirtus quadrigariū pulue
 rem hac ratione cōposuit; Folij, spicæ nardi, crocus, piper album, piper lon
 gum, piper nigrum, opopanax radix, castia nidasantis, castia marmalitīs,
 castia nardina, irisillyrica, apij semen, malum terræ, peucedanū, sauina, gen
 tiana, herba rosina, thymum, myrrha, trixago, costum, thus masculum, gesse
 mantium, malum punicum, calamum aromaticum, rosa sicca, ruta agrestis,
 petroselinum, aristologia longa, amomum, calamum syriacum, herba arte
 misia; hæc omnia pro numero animalum præparas æquis ponderibus intera
 misces et tundis, cribrāsque, et seruabis, aduersus passiones usus.

Compositio Caustici. Cap. XIII.

Caustricum hume ita siccatur, laxata constringit, luxata parat, lesa cō
 firmat. Huius Chiron talem compositionem demonstrat: Bitumi
 nis iudici pon lera duo, bituminis apollonij pondera duo, mannæ
 thuris uncias sex, bdellij arabici uncias duas, medullæ cruiue pondera
 duo, propulei uncias duas, galbani uncias duas, guttæ storacis uncias duas,
 ceræ communis pondera duo, resinæ cabialis libram unam, uisci italici un
 cias 3, apoximæ unc. duas, succi hyssopi unc. 2. guttæ armoniacæ unc. 2. picis
 brutæ

ARTIS VETERINARIAE

brittiæ librā. Pelagonius causticū, quod suffusiones uesticasq; siccaret in genibus uel articulis, hac ratione cōposuit: Cerae punice librā, resine pondera duo & semis, galbani uncias 3, asphaltū iudæici pondera 2. myrrhæ secundariæ pondera 2. bituminis librā, armonici uncias 6. costi uncias 6. Verū cetera decoquis in cacabo fictili nouo, qui cum refrixerit, addis asphaltum et armoniacum et costū pro mēsurā, qua scriptū est, tritum ad modum farinae, & agita bis, & iterū coques ut sit una substantia, quo uteris aduersum uenas & uesticas & suffusiones, quæ nascūtur in genibus, aut in tibijs, aut inter nodos, aut in articulis, usq; eo ut ossulagnem curare credantur. Malagma quoq; causticum hac uoluit ratione componi: Picis pondera duo, cerae pondera 2. galbani uncias 3, resine librā, adipis taurinae pondera 2. bdellij uncias 7. thuris polinis uncias 3. resine terbentinae uncias sex, uisci pondera 2. glutis uncias 3.

Absirtus huiusmodi causticum hac ratione composuit, glandularis resine frice uncias 3. picis duræ uncias 3. bituminis iudæici uncias 3. euisci uncias 3. galbani uncias 3. bituminis græci uncias 3. hæc omnia in uino decoquis. Bitumen uero contundis & superimmittis.

Compositio malagmæ. Ca. xv.

Compositio malagmæ ad tumores duros & ueteres: Galbani uncias duas, resine librā, armoniaci selibrā, picis britiæ selibrā, cerae librā, olei quod temperare possit. Item malagma ad tumores duros & ueteres. Galbani libras 2. armoniaci selibrā, resine terbentinae selibrā, opopanax lib. storacis libram, cerae rufæ librā, bdellij lib. piperis albi unc. 1. baccæ lauri lib. piperis lōgi unc. 1. picis britiæ selib. olei irini quantū sufficit.

Compositio Collyrii fistularis. Ca. xvi.

Collyrium fistulare, quod conficitur ut mittatur in fistulas uulnenum quæ ab initio curata fuerint negligenter. Formatur aut ad mensuram ipsius fistulæ, ut cū immissum fuerit eadē possit implere, ut celerius iā consumpta duricia, caro uiua ducat solidam cicatricē: Misi librā, secule lib. eruginis lib. calcitis librā, cymini uncias sex, teres cū aceto, et collyria facies.

Item aliter componitur collyrium fistulare: Misi, eruginis, calcitis, lib. *smals (lactis)* gulas, mellis unc. sex (zungitis) pondera 2. coquas ex uino ueteri, pastillosq; inde facies fistulis inferendos.

Compositio

Compositio malagmæ crudæ. Cap. XVII.

Calcis uiuæ libras 2. sinopidis alexandrini librā, ficus sicæ uncias 6. axungie quantum sufficit, immisces, contundis, & uteris.

Compositio syncrismæ. Ca. XVIII.

Ceræ rufæ pondera duo, resinæ fricæ pond. 2. olei laurini librā, sepi taurini librā, axungie libram, medullæ ceruinæ lib. olei cyprini, eruginis, hyssopi, axungie ueteris libras singulas; hæc omnia pariter ad carbones decoquis & uteris.

Compositio Traumatici. Cap. XIX.

Traumaticum medicamentū curationi uulnerū ualde cōuenit. Nā absumpta putredine, uiuā carnē ad sanitatē reducit. Huius talis est compositio: Misi librā, calcitis pondera 2. eruginis librā, pariter colabis, & supra tegulam in ignē pones, et coques ut rubeū fiat. Post in mortario teres, & ad similitudinē farinæ puluerē facies. Deinde duos sextarios mellis in olla noua coquis cū uino, & cū feruere cœperit, puluerē superscriptum agitabis, & pariter decoques, refrigeratōq; ad cancrumatas plagas, ad fāmicem & cicatrices reducendas uteris. Traumaticum quoq; hac ratione componitur: Misi, cathimie, aloes (acori) libras singulas, eruginis libras 2. calcitis librā, mellis lib. 2. in olla noua decoques, refrigeratōq; uteris.

Compositio malagmæ Basilicæ. Ca. XX.

Malagmæ quoq; istiusmodi compositio approbata est: Mellis librā, galbani, storacis, bdellij, piperis albi singulas libras, armoniaci pondera duo, medullæ ceruinæ, baccarū lauri ass libram, thuris pollinis uncias 2. sepi caprini uncias 1.

Compositio alia malagmæ. Cap. XXI.

Malagmæ quoq; medicamentū hac ratione componitur: Armoniaci uncias tres, ceræ librā, nitri floris unc. 2. resinæ terbetinæ pōdera duo, storacis uncias 3. baccarū lauri unc. 6. olei cyprini unc. 3. olei laurini uncias 3. medullæ ceruinæ unc. 6. olei rosati uncias 3. adipis anserinæ uncias 6. hyssopi unc. 4. adipis ceruinæ unc. 6. opopanax unc. 6. piperis albi unc.

S

ARTIS VETERINARIAE

bi uncias 2. galbani uncias tres, axungæ ueteris libram, aceti acerrimi hemina, thuris masculi uncias 4.

Compositio prima anacollimatis. Ca. XXII.

Absirtus compositione anacollimatis eiusmodi composuit & prodidit: Floris nitri sextarium, opopanax uncias tres, croci siculi unc. 2. pipis albi unciam, pollinis thuris unc. 3. cochleas contusas x. bulbos xx. anellanas xx. quæ omnia contusa & permixta, si aceto temperaris, diuulsa coniungis. Efficacius tamen est, si locis dolorosis emissum sanguinem ipsius animalis addideris. Compositio syncrismæ. Storacis uncias 4. armoniaci unc. tres, medullæ ceruinæ unc. 2. olei glaucini unc. 6. olei cyprini unc. 3. seu taurini unc. 3. resinæ terbentine uncias 4. adipis ursinæ uncias 3. adipis leoninæ uncias 4. propulei unc. 3. olei ueteris uncias 6. axungæ ueteris librâ, olei saurensis lib. opopanax, galbani unc. 3. hæc ad carbones lentis uaporibus decoquantur, & unctionem saluberrimam præstant.

Compositio malagmæ crudæ. Ca. XXIII.

Compositio malagmæ crudæ talis est: ceræ punicæ selibrâ, armoniaci selibrâ, bdellij unc. 3. storacis uncias 2. sagapini unc. 4. thuris pollinis unc. 6. olei ueteris unc. 4. propulei uncias 2. medullæ ceruinæ unc. 6. sepi taurini unc. 2. resinæ fricæ unc. 2. adipis ursinæ unc. 2. adipis leonis uncias 2. opopanax, baccarum lauri aff. unc. 2. olei cyprini unc. 4. gentianæ unc. tres, resinæ colophonie unc. 6. galbani uncias 6. Itē alia compositio malagmæ: Ceræ, armoniaci aff. lib. storacis unc. 6. sagapini unc. 3. thuris pollinis uncias 3. medullæ ceruinæ unc. 4. opij hispani unc. 2. propulei uncias 4. sepi caprini uncias 6. galbani uncias 6. picis britiæ unc. 4. resinæ terbentine unc. 3. resinæ fricæ uncias 4. aceti acerrimi un. 4. olei lentiscini unc. 6. olei irini un. 4.

Compositio malagmæ ad uligines. Ca. XXIII.

Compositio malagmæ ad uligines. Salis asri lib. 1. bulbi libram, sulphuris libram 1. mûsi libras 2. olei lib. his coctis diligenter, uteris.

Compositio malagmæ ad neruos. Ca. XXV.

Sulphuris uiui, aluminis, resinæ, picis britiæ aff. lib. 1. ceræ pond. 2. medullæ ceruinæ lib. 1. hæc omnia pariter diu agitas aut uerberas.

Compositio Traumatici. Cap. XXVI.

Compositio traumatici. Gallæ unc. 4. æris usti unc. 3. corticis mali punici unc. 3. mifi unc. 4. uini unc. 1. aceti unc. 3. in olla noua excoquis et

Compositio Collyriorum. Ca. XXVII.

(uteris.

Ompositiones collyriorū Absirti, Pelagonij, Chironisq; subiecimus.

c Ad album enim de oculis tollendū & abstergēdum Absirtus tradidit: nuces auellanas combustas donec redigantur in cineres, in mortario deteres, addesq; mannæ thuris idē pondus, quæ diutissime trita, & melle optimo adiecto cōprehendātur, & sic inungatur aīal. Idem Absirtus eiusmodi collyriū laudat. Piperis albi grana s. mellis attici unc. 2. croci unc. 2. sepia marinæ (diligenter statissim) & rutæ unc. 2. balsami unc. 1. Pelagonius tale collyrium monstrat (propter). Oleū, sal, resinam, cerusam, opobalsamū, addito melle deteris atq; cōponis, alternis diebus inducis usq; ad sanitatē. Nardinū quoq; collyriū hac ratione composuit. Violæ unc. 1. spicæ nardi uncia semis, cassiæ, myrrhæ unc. 3. croci unc. 3. olei cyprini unc. 6. pipis albi unc. 2. cymini unc. 3. Item alia collyria cōposuit. opobalsami, croci, myrrhæ, salis hispani, lepidis, ossis sepia singulas uncias, cathimix unc. 2. afronitri unc. 1. mellis attici librā. Chiron etiā uetera glaucomata hac collyrij indicat confectiōe purgari. Cornu bubulini extremū ubi solidū est cōbures, ac thuris masculi puluerē, stercoris quoq; humani cōbusti & salis armoniaci pari mēsurā puluerem facies, piper longū, ossa sepia, flos eruginis, uetus uinū, crocus, ruta, pariter detrita cōmisces, addito optimo melle qd sufficit, & inungis. Aliud quoq; collyriū simile cōposuit. Ossa sepia marinæ, crocus, myrrha, trogloditis; item sal ac stercus crocodili, hæc oīa pariter ac diutissime deteruntur, & bene trita cernuntur, additoq; optimo melle unctiōis uilitatē aīalibus præstat. Licet parua & propē nulla de his, quæ diuersi authores retulerūt (præterissent) doceamus, tamen quæcunq; uidebantur probata conscripsimus. Verum ne longior liber confusionem magis legentibus, quā instructionē uideretur afferre, modū plenum credimus faciendum. Aliud iterum uerumq; commonentes, ut diligenti cura passionum occurratur exordijs. Nā etiam incurabiles ægitudines, si præsentēs fuerint ui, medentis arte uincuntur. In ueteratas causas etiam faciles, curari sape nō posse legi.

ARTIS VETERINARIAE

Alia quaedam medicamentorum genera.

Cephalicum, quod facit ad omnia uulnera difficilia claudenda et sup-
plenda: Herbae panacis radices, thus masculum, myrrham, pollinē erui, ro-
se folia arida bene trita et cribrata. hic pulvis cōfectus difficilia uulnera clau-
dit ac curat. Nunc etiā si melle decocto, & huic medicamēto mixto collyriū
facias, et altis sub uulneribus fistule subijcias, citius supplere et sanare cogit.

Medicamentum consuetum, in usu quotidiano necessarium,
propter compendium & moras ita facies: Eruginem, chalcitem, aris florē,
as ustū; hēc bene trita et cribrata aequo pondere catastaticum faciūt, quod
carnē supercrescentem comedendo effouet. Hoc idem cum aceto & melle de-
coctum ad melliscraffitudinē, facies medicamentū, quod facit ad omnia uul-
nera & caneros elympidanda, & ossa scabrosa.

Chlora medicamentum, quod facit ad omnia uulnera complete
lympidanda, uel sine difficultate claudenda: cerā punicā, resinam terbentinā
medullam ceruinam, eruginem, oleum, ita conficies quantum sufficit.

Tetrapharmacum, quod facit ad omnia uulnera elympidanda, &
uelocius curanda († ualde per hoc medicamentum cataloticum) Adipē tau-
rinā, cerā, picem, oleū. Igitur medicamentū, quod supra dixi cataloticū est.

Glicium, quod facit ad omnia uulnera sordida et canerosa: Amurcā,
salem, acetum: his mixtis quantum uolueris ad craffitudinē mellis uteris.

Ostiodare medicamentum, qđ facit ad oīa oscicula, et († darscus
quo loco factum si deiiciendum uolueris) Picem liquidam, axungiam ueterē,
eruginem bene tritam & admixtam, colas bene coctum, post decoctionē su-
pra scripta purgat uulnera diligenter.

Stypticum, quod facit ad omnia uulnera humecta, et fungos exiccan-
dos: Alumen scissum, gallas minores, cortices mali granati, subcorticem de
ipsa arbore. hēc oīa trita, pulvis ipsius uulneribus exiccādis ualde prodest.

Medicamentum quod facit ad omnia uulnera claudenda: Absyn-
thium, sinopidem, lepidam hēc tria bene commixta faciunt medicamentum
siccum, quod ad omnia uulnera prodest.

Implectoricum medicamētum, quod facit ad omnia caua sup-
plenda: Pollinem thuris, pollinem herbi, lepidam. hēc bene trita medicamen-
tum

tum faciunt ad supplenda uel elympidanda uulnera.

Ad oculorum rupturas & tuniculas seruandas prodest, si fel caprinum lacti caprino misceatur, & sic penna nigra oculi inungantur. Ad oculorum album siue glaucomata sic facies: uini sextarios 4. gariofloris sextarium unum, mellis uncias 4. pariter decoquis et uteris. Ad (uecentē) ocularem percussum: Croci, myrrhæ, thuris masculi, gummi, medullæ ueruiciniæ, anagallici succi, mellis, cardami, binas uncias.

Syncrisma: Cereusæ pondera 2. axungie pondera 4. opopanax uncias 2. olei ueteris pond. 2. galbani unc. 3. myrrhæ pond. 4. armoniæ pō 3. olei cyprini pond. 4. medullæ ceruinæ pond. 2. hyssopi pond. 2. storacis pōd. 4. olei lentiscini pondera 4.

Syncrisma ad alia genera: Galbani pond. 2. opopanax pond. 1. cereusæ pond. 4. medullæ ceruinæ pond. 3. thuris masculi pond. 2. piperis albi pondus 1. resinæ terbeninæ pond. 3. storacis pond. 1. adipis anserinæ pond. semis, euforbij uncias 6. adipis leoninæ, mellis, castorei, libras singulas, olei myrrhæ lib. 2. olei lentiscini pond. 2. olei syriaci lib. 2. olei ueteris lib. 2. olei mellini pondera 2. olei storacis pond. 2. opij pond. 3.

Lipparia sic facies: Spumæ argenti pondus 1. cerusæ uncias 2. uini sextarios 3. olei pondus 1. & semis, omnia conficies, & sic uteris.

Lipparia alio genere sic facies: Spumam argenti, cerusam, thus masculinum, acetum album, oleum, hæc omnia in unum conteres, & cum uino mellificato admisces, & sic uteris.

Traumaticum sic facies: Chalcitidis pond. 1. misi pond. 1. semis, erugenis uncia 1. stercoreis columbini pond. 1. adarcis uncias 3. & scrupulos 3. decoquis una, et sic uteris. Item alio genere ad flegmonas tollendas: Sinapis alexandrini unc. 6. fici asæ unc. 3. axungie ueteris uncias 6. aceti scrup. 3.

Item Traumaticum alio genere ad uerrucas tollendas: Floris chalcitis uncias 2. nitri uncias 2. lasari uncias 3. aceti heminā. Item alio genere ad suffraginosos: Eruginis, aluminis aſſi pond. 5. herbæ syderitis, ferrariæ pond. 1. aceti acris sextarium unum.

Ad flegmonas discutiendas: Radicis, erui, axungie, aceti acris, linis in linteo, & sic uteris.

Causticum ad neruos crassos, uel quæcūq; in notitia sunt: Galbani,

S 3

opopanax

ARTIS VETERINARIAE

opopanacis, medullæ ceruinæ, resinæ terbetinæ, armoniaci, propulei, uiolæ, thuris pollinis, bina pondera, resinæ frixæ pondera 5. bituminis pond. 3. picis duræ pond. 5. resinæ pituinæ pond. 5. ceræ pond. 5. olei cerini pōd. 3. incomij pond. 2. storacis pond. 2. uisci pond. 2.

Cauticum ad neruorū dolores: Galbani, storacis, uiolæ, propulei, resinæ singula pond. colophoniæ uncias sex, resinæ terbetinæ pond. 6. opopanacis pond. 1. thuris pollinis, hyssopi, armoniaci, baccæ lauri singula pond. picis britiæ pond. 1. et semis, uini (inei) pond. 1. semis, resinæ bituminis pond. 1. hæc omnia in uno cacabo coques, in linteolo induces calida.

Malagma cocticum sic facies: Ceræ albæ, galbani uncias singulas, resinæ terbetinæ pond. 2. adipis taurinæ pond. 3. hyssopi pond. 2. bdellij pondus 1. semis, irisillyricæ pond. 2. adipis anserinæ pond. 1. hæc omnia decoquis & uteris.

Malagma ad neruorum dolorem, Ceræ unc. 6. adipis ceruinæ unc. 3. galbani, piperis, armoniaci, resinæ terbetinæ uncias ternas, tracci uncias 5. singula contundis, permisces, & uteris.

Malagma ad neruos uexatos, Mentæ, galbani, rubricæ, storacis, uiolæ an pond. 6. similagnis pond. 4. hæc omnia cum similagine & uino decoques in cacabo, & liquida facies, deinde similagnem & uinū in unū permiscebis, inlinis in linteolo, & alligabis feruentia.

Malagma ad tumores sic facies: Ceræ uncias 6. adipis ceruinæ uncias 3. galbani uncias 3. uiolæ, piperis albi uncias ternas, armoniaci unciam, resinæ terbetinæ unc. 3. storacis unc. 3. gentianæ unc. 1. singula contundis, postea permisces in uino, & sic uteris.

Emplastrum, Ceræ uiridis pond. 1. et semis, olei cyprini unc. 9. olei myrthini uncias 2. adipis anserinæ uncias 2. thuris pollinis unc. 2. hæc oīa in cacabum mittis, coquis, & linteolis inlinis.

Cerotum ad ulcera, (strumenta) pond. 2. ceræ rusæ pond. x. olei myrthini pond. 6. olei ueteris pōdera 8. aluminis pond. 9. olei cyprini pond. decem, calcis pond. quinq;.

Fomentum ad tumores siue ad duriciam quālibet sic facies: euis cum ex uino decoctum conteris cū axungia, & sic uteris. Si minus, herbāsa uinam cōteris, et ex rosatio concoquis, & sic uteris ad sanitatem.

Compositio

Compositio ad colices, Asari pontici, petroselini, feniculi uncias singulas, piperis nigri uncias 2. marrubij mas. unc. 1. abrotani unciam semis, mellis optimi pond. 2. coques & despumabis, & hæc omnia contundes et cer nes, & sic in melle commiscebis, inde figuram facies nucis auellanae, & ex aqua dabis, et aquæ congiū 1. in potū. Item diebus quibus eo morbo tenetur, feniculi seminis cum uino cochlearia tria aut quatuor fricabis in mortario, adij cies uini cibarij sextariū 1. mittes in ampullam aut cornu, & dabis ut bibat, & cum sagis bene munies.

Malagma ad neruos claudos, Sepi hircini libram, mollicidenæ selibram, resinæ libram, eruginis selibram.

Compositio ad genua. Aceti hemina, salis pusillum, aeris usti seli bram, sinopidis quod satis est.

Potio hyemalis. Croci, costi, petroselini macedonici, murrhæ, thuris masculi, tracanti, cymini alexandrini, crocomagmæ, piperis uncias singulas, uini & olei quod sufficit (oua) hæc omnia permisces, & dabis cū succo ptisanæ, cui immittis palmas xxv. bulbos xxv. hyssopi fascem (caprinos adipes catulum breuem uiuum mittis) quem cum madefactum uideris, tunc oia exiccabis, & adijcies olei quod sufficit, tūc illa oia permisces & potionabis.

Potio æstiuæ. Traganti, croci, abrotani, cardamomi, glaucij, petroselini macedonici binas uncias, gingiberis unc. 1. hæc temperas, & cum dare coeperis, mittis quotidie heminas singulas singulis iumentis. Adde porri sectiui, porculi gallici, thus, apiū, olei asri heminam, temperabis quod sufficit & uteris. Sed hæc uide lib. 1. cap. 17.

F I N I S.

BASILEAE. ANNO. M. D. XXVIII.

EXCVDEBAT IOANNES FABER

EMMEVS IVLIAEENSIS.

